

ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ Questions women ask about abortion

ਗਰਭਪਾਤ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਜੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਲਿਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ (ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ) ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਯਕੀਨਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੀਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਕਲਿਨਿਕ ਤੇ ਅਨਿਸਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਤੇ ਬਾਰਵੇਂ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਬਾਦ ਹੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਕਾਉਨਸਲਿੰਗ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਔਰਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਨਰਲ ਐਨਸਥੈਟਿਕ (ਪੂਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ) ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤਕਰਣ ਦਵਾਈ (ਸਭੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਕਰਣ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਤੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਇਕ ਯੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਸ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਗਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਔਰਤ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਘਟ ਵਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਡੀਕੈਰ ਹੋਲੋਡਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਐਨਸਥੈਟਿਕ (ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਕਰਣ ਟੀਕੇ ਨਾਲ) ਤੁਹਾਨੂੰ ੧੩੦ ਤੋਂ ੧੮੦ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਐਨਸਥੈਟਿਕ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਖਰਚਾ ੩੩੫ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਜੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਲਿਨਿਕ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

- **ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ**

ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਚਾਵ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਚਾਵ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਬਾਥ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਭੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਮਪੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- **ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ**
ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਰੀ ਖੂਨ, ਸਖਤ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- **ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ।**
ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਰਭਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਗਰਭਪਾਤ ਵਿਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਜਾਂ ਪਾੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜ ਆਮ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਵੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਅੰਤੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਨਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੋਗ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਲਾਹ (ਕਾਉਨਸਲਿੰਗ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ (ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ) ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਬਾਦ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਥੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ, ਵਿਮੈਨਸ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਐਫ ਪੀ ਏ ਹੈਲਥ ਕਲਿਨਿਕ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਲਿਨਿਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ) ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਿਨਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਫਰਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟਰਮਿਨੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਯੈਲੋ ਪੇਜਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ (TIS) ੧੩੧ ੪੫੦ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ <<http://mhcs.health.nsw.gov.au>>.