

## Питања која жене постављају о абортусу Questions women ask about abortion

Абортус (прекид трудноће) је хируршки захват који лекари у Аустралији нормално обављају. Процедура је доступна у неким клиникама и болницама у свим државама.

Да ли је абортус у Аустралији законски дозвољен?

Абортус је у складу са законом ако га, уз пристанак жене, обавља лекар, стручњак. Лекар (у неким деловима Аустралије потребна су два лекара) мора основано веровати да је абортус неопходан како би се жена заштитила од озбиљне опасности по живот, њено физичко или ментално здравље. Лекар узима у обзир медицинске, економске и социјалне чиниоце.

На ком степену трудноће се обавља абортус?

Обично између шесте и дванаесте недеље трудноће, у зависности од тога на којој клиници се обавља. У неким случајевима абортус се може обавити и после периода од 12 недеља, али само уз пажљиво разматрање потребе за овом интервенцијом у коју може бити укључена и консултација са другим лекарима. Део тог разматрања је и одговарајуће саветовање за жену.

У чему се састоји захват?

Жена може да изабере да ли ће имати локалну или општу анестезију, или само средство за успављивање које се даје помоћу инјекције. Уз ово средство већина жена има осећај као да спава и уопште се не сећа процедуре. Лекар уметне инструмент у грлић материце, а затим користи лагано усисавање за одстрањивање садржаја материце. Процедура траје око 10 минута.

Шта се дешава после абортуса?

После краћег одмора жена може да иде кући. Могу се јавити грчеви, крварење и осећај замора, те је најбоље да жена узме слободан дан да се одмори код куће.

Колико кошта абортус?

Цене су различите, али лице које има опште здравствено осигурање Medicare цена ће бити од 130 до 180 долара за абортус са локалном анестезијом (или средством за успављивање), или 335 долара за абортус са општом анестезијом.

Које компликације могу настати услед ове процедуре?

Абортус је безбедна интервенција све док је обавља стручно лице на клиници или у болници. Опасности су мале, али могу укључити следеће:

\* Инфекцију

Ово је опасност која се јавља код сваке хируршке интервенције. Међутим, да би се избегао овај ризик преписују се антибиотици. Женама се такође

саветује да се туширају уместо да се купају у кади, затим да избегавају пливање, полне односе и коришћење тампона прве две недеље после абортуса. Ако дође до инфекције, брз третман ће осигурати да она не утиче на будућу плодност жене.

- \* **Понављање процедуре**  
У једном од сто абортуса може доћи до обилнијег крварења, јаким болова у пределу стомака или високе температуре ако садржај материце није у потпуности био одстрањен. Ако се то догоди, жени ће обично бити потребна друга процедура како би се отклонили поменути проблеми.
  
- \* **Пробијање материце**  
У једном од хиљаду абортуса дешава се да материца буде оштећена неким од инструмената који се користе. Рупа на материци је обично мала и сама зарасте не производећи никакве проблеме. Ако лекар посумња да је дошло и до оштећења утробе, жена мора да иде у болницу.

Да ли абортус повећава опасност од рака на дојци?

Нема никаквих медицинских доказа да абортус повећава опасност од рака на дојци.

Како се жена емоционално осећа после абортуса?

Осећања жалости и туге, као и олакшања уобичајени су после абортуса. Међутим, ако је жена озбиљно потресена мора јој се обезбедити приступ одговарајућим службама за процену стања и саветовање. Док се код већине жена не јављају дугорочни емоционални проблеми, истраживања показују да ако је одлука о абортусу донета под притиском са стране, већа је вероватноћа да ће се код жене јавити неке потешкоће. Многим женама потребно је да саме пажљиво размисле о избору, али исто тако им је потребна и подршка кад једном саме донесу одлуку.

Где се могу добити детаљније информације?

Ваш лекар, здравствени центри за жене или здравствени центри за планирање породице (некадашње **Family Planning Clinics**) могу вас повезати са клиникама на којима се врше абортуси, али вам за ову процедуру није потребан упут. Или погледајте у телефонском именику **Yellow Pages** под **Pregnancy Termination Services**.

Ако вам је потребна помоћ да телефонирате на енглеском језику, назовите телефонску службу за превођење **Translating and Interpreting Service (TIS)** на телефон 131 450.

Више информација о здрављу на српском језику можете наћи на мрежи за мултикултурну комуникацију **Multicultural Communication**  
<<http://mhcs.health.nsw.gov.au>>.