

โรคหนองในคืออะไร

What is gonorrhoea?

โรคหนองในเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่อวัยวะเพศ ทวารหนัก และลำคอ

โรคนี้ติดต่อได้อย่างไร?

How does someone catch this infection?

โรคหนองในติดต่อโดยการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทางทวารหนัก หรือทางปากกับผู้ที่ป่วยโรค โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย

รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคหนองใน

How do I know if I have gonorrhoea?

ในผู้ชายที่มีการติดเชื้อทางท่อปัสสาวะ อาการจะเกิดขึ้นประมาณ 2-10 วันหลังจากได้รับเชื้อมา บางครั้งอาจเป็นเดือน ๆ กว่าจะปรากฏอาการ ผู้ชายอาจมีหนองจากท่อปัสสาวะ มีอาการแสบหรือปวดเวลาถ่ายปัสสาวะ หากติดเชื้อที่ปาก มดลูก ทวารหนัก หรือลำคออาจจะไม่มีอาการ อย่างไรก็ตามในผู้หญิงที่มีตกขาวหรือสิ่งผิดปกติทางช่องคลอด/ทวารหนัก หรือปวดอุ้งเชิงกราน อาจมีสาเหตุมาจากโรคหนองใน

จะตรวจหาโรคหนองในได้อย่างไร?

How do you test for Gonorrhoea?

ตรวจหาโรคหนองในได้ด้วยการป้ายเชื้อจากท่อปัสสาวะ ปากมดลูก ทวารหนัก หรือลำคอ หรือโดยการตรวจปัสสาวะ

รักษาได้อย่างไร

What is the treatment ?

รักษาได้ง่ายโดยใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม

คู่นอนต้องได้รับการรักษาด้วยหรือไม่?

Do sexual partners need treatment?

หากมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทางทวารหนัก หรือทางปากโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยจะเสี่ยงต่อโรคสูง เพื่อเป็นการป้องกันโรคแทรกซ้อนรุนแรงจากการติดเชื้อหนองใน คู่นอนทุกคนควรมารับการตรวจและรักษา*ไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่และไม่ว่าผลการตรวจสอบจะเป็นอย่างไร* ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ (ทางปาก ทวารหนัก และช่องคลอด) กับคู่นอนที่อาจติดเชื้อ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการรักษา เพราะท่านอาจติดเชื้อหนองในกลับมาอีกได้

เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกสุขภาพทางเพศสามารถช่วยท่านแจ้งคู่นอนของท่านให้มารับการตรวจและรักษาโดยไม่บ่งบอกถึงตัวตน

เชื้อตัวนี้จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอะไรได้บ้าง?

What are the complications of this infection?

ในผู้หญิงที่มีเชื้อหนองในหากไม่ได้รับการรักษา อาจทำให้เกิดโรคอุ้งเชิงกรานอักเสบ หมายถึงอวัยวะสืบพันธุ์ในอุ้งเชิงกรานอักเสบ โรคอุ้งเชิงกรานอักเสบอาจเป็นสาเหตุให้ท้องนอกมดลูกเป็นหมัน (เนื่องจากท่อรังไข่เสียหายจากการเป็นแผล) หรือปวดอุ้งเชิงกรานเรื้อรังได้ ในท่านองเดียวกันผู้ชายอาจมีการอักเสบของระบบสืบพันธุ์ส่วนบนถ้าได้รับการรักษาไม่เพียงพอ ซึ่งอาจทำให้มีอาการปวดลูกอัณฑะได้

มีอะไรที่ควรทราบเกี่ยวกับโรคหนองในอีก

What else do you need to know about Gonorrhoea?

- ควรมารับการตรวจอีกครั้ง 7 วัน หลังจากรับประทานยาครบแล้ว
- หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ (ไม่ว่าจะเป็นทางช่องคลอด ทางปาก หรือทางทวารหนัก) จนกว่าจะได้รับผลการตรวจว่าหายขาด เพราะท่านอาจจะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นหรืออาจติดเชื้อซ้ำอีกได้
- หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ได้ในระยะนี้ ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง (รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ทางปากด้วย)