



ការប្រើស្រោមលិខ

NSW SEXUAL HEALTH SERVICES Providing free and confidential sexual health care.


១. ចូរអ្នកពិគ្រោះជាមួយគូស្នេហាជាមុន អំពី
ការប្រើស្រោមលិខ។




២. ចូរពិនិត្យនៅលើកញ្ចប់ មើលថ្ងៃខែដែល
ស្រោមលិខត្រូវទូច ប្រើមិនបាន។




៣. ចូរសាកល្បងប្រើស្រោមលិខជាមុន។
ចូរ សាកម៉ាកផ្សេងៗ ជ្រើសរើសរកទំហំ
អោយបានត្រឹមត្រូវ។




៤. ចូរពាក់ស្រោមលិខ មុននឹងសេពកាម។
ប្រយ័ត្នកុំអោយអ្នកដាច់រំហែក ដោយសារ
ចិញ្ចៀន វីក៏ក្រចកដែរ។



៥. ចូរច្រូតស្រោមអោយទៅដល់គល់លិខ។




៦. ចូរកាន់ទប់គល់ស្រោម នៅពេលដែល
អ្នកដកលិខចេញពីយោនី ។



៧. ចូរប្រើបាតុវ៉ាស៊ីនដែលមានជាតិទឹក ដូចជា
ម៉ាក យីចេលី វីក៏វេតស្តារ។ ជៀសវាងកុំ
ប្រើបាតុវ៉ាស៊ីនដែលមានជាតិប្រេង ដូចជា
ខ្លាញ់វ៉ាសាលីន វីក៏ប្រេងទារក(ជាតិប្រេង
នេះ ធ្វើអោយទូចស្រោមកៅស៊ូ) ។

៨. ចូរចោលស្រោមលិខក្នុងធុងសំរាម
កុំចោលក្នុងបង្គន់។



គំនូរនេះផ្តល់ដោយ
គណៈកម្មការជាតិទីព្រឹក្សា
ខាងជើងសេដ។

Albury	Ph: (02) 6058 1831
Balranald	Ph: (03) 5027 2345
Bourke	Ph: (02) 68722145
Broken Hill	Ph: (08) 8088 5800
Canterbury	Ph: (02) 9718 7655
Coffs Harbour	Ph: (02) 6659 1916
Dubbo	Ph: (02) 6885 1700
Forster	Ph: (02) 6555 6822
Gosford	Ph: (02) 4320 2114
Goulburn	Ph: (02) 4827 3470
Katoomba	Ph: (02) 4780 6060
Kings Cross	Ph: (02) 9360 2766
Kogarah	Ph: (02) 9350 2742
Lightning Ridge	Ph: (02) 68291022
Lismore	Ph: (02) 6620 2980
Liverpool	Ph: (02) 9827 8022
Manly	Ph: (02) 9977 3288
Marrickville	Ph: (02) 9560 3057
Newcastle	Ph: (02) 4923 6909
Nowra	Ph: (02) 4423 9353
Orange	Ph: (02) 6361 9906
Parramatta	Ph: (02) 9843 3124
Penrith	Ph: (02) 4724 2507
Port Kembla	Ph: (02) 4276 2399
Richmond	Ph: (02) 4578 1622
St Leonards	Ph: (02) 9926 7414
Sydney City	Ph: (02) 9382 7440
Tamworth	Ph: (02) 6766 3095
Taree	Ph: (02) 6551 1315
Wagga Wagga	Ph: (02) 6938 6492

សេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានផ្តល់ឱ្យអ្នក
កុំប្រើប្រាស់ប្រសិនបើមានសញ្ញាណប័ណ្ណ
ព្រះបាទ ព្រះមហាក្សត្រសីហនុវិទ្យាល័យ
(Telephone Directory)។

ស៊ីសតៃទីស Cystitis



និង ផ្នែកសិក្សានៃវេជ្ជសាស្ត្រខាងសុខភាពនៃការសេពកាម
សាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនី/សាកលវិទ្យាល័យញ៉ូសោធរេល

November 1994

តើស៊ីសតែទីសជាអ្វី?

ពាក្យស៊ីសតែទីស មានន័យថា ការហើមរលាកថង់នោម។ ជាធម្មតា ស៊ីសតែទីសបណ្តាលមកអំពីមេរោគបាក់តេរីយ៉ា។ ប៉ុន្តែ ជួនកាល រោគសញ្ញាដែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះអាចបណ្តាលមកអំពី ការឈឺក្រហាយនៅត្រង់ទ្វារនោម ដូចជាការសេពកាម - ការឈឺក្រហាយដោយសារជាតិគីមី ដូចជា ទឹកអប់ ថ្នាំបាញ់យោធិ - វីក័ដំបៅសុលស័រ ដូចជាហិបតិសនៅក្បែរទ្វារនោម។

តើរោគសញ្ញាមានអ្វីខ្លះ?

រោគសញ្ញាស៊ីសតែទីសមានដូចខាងក្រោមនេះ :

- ការឈឺ ក្រហាយ នៅពេលដែលនោម រីនៅក្រោយ ពេលនោមភ្លាមៗ។
- ការចេះតែថង់ទៅនោម ទ្រាំចាំមិនបាន។
- ការនោមចេញតិចតួច តែញឹកញាប់។
- ទឹកនោមដែលមានផ្កាស។
- ការឈឺចាប់ពោះផ្នែកខាងក្រោម ធម្មតាច្រើននៅចំកណ្តាល។
(ការឈឺចាប់នៅខាងក្រោមចំកណ្តាល អាចមានន័យថា ដំបៅនេះបានឡើងទៅដល់ដំរងមូត្រហើយ)។
- ការចេះតែក្រោកពីគ្រែទៅនោម។

តើអ្វីទៅដែលបណ្តាលអោយកើត

ស៊ីសតែទីសនេះ?

កត្តាដែលអាចបង្កអោយរលាកហើមថង់នោមមានច្រើនប្រការ ដូចជា :

- ការប្រែប្រួលរាងកាយ ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរដែលបណ្តាលមកអំពីការសំរាលកូនពីមុន។
- ការនោមមិនអោយអស់ពីថង់ ដោយសារទំលាប់វីក័ថង់នោមខូច មិនប្រកបកិច្ចដូចធម្មតា។
- របៀបក្បាច់សេពកាម ដែលធ្វើទុក្ខទ្វារនោមស្រ្តី ។
- ដំបៅក្លាយដែលចុះពីដំរងនោម។
- ហេតុផែទៀត ដែលគេមិនទាន់យល់ប៉ុន្តែមានកើតឡើងជាញឹកញាប់។

តើគេព្យាបាលស៊ីសតែទីស

តាមបែបណា?

គេប្រើថ្នាំអ៊ិនទីបាយអូទិក(antibiotics) ក្នុងការព្យាបាលស៊ីសតែទីសនេះ។ ការនេះជំរុំអោយគេទៅជួបគ្រូពេទ្យហើយយកទឹកនោមទៅបំបែកវិភាគមើល។ ជួនកាលជាការចាំបាច់ គេត្រូវតែវិភាគពិនិត្យទឹកនោមម្តងទៀត នៅក្រោយពេល ដែលចប់កម្មវិធីព្យាបាល ដើម្បីអោយច្បាស់ថា រោគនេះជាសះស្បើយមែនហើយ។ ចំពោះករណីដែលមានរោគសញ្ញាខ្លាំងក្លា ចូរអ្នកផឹកថ្នាំដែលបន្ថយជាតិអាស៊ីតក្នុងទឹកនោមដូចជាប៊ូកាបូនេតអូសូដា

(bicarbonate of soda) មួយស្លាបព្រាស្លាយជាមួយទឹកមួយកែវវីក័ថ្នាំកញ្ចប់ (Ural/citravescent) យូរលំស៊ីត្រាវេសសិន ដែលគេអាចទិញពីហាងលក់ថ្នាំពេទ្យ។ ការរើកើតឡើងវិញនៃស៊ីសតែទីសអាចជំរុំអោយគេជៀសវាងកត្តាដែលនាំអោយកើតរើឡើងវិញនេះ អាចជំរុំអោយមានការពិនិត្យស្រាវជ្រាវថែមទៀត វីក័បន្លាយកម្ម វិធីការព្យាបាលដោយប្រើអ៊ិនទីបាយអូទិកនេះ។

តើគេអាចធ្វើអ្វីខ្លះ

ដើម្បីជៀសវាងស៊ីសតែទីស?

- ជៀសវាងការពន្យាពេលនោម ហើយចូរនោមអោយអស់ទឹកនោមពីថង់នោម។
- ស្រ្តីគួរតែជូតសំអាតជាតិច្នៃ ពីខាងមុខ(យោធិ)ទៅខាងក្រោយ(កូថ) ក្រោយពេលនោមហើយ។
- ចំពោះស្រ្តីខ្លះ ការនោមភ្លាមៗក្រោយពេលសេពកាមរួច អាចជួយមិនអោយកើតស៊ីសតែទីស ។
- ចូរផឹកទឹកអោយបានច្រើន (២លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃ) ដើម្បីជួយអោយនោមច្រើនដង។