

- ລາງຄົນອາດຈະເຂົ້າໃຈຜິດໆຕໍ່ໄປ ເມື່ອຜົນການກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ອອກມາເປັນບົກກະຕິ (ຜົນລົບ) ແລະຄິດວ່າ ພຶດຕິກຳທີ່ສຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ທີ່ເຮົາປະຕິບັດມານັ້ນ ບໍ່ເປັນອັນຕາຣາຍຫຼືຮຽງ.
- ການທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຜົນວ່າ ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວນັ້ນຄິດຫຼາຍ ແລະເກີດຄວາມຢ້ານກົວແລະອຸກອັງຫຼາຍ.

ທຸກຄົນທີ່ຄິດວ່າ ຈະໄປກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ຖ້າມີຂໍ້ຂ້ອງໃຈໃດໆ ກໍຄວນຈະປຶກສາກັບຜູ້ແນະນຳ ພະຍາບານຫຼືທ່ານໝໍ ກ່ອນທີ່ຈະຮັບການກວດ.

ການກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສ ເອຊ.ໄອ.ວີ. ໂດຍບໍ່ທາດຄຸ້ມກັນ (ຫຼື HIV antibody) ແນ່ນອນບໍ່?

Is the HIV antibody test reliable?
 99% ຂອງຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ຈະກວດພົບທາດຄຸ້ມກັນ (ຫຼື ຜອນຕີ-ໂບຕີ) ຂອງເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ໃນເລືອດ ພາຍໃນ 3 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອມາຄົນສ່ວນຫຼາຍທີ່ຕິດເຊື້ອມາແລ້ວ ກໍຈະກວດພົບທາດຄຸ້ມກັນກ່ອນໜ້ານັ້ນ ບໍ່ຕ້ອງຖ້າໃຫ້ຄົບ 3 ເດືອນ. ຖ້າຜົນການກວດເລືອດອອກມາວ່າ ເປັນຜົນບວກ (ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.**) ກໍຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດເລືອດອີກເທື່ອໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈ. ດັ່ງນັ້ນ ຜົນການກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ໃນປັດຈຸບັນຈຶ່ງມີຄວາມຜິດພາດໜ້ອຍ.

ຄວນຈະເຮັດຢ່າງໃດຫຼັງຈາກກວດພົບວ່າ ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ເອຊ.ໄອ.ວີ?

What happens after the test comes back positive?
 ຜົນການກວດເລືອດຫາເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ຖ້າອອກມາເປັນບວກ ກໍຕ້ອງມີການກວດຕື່ມອີກ ເພື່ອຢືນຢັນໃຫ້ແນ່ນອນ. ທ່ານໝໍຈະຕ້ອງກວດຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ເບິ່ງອີກວ່າອາການຂອງໂຮກກ້າວໜ້າຫຼາຍໜ່ວຍພຽງໃດ. ທັງນີ້ໂຮກກ້າວເບິ່ງຈາກຜົນການກວດຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຫຼືຜົນການກວດທີ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບຫ້ອງທົດລອງ. ການກວດທີ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບຫ້ອງທົດລອງທີ່ປະຕິບັດກັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນກໍຄື ການກວດເລືອດຫາຮະດັບຂອງ 'ທີ' ເຊລລ໌ (T Cell Test) ເຮົາຈະສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ຮະບົບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍເຮັດຫາຍໄປຫຼາຍພຽງໃດ. ຈາກການກວດຮ່າງກາຍແລະການກວດຢ່າງສາມາດເມີທຸກ 2-3 ເດືອນ ຈະສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ຍາມໃດຈຶ່ງທີ່ແໝ້ນສົມທີ່ສຸດທີ່ທ່ານໝໍຈະເລີ່ມວາງຢາໃຫ້ການຢືນຢັນບົວຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ. ຄວນຈະໄປປຶກສາເຖິງຄວາມຂໍ້ອຽດເຫຼືອທາງດ້ານສັງຄົມ ການຫາທີ່ຢູ່ແລະຄວາມອຸດຫນູນອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ກັບຜູ້ແນະນຳ ພະຍາບານ ຫຼືທ່ານໝໍ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືແລະຂໍ້ອຽດເຫຼືອ ຖ້າຜູ້ກ່ຽວນັ້ນພົບວ່າການບອກຜົນການຕິດເຊື້ອໃຫ້ທີ່ທີ່ຮັກຮູ້ຈັກນັ້ນເປັນເລືອງລຳບາກໃຈ ແລະຂໍ້ອຽດເຫຼືອຄຸ້ນຄຸນຂອງຜູ້ກ່ຽວນັ້ນທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ເຊັ່ນກັນ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຮັບແຕ່ພຽງສະຕິຕິທີ່ນັ້ນກ່ຽວກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ **ເອດສ໌** ເພື່ອບໍ່ຮູ້ຮາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ຫຼືທີ່ຢູ່ ຄລິນິກຫຼືທ່ານໝໍເທົ່ານັ້ນຈະເປັນຜູ້ດຽວທີ່ຮູ້ຮາຍລະອຽດຂອງຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ຫຼືຜູ້ທີ່ເປັນໂຮກ **ເອດສ໌**.

NSW SEXUAL HEALTH SERVICES
Providing free and confidential sexual health care.

Albury	Ph: (02) 6058 1831
Balranald	Ph: (03) 5027 2345
Bourke	Ph: (02) 68722145
Broken Hill	Ph: (08) 8088 5800
Canterbury	Ph: (02) 9718 7655
Coffs Harbour	Ph: (02) 6659 1916
Dubbo	Ph: (02) 6885 1700
Forster	Ph: (02) 6555 6822
Gosford	Ph: (02) 4320 2114
Goulburn	Ph: (02) 4827 3470
Katoomba	Ph: (02) 4780 6060
Kings Cross	Ph: (02) 9360 2766
Kogarah	Ph: (02) 9350 2742
Lightning Ridge	Ph: (02) 68291022
Lismore	Ph: (02) 6620 2980
Liverpool	Ph: (02) 9827 8022
Manly	Ph: (02) 9977 3288
Marrickville	Ph: (02) 9560 3057
Newcastle	Ph: (02) 4923 6909
Nowra	Ph: (02) 4423 9353
Orange	Ph: (02) 6361 9906
Parramatta	Ph: (02) 9843 3124
Penrith	Ph: (02) 4724 2507
Port Kembla	Ph: (02) 4276 2399
Richmond	Ph: (02) 4578 1622
St Leonards	Ph: (02) 9926 7414
Sydney City	Ph: (02) 9382 7440
Tamworth	Ph: (02) 6766 3095
Taree	Ph: (02) 6551 1315
Wagga Wagga	Ph: (02) 6938 6492

ເບີໂທລະສັບເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີ່ພົມເອກກະສານນີ້ ແຕ່ວ່າອາດມີການປ່ຽນແປງ. ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ກວດເບິ່ງເລກໂທລະສັບໃນສມຸດໂທລະສັບເບິ່ງໃໝ່.

ການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ
 'ເອຊ໌ໄອວີ ເອດສ໌'
 HIV Infection A.I.D.S.



ສູນສຸຂະພາບທາງເພດຂອງຊິດນີ
 ແລະ ໝວຍການຄົ້ນຄວ້າ ເວລາສາດທາງເພດສຸຂະພາບ
 ມຫາວິທຍາໄລ ຊິດນີ/ມຫາວິທຍາໄລ ນິວເຊີລັງເວລສ໌

ໄວຣັສ ເອຊ.ໄອ.ວີ. ແລະໂຣກ 'ເອດສ' ແມ່ນຫຍັງ?

What are HIV and AIDS?

ໄວຣັສ 'ເອດສ' ແມ່ນເຊື້ອໄວຣັສ ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** (HIV= human immunodeficiency virus) ເປັນເຊື້ອໄວຣັສທີ່ທຳລາຍຮະບົບພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດຜະລິດເປັນເຊື້ອໄວຣັສທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວງມີໂອກາດຕິດເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍໄປຕາລອດຊີວິດ. ໂຣກ 'ເອດສ' ນີ້ (AIDS = acquired immune deficiency syndrome) ແມ່ນອາການປ່ວງທີ່ເກີດຫຼັງຈາກຕິດເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ມາໃນໄລຍະນຶ່ງ. ກຸ່ມອາການຂອງໂຣກ 'ເອດສ' ມີຮ່ວມທັງອາການຕິດເຊື້ອໂຣກຮ້າຍຜຽງ ຫຼືມະເຮັງບາງຊະນິດຊຶ່ງເປັນຜົນມາຈາກພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍຖືກທຳລາຍແລ້ວ ອາການເຫຼົ່ານີ້ເວົ້າໂດຍສະເພາະແລ້ວຈະປາກົດປະມານ 1 ປີຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໄລຍະເວລາທີ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ຈະເລີ່ມມີອາການຂອງກຸ່ມອາການປ່ວງໂຣກ 'ເອດສ' ນັ້ນ ອາດຈະເປັນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເຊື້ອມາດົນນານປະມານ 1 ຫາ 20 ປີກໍເປັນໄດ້. ການຮັກສາຢືນຢົວໃນປັດຈຸບັນຈະສາມາດຍືດເວລາກ່ອນທີ່ຜູ້ປ່ວງຈະເລີ່ມມີກຸ່ມອາການປ່ວງໂຣກ 'ເອດສ'.

ໄວຣັສໂຣກ 'ເອດສ' ຕິດຕໍ່ໄດ້ຢ່າງໃດ?

How does someone catch HIV?

ເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ໂດຍ:

- ຮ່ວມເພດທາງຊ່ອງຄອດໂດຍບໍ່ໃຊ້ຖົງອະນາມັຍ (ຄອນດອມ) ຮະຫວ່າງຜູ້ຊາຍ ຫາຜູ້ຍິງ, ຜູ້ຍິງໄປຫາຜູ້ຊາຍໄດ້)
- ຮ່ວມເພດທາງທະວານໜັກໂດຍບໍ່ໃຊ້ຖົງອະນາມັຍ (ຄູ່ຮ່ວມເພດທັງສອງຄົນຈະສ່ຽງພ້ຍ)
- ໃຊ້ເຂັມສັກຢາແລະເຄື່ອງມືສັກຢາຮ່ວມກັນ
- ການຕິດຕໍ່ຈາກແມ່ໄປຫາລູກໃນທ້ອງຂະນະທີ່ແມ່ຖືພາແລະໃນຮະຫວ່າງເກີດລູກຫຼືໂດຍຜ່ານທາງນ້ຳນົມແມ່

ເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ ຫຼືຕິດຕໍ່ໄດ້ຢາກໃນກໍລະນີຕໍ່ໄປນີ້:

- ຮ່ວມເພດທາງຊ່ອງຄອດ ຫຼືທະວານໜັກ ໂດຍໃຊ້ຖົງອະນາມັຍຢ່າງຖືກວິທີ
- ຮ່ວມເພດທາງປາກໂດຍບໍ່ມີໂດຍບໍ່ໃຊ້ຖົງອະນາມັຍ (ການຫຼັງນ້ຳກາມໃນປາກຈະເຮັດໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໂຣກຫຼາຍຂຶ້ນ)

ໃນສ່ວນກ່ອນ ຮະຫວ່າງປີ 1980 ຫາ 1985 ຄົນເຮົາສາມາດຕິດເຊື້ອໄວຣັສ

ເອຊ.ໄອ.ວີ. ຈາກການຕື່ມເລືອດ ຫຼືພະລັດຕະພັນຂອງເລືອດ ບໍ່ເຄີຍມີລາຍງານວ່າເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ໃນກໍລະນີຕໍ່ໄປນີ້:

- ຈຸບ
- ກອດກັນ
- ຈັບມືຖືແຂນ
- ໃຊ້ບ່ວງສ້ອມມືດ ຫຼືຈອກຮ່ວມກັນ
- ຍຸງກັດ ຫຼືໃຊ້ວິດຮ່ວມກັນ

ໂຣກ 'ເອດສ' ມີອາການຢ່າງໃດ?

What are the symptoms?

ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ເກືອບທຸກຄົນຈະບໍ່ມີອາການຫຼັງຈາກຈະບັງຮູ້ສຶກ ແຂງແຮງດີ. ຕໍ່ມາປະມານ 1—6 ອາທິດ ພະຍາກອນຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຄົນທີ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອນັ້ນມາແລ້ວ ອາດຈະເລີ່ມມີອາການຄ້າຍຄືກັບເປັນໄຂ້ຕ້ອນນ້ຳເຫຼືອງ ອັກເສບ (ອາການຄືເປັນໄຂ້ເທື່ອອອກ ທ້ອງບິດ ອອກຕຸ່ມແຕງເປັນຜືນ ມືບາດ ແຜ່ໃນປາກ) ອາການເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນປູ 2—3 ມື້ຫຼື 2—3 ອາທິດ. ຫຼາຍໆຄົນຈະບໍ່ມີອາການເຈັບປ່ວຍໃດໆເລີຍ. ຄົນທີ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອມາແລ້ວສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ມີອາການຫຼັງເລີຍເປັນເວລາດົນນານຫຼາຍປີ. ຕໍ່ມາ ເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີອາການເຈັບທ້ອງບິດ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດຫຼືຫາບໍ່ພົບສາເຫດນ້ຳໜັກຫລຸດລົງ ມີຜືນແຕງເປັນຂັ້ນ ແລະກໍ່ຫາຍໄປເອງ

ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ເຊື້ອໄວຣັສ ເອຊ.ໄອ.ວີ. ຫຼືບໍ່ແຜ່ ເຊື້ອໄດ້ຢ່າງໃດ?

How does someone avoid becoming infected with HIV or infecting someone else?

ມີວິທີການຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ສາມາດໃຊ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ແຜ່ພາຍໄປໄດ້. ແຕ່ລະບຸກຄົນຈະໃຊ້ວິທີແຕກຕ່າງກັນໄປແລະວິທີການຂອງແຕ່ລະຄົນກໍຈະປຽນແປງໄປຕາມກາລ ເວລາ ວິທີເຫຼົ່ານີ້ຄື:

- ບໍ່ມີເພດສັມພັນ ແລະ ບໍ່ມີສັກຢາແສບຕິດ
- ມີເພດສັມພັນທີ່ບໍ່ມີການສອດອະວັຍະສະອຸ່ງຄອດຫຼືທະວານໜັກ ເຊັ່ນມວດຫຼືລູບໄລ້ຮ່າງກາຍ ຊ່ອງສຳເລັດຄວາມໂຄ່ກັນແລະກັນ
- ເພດສັມພັນທາງປາກ (ໃຊ້ປາກແລະລິ້ນກະຖັນອະວັຍະເພດຂາຍແລະອະວັຍະເພດຍິງ) . ການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ໂດຍທາງເພດສັມພັນທາງປາກ ເປັນໄປໄດ້ຍາກແລະໂດຍສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ຈະເກີດຈາກຜູ້ຊາຍຫຼັງນ້ຳອະສຸຈິໃນປາກຂອງຄູ່ຮ່ວມ. ການຕັດສິນໃຈວ່າຈະມີເພດສັມພັນທາງປາກຫຼືບໍ່ນັ້ນ ຈຶ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າ ຄົນຄົນນັ້ນຈະຍອມຮັບວ່າ ການກະທຳແບບນີ້ກໍ່ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາມັຍຫຼືແຜ່ນຢາງທີ່ໃຊ້ສຳລັບທັນຕະກັມ (ບົວແອ້ວ) (ໃຊ້ຄຸ້ມບໍລິເວນທີ່ຕ້ອງການລູບເລີຍ ໂດຍສະເພາະບໍລິເວນອະວັຍະວະເພດຫຼືທະວານໜັກ) . ຢ່າງໃດກໍດີ ຄວນຈຶ່ງໄວ້ວ່າ ການທີ່ມີເພດສັມພັນທາງປາກໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນນັ້ນ (ໂດຍບໍ່ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາມັຍຫຼືແຜ່ນຢາງທີ່ໃຊ້ທາງທັນຕະກັມ) ຈະມີໂອກາດຕິດເຊື້ອພະຍາດ ການມະໂຣກອື່ນໆໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
- ເພດສັມພັນທາງທະວານໜັກຫຼືທາງຊ່ອງຄອດໂດຍບໍ່ໃຊ້ຖົງຢາງທຸກຄັ້ງໃນຂະນະທີ່ຮ່ວມເພດ. ບາງຄົນອາດຈະໃຊ້ວິທີປ້ອງກັນຢ່າງອື່ນຮ່ວມດ້ວຍ ເຊັ່ນໂດຍການຖອນອະວັຍະເພດກ່ອນຈະຫຼັງນ້ຳອະສຸຈິ ໃນຜູ້ທີ່ມັກຈະມີຢືນຫາວ່າ ຖົງຢາງ

ແຕກເລື້ອຍໆ ຫຼືຖົງຢາງມັກຈະຫລຸດອອກ, ຖົງຢາງຈຶ່ງອາດຈະບໍ່ແມ່ນວິທີທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຜູ້ນັ້ນ. ທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາມັຍຄວນຈະຝຶກຫັດໃຊ້ຖົງຢາງໃຫ້ຖືກວິທີ ດ້ວຍຮູບແບບຂອງເສັ້ນຮ່ວມທີ່ຈະນຳໄປໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນຕິດເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.**

- ໃຊ້ອຸປະກອນເຄື່ອງມືສັກຢາໃໝ່ທຸກຄັ້ງ ເມື່ອສັກຢາແສບຕິດ
- ມີເພດສັມພັນໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນໃດໆ ໃນກໍລະນີທີ່ທັງຄູ່ຮ່ວມເພດກັນກັບຄືນຄຽວເທົ່ານັ້ນ ຄືຄູ່ຮ່ວມຂອງຕົນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ໄປກວດຮ່າງກາຍແລ້ວພົບວ່າບອດພັຍຈາກເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ແລະການມະໂຣກອື່ນໆ ການທີ່ຈະມີເພດສັມພັນໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນ ຄວນຈະເລີ່ມເມື່ອທັງຄູ່ໄດ້ຄົບຫາກັນຢ່າງໜ້ອຍ 3 ເດືອນ ຫຼືດົນກວ່ານັ້ນ, ເພາະໄດ້ໄປກວດຮ່າງກາຍຫຼັງຈາກ 3 ເດືອນທີ່ຢູ່ນຳກັນແລ້ວ. ຫຼັງຈາກກວດພົບວ່າບອດພັຍທັງຄູ່ ກໍຕ້ອງຫຼີກບໍ່ໄປຕິດເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ຈາກຄົນອື່ນມາ.
- ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ກະຮຸນາລົມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ແນະແນວ ພະຍາບານ ຫຼື ທ່ານໝໍທີ່ສູນສຸຂະພາບທາງເພດໄດ້ທຸກບ່ອນ.

ຄວນຈະໄປກວດບາກເຊື້ອໄວຣັສ ເອຊ.ໄອ.ວີ. ບໍ່?

Is it worth getting tested for HIV?

ເຖິງແມ່ນວ່າ ສູນສຸຂະພາບທາງເພດທຸກບ່ອນຈະສະເໜີໃຫ້ຜູ້ມາຮັບບຣິການກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ເປັນວຽກປະຈຳຂອງເຈົ້າຢູ່ແລະທາງຄລິນິກຕ່າງໆ ກໍຍ່ອມວຽກຄວາມສະດວກທາງນີ້ໃຫ້ຢູ່ກໍຕາມ ການກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ. ການເລືອກຢືນຢູ່ກັບທ່ານ ແລະທ່ານຄວນເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈແຕ່ຜູ້ດຽວ. ການກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສມັກຈະໃຊ້ຊ່ອງ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ເປັນຮະຫັດ ບໍ່ມີການໃຊ້ຊີວິດຂອງຄົນໄວ້. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງປະກັນຄວາມລັບສະເພາະໄດ້ຢ່າງສູງສຸດ. ພົນດີທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການໄປກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ຄື:

- ການຮັກສາໃນປັດຈຸບັນກ້າວໜ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະສາມາດຍືດອາຍຸແລະຄຸນພາບຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ໄດ້.
 - ຜູ້ທີ່ຮູ້ວ່າ ຕົນເອງຕິດເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ອາດຈະສາມາດວາງແຜນຊີວິດໃນອະນາຄົດຂອງຕົນໄດ້ດີກວ່າ ຖ້າໄດ້ຮັບຄຳອະທິບາຍເຖິງທາງເລືອກຕ່າງໆ.
 - ການທີ່ໄດ້ຮູ້ຜົນຂອງການກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ອາດຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທີ່ຮູ້ສາມາດເລືອກວິທີການປະຕິບັດທາງເພດທີ່ປອດພິດໄດ້.
- ຜົນເສັ້ນຢາງປະການ ຖ້າໄປຮັບການກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສ **ເອຊ.ໄອ.ວີ.** ກໍມີຄື:
- ຜູ້ກ່ຽວມີຄວາມວິຕົກກັງວົນໃນຮະຫວ່າງທີ່ລໍຖ້າຝັງຝົນ
 - ວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມລັບຂອງຜູ້ກ່ຽວແລະການຂໍປະກັນພ້ຍກັບບຣິສັດປະກັນພ້ຍ.