

L'intervento sulle unghie dei piedi ha un indice di successo alquanto elevato.

Possibili complicanze


- dolore post operatorio;
- ricrescita dell'unghia;
- infezione.

Diabetes Australia-NSW

26 Arundel Street, Glebe NSW 2037

Telefono: 02 9552 9900 • Fax: 02 9660 3633


email: edu@talent.com.au



Ideato e prodotto per la salute e sicurezza di tutti i piedi di proprietà di malati di diabete.

Unghia del piede INCARNITA?

Considera un intervento chirurgico



INGROWN toe nail? – consider nail surgery



ideato da Dollien Khoury
per il Liverpool Health Service Podiatry Department
e realizzato da Diabetes Australia-NSW

July 1998

Unghia del piede incarnita?

Considera un intervento chirurgico

In questo caso si tratta di un intervento chirurgico di minore portata che comporta l'asportazione parziale o totale dell'unghia del piede interessata. L'intervento viene effettuato in modo che l'unghia non ricresca più.

Quando è necessario un intervento chirurgico?

- quando l'unghia incarnita continua a infettarsi;
- quando il dito del piede continua a far male;
- quando sei incapace di portare scarpe chiuse.

Cosa comporta l'intervento?

Dapprima si procede ad un accertamento del paziente, che comporta una visita completa di carattere neurovascolare. La visita viene effettuata tenendo conto dei farmaci presi, delle malattie e dell'età del paziente per stabilire se egli sia idoneo ad un intervento chirurgico.

Viene praticata un'anestesia locale per privare di sensibilità il dito del piede. Ciò comporta due iniezioni, una su ciascun lato del dito interessato.


Un apparecchio elastico viene poi applicato al dito per evitare la fuoriuscita di sangue. Tale apparecchio si chiama tourniquet o pinza emostatica.

Non appena l'anestesia fa effetto, l'unghia incriminata viene sollevata ed asportata.


Una soluzione a base di fenolo viene poi applicata alla matrice dell'unghia - cioè nella zona dalla quale l'unghia cresce, per prevenire appunto la sua ricrescita. La parte viene poi medicata e fasciata fino al suo rimarginarsi.

Una volta rimarginatasi la ferita, dovresti ritrovarti con un dito del piede senza alcun dolore.


L'intervento appena descritto comporta l'asportazione di un lato soltanto dell'unghia. Lo stesso intervento può essere usato per asportare entrambi i lati dell'unghia oppure, se necessario, l'unghia intera.




x = Punto in cui viene praticata l'iniezione di anestetico.



Parte dell'unghia da asportare.



Zona in cui la soluzione viene applicata dopo l'asportazione dell'unghia.



Unghia curata.

I numeri di telefono sono corretti al momento della pubblicazione, ma non vengono aggiornati costantemente. E' bene pertanto controllare i numeri stessi sulla guida telefonica.

REVIEWED
October 2003

NSWMulticulturalHealthCommunicationService