

ការដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើគ្រឿងញៀនម្យ៉ាងហោ “អេចថេស្ទ្រី”

Ecstasy - understanding the risks

“អេចថេស្ទ្រី” គឺជាគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ម្យ៉ាង ដែលជនវ័យក្មេងខ្លះប្រើ។ ក៏ប៉ុន្តែវាមិនដូចគ្រឿងញៀនដទៃទៀតដូចជាកញ្ឆា, អាភៀន(heroin) និងគ្រឿងញៀនម្យ៉ាងហោ “ខូខេន”(cocaine)នោះទេ គ្រឿងញៀន “អេចថេស្ទ្រី”នេះមិនមានផ្សំមកពីជាតិរុក្ខជាតិឡើយ។ “អេចថេស្ទ្រី”គឺផលិតឡើងពីជាតិគីមីជាច្រើនមុខ។

តើ“អេចថេស្ទ្រី”ជាអ្វី ?

ទោះបីជាគឺផ្សំផលិត“អេចថេស្ទ្រី”អាចផ្លាស់ប្តូរខ្លះក្តី តែជាទូទៅ វាធ្វើមកពីជាតិគីមី ស្រដៀងទៅនឹងគ្រឿងញៀនបែបផ្សេងទៀត ៖

- “អាំមហ្វីថាមីន” (amphetamines) ដែលជួនកាលគេហៅថា “ ស្ត្រីដ” (speed) - គឺជាគ្រឿងលើកកម្លាំងម្យ៉ាង ហើយនិងជួយសំរាប់កុំឲ្យងងឹតយក់។
- គ្រឿងញៀនម្យ៉ាងហោ “ហាលូស៊ីស្តូហ្គេន”(Hallucinogens) នេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកមើលឃើញ ឬឮអ្វីដែលគ្មានប្រភពសោះ ឬជួនកាលឮឬមើលឃើញអ្វីខុសផ្សេងពីរូបដើមទៅវិញ។ ឧទាហរណ៍ មនុស្សដែលញៀនគ្រឿងញៀន“ហាលូស៊ីស្តូហ្គេន”(Hallucinogens) អាចមើលឃើញពេងកាហ្វេកំរើកដើរ ឬផ្ការនៅលើជញ្ជាំងចេះកំរើកដើរ។

តើគេប្រើគ្រឿងញៀន“អេចថេស្ទ្រី” (Ecstasy) តាមរបៀបណា ?

តាមធម្មតាគេលេបគ្រឿងញៀន“អេចថេស្ទ្រី”នេះ ព្រោះវាមកជាគ្រាប់រាងមូលបូរាងផ្សេងៗពណ៌ស ឬលឿង ។ តែអ្នកខ្លះប្រើគ្រឿងញៀន“អេចថេស្ទ្រី”នេះតាមការចាក់។

តើវាមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះ ?

ឥទ្ធិពលនៃ“អេចថេស្ទ្រី” គឺយោងទៅតាមជាតិដែលគេដាក់ដាក់ផ្សំធ្វើគ្រឿងញៀននោះ ហើយនិង យោងទៅតាមស្ថានភាពដែលគ្រឿងញៀននោះ ។ វាអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះសប្បាយ មានការទុកចិត្តខ្លួនឯង និងបញ្ចេញសេចក្តីស្រឡាញ់។ ក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះមានអារម្មណ៍រសាប់រសល់ មានការភ័យខ្លាចថាមានអ្នកណាមកធ្វើបាប ហើយនិងមានដំណើរការធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្លាំង។

ឥទ្ធិពលក្នុងកំឡុងពេលខ្លីមានដូចជា ៖

- ធ្វើឲ្យបេះដូងដើរពាប់ និងឡើងសម្ពាធឈាម
- សីតុណ្ហភាព(កំដៅ)ក្នុងខ្លួនឡើង និងបែកពើស
- ការសោះទឹកពីក្នុងខ្លួន(dehydration)
- សង្កៀតធ្មេញ ឬខាំធ្មេញ
- ចង់ក្អក។

តើ“អេចថេស្វី”ធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដូចម្តេចខ្លះ ?

អ្នកខ្លះស្លាប់ដោយសារប្រតិកម្មអាក្រក់ខ្លាំងនៃ“អេចថេស្វី”។ ទោះបីវាមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ក្តី តែយើងមិនដឹងជាមុនថាគ្រោះថ្នាក់ពីគ្រឿងញៀននេះនឹងកើតមានឡើងដល់បុគ្គលណា។ គ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ខ្លះបណ្តាលមកពី ៖

- កំដៅខ្លាំងពេក - ដោយសារ“អេចថេស្វី” ព្រមជាមួយនិងការរំលែកយូរពេក អាចធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនឡើងក្តៅ បណ្តាលឲ្យសោះទឹកក្នុងខ្លួន។ អ្នកដែលប្រើគ្រឿងញៀន“អេចថេស្វី” គួរញ៉ាំទឹក ៥០០មីលីលីត្រក្នុង១ម៉ោងម្តងនៅពេលរំលែកឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗ ហើយបើគ្មានការរំលែកទេក៏គួរញ៉ាំទឹក២៥០មីលីលីត្រដែរ។
- ការញ៉ាំទឹកច្រើនពេក - វាជាការសំខាន់ដែលមិនត្រូវញ៉ាំទឹកច្រើនពេកក្នុង១លើក ព្រោះគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ខ្លះកើតឡើងកាលណាមានទឹកច្រើនដែលមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ខួរក្បាល បណ្តាលឲ្យបាត់បង់ស្មារតីយូរ(coma)។

វាជាការសំខាន់ដែលអ្នកមិនត្រូវបើកបរជាដាច់ខាតនៅក្រោយពេលប្រើ“អេចថេស្វី” ហើយមិនត្រូវប្រើ“អេចថេស្វី”ជាមួយគ្រឿងញៀនផ្សេងទៀត ព្រមទាំងមិនត្រូវប្រើមូលចាក់រួមគ្នាប្រសិនបើប្រើមូលចាក់។ ជនណាដែលខ្លួនឯងឬគ្រួសារមានប្រវត្តិជម្ងឺខួរក្បាល ការព្រួយចិត្ត ការភ័យរន្ធត់ភ្លាមៗ(panic attacks) ជម្ងឺបេះដូង ការឡើងសម្ពាធឈាម ជម្ងឺទឹកនោមផ្អែម បញ្ហាថ្លើម ឬជម្ងឺឆ្អាតជ្រូក មិនត្រូវប្រើគ្រឿងញៀន“អេចថេស្វី”នេះទេ។

តើ“អេចថេស្វី”ញៀនឬទេ ?

គេគ្មានជំនឿថា“អេចថេស្វី”បណ្តាលឲ្យញៀននោះទេ ឧទាហរណ៍វាមិនធ្វើឲ្យញៀនដូចអាវ៉ែន ឬជាតិស៊ីកូទីនក្នុងបារី ដែលវាធ្វើទុក្ខនៅពេលផ្តាច់ឈប់ប្រើ។ តែយ៉ាងណាក្តី ចំពោះជនខ្លះវាបណ្តាលឲ្យមានអារម្មណ៍ពីងផ្អែកទៅលើ“អេចថេស្វី” - មានន័យថាជននោះពីបុកនិងឈប់ប្រើ“អេចថេស្វី” ពីព្រោះជននោះគិតថា ខ្លួនត្រូវការ“អេចថេស្វី”ទើបមានអារម្មណ៍ល្អឬសប្បាយកើត។

តើឥទ្ធិពលនៃការប្រើ“អេចថេស្វី”យូរពេលមានអ្វីខ្លះ ?

ភស្តុតាងខ្លះបានបង្ហាញឲ្យដឹងថា“អេចថេស្វី”មានឥទ្ធិពលដល់ខួរក្បាល បណ្តាលឲ្យមានការព្រួយបារម្មណ៍ និងដំណើរការធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្លាំង។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាមានមនុស្សតិចណាស់ដែលប្រើ“អេចថេស្វី”យូរពេល ប្រហែលមកពីឥទ្ធិពលរបស់“អេចថេស្វី”ដែលធ្វើឲ្យសប្បាយនោះវាកាន់តែសាបទៅកាលណាប្រើយូរពេល។

តើអ្នកអាចដឹងថាបុគ្គលណាប្រើ“អេចថេស្វី”ដែរឬទេ ?

ពីព្រោះឥទ្ធិពលនៃ“អេចថេស្វី”(និងគ្រឿងញៀនផ្សេងទៀត) មានសភាពប្រហាក់ប្រហែលទៅនិងអាកប្បកិរិយាក្មេងជំទង់ (ឧទាហរណ៍ ការផ្តាសំបួរអារម្មណ៍ ការគេងយូរ) វាជាការពិបាកនិងឲ្យដឹងថាវាប្រើ“អេចថេស្វី”។ មាតាបិតាណាដែលមានការព្រួយបារម្មណ៍ពីកូនប្រើគ្រឿងញៀន ត្រូវទាក់ទងទៅវេជ្ជបណ្ឌិត ឬមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ (Community health centre) ដើម្បីយកព័ត៌មានស្តីពីផ្នែកបំរើខាងបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងសុវត្ថិភាពតំបន់របស់អ្នក។

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដែរ ប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់ដោយសារការប្រើ“អេចថេស្សី” ឬគ្រឿង ញៀនផ្សេងទៀត
?

ប្រសិនបើសង្ស័យថាការឈឺនោះបណ្តាលមកពីការប្រើ“អេចថេស្សី” អ្នកត្រូវហៅទូរស័ព្ទជាបន្ទាន់ (ប៉ូលីសមិនមកទេនៅពេលដែលអ្នកហៅទូរស័ព្ទ)។

ប្រសិនបើអ្នកមានការពិបាកក្នុងការទូរស័ព្ទជាភាសាអង់គ្លេស សុំអ្នកទាក់ទងទៅផ្នែកផ្តល់អ្នកបកប្រែ
Translating and Interpreting Service (អក្សរកាត់ TIS) លេខ 131 450។

អ្នកអាចយកព័ត៌មានផ្នែកសុខភាពបន្ថែមទៀតជាភាសាខ្មែរ ពីកំពូទ័រតាមរយៈ **Multicultural Communication website at <<http://mhcs.health.nsw.gov.au>>**.