

ຈິງມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພິພິດຕະຖານຂອງ ເອັກສເຕຊີ Ecstasy - understanding the risks

ເອັກສເຕຊີ ແມ່ນຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍຊຶ່ງໃຊ້ກັນໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມບາງພວກ. ແຕ່ວ່າມັນແຕກຕ່າງກັບຢາເສບຕິດອື່ນໆເຊັ່ນ ກັນຊາ, ເຮໂຣອິນແລະໂຄເຄນ, ເອັກສເຕຊີ ບໍ່ໄດ້ມາຈາກພືດ. ແທນທີ່ຈະຜິດຈາກພືດ ມັນເປັນຜິດພັນທີ່ຜິດກົດໝາຍແລະຜິດຂັ້ນ ຈາກການປະສົມເຄມີ ຫຼາຍຊຸດໃສ່ກັນ.

ເອັກສເຕຊີແມ່ນຫຍັງ?

ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆຂອງເອັກສເຕຊີແຕກຕ່າງກັນໄປ, ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນຜິດ ຈາກເຄມີທີ່ຄ້າຍຄື ກັບຢາສອງປະເພດນີ້

- ແອມເຟຕາມິນ (amphetamines) ຊຶ່ງບາງຄັ້ງກໍເອີ້ນວ່າ ສປັດ (speed) - ຊຶ່ງແມ່ນຢາກະຕຸ້ນ ຊຸມິດ ນຶ່ງທີ່ສາມາດເສີມກຳລັງແລະເຮັດໃຫ້ຄົນບໍ່ຢາກນອນ.
- ຮາລູຊີໂນເຈິນ (hallucinogens) - ຢານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຫັນຫຼືໄດ້ຍິນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນຈິງ, ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເຫັນຫຼືໄດ້ຍິນສິ່ງທີ່ຜິດແປກໄປຈາກຄວາມຈິງ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ບາງຄົນທີ່ໃຊ້ຢາຮາລູຊີໂນເຈິນ ອາດເຫັນຈອກກາເຟຕົງເອງ, ຫຼື ຄິດວ່າລາຍຢູ່ຜາຕົງໄປມາ.

ຄົນໃຊ້ເອັກສເຕຊີແບບໃດ?

ຕາມປົກກະຕິ ຈະກິນກິນຢາເມັດນ້ອຍໆສີຂາວຫຼືສີເຫຼືອງຊຶ່ງມີມາໃນຮູບຮ່າງແລະຂະໜາດຕ່າງໆກັນ. ບາງຄົນກໍສັກ ເອົາກໍມີ.

ຜົນສະທ້ອນຂອງຢາເອັກສເຕຊີມີຫຍັງແດ່?

ຜົນສະທ້ອນອາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ສ່ວນປະກອບຂອງຢາແລະຕາມຄົນທີ່ໃຊ້ຢານັ້ນ. ຜົນຕ່າງໆກໍມີເຊັ່ນ ຮູ້ສຶກດີໃຈ, ໝັ້ນໃຈ ແລະ ເກີດຄວາມຮັກໃຄ່. ແຕ່ວ່າມັນອາດເຮັດໃຫ້ຄົນໃຊ້ຢາ ນັ້ນຮູ້ສຶກ ເປັນ ກັງວົນ, ວິຕົກເກີນເຫດ (ຢ້ານຄົນອື່ນມາທຳຮ້າຍຕົນ) ແລະ ເກີດຄວາມກົດດັນ. ຜົນສະທ້ອນ ລະຍະ ສັ້ນກໍມີເຊັ່ນ:

- ຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງຂຶ້ນແລະຄວາມດັນໂລຫິດສູງຂຶ້ນ
- ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍສູງຂຶ້ນແລະເຫືອອອກ
- ຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ - ນ້ຳໃນຮ່າງກາຍເຫືອດແຫ້ງ
- ກັດແຂ້ວແລະກັດຄາງກະໄຕ
- ບຸ້ນທ້ອງ

ເອັກສເຕຊີອັນຕະຖານປານໃດ?

ບາງຄົນຕາຍຍ້ອນຢາເອັກສເຕຊີເນື່ອງຈາກຜົນສະທ້ອນຢ່າງຮຸນແຮງ. ເຖິງວ່າຈະບໍ່ມີການຕາຍເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແຕ່ມັນກໍເປັນການຍາກທີ່ຈະເດົາວ່າຢານີ້ມີອັນຕະຖານຫຼາຍປານໃດ. ການຕາຍ ບາງເທື່ອເກີດ ຂຶ້ນ ຍ້ອນ:

- ຮ່າງກາຍຮ້ອນໂພດ - ການໃຊ້ຢາເອັກສເຕຊີປະສົມກັບການເຕັ້ນລຳເປັນເວລາຍາວນານ ອາດ ເຮັດ ໃຫ້ ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍສູງຂຶ້ນ, ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຂາດນ້ຳ. ຜູ້ໃຊ້ເອັກສເຕຊີຄວນ ດື່ມນ້ຳ 500ml ທຸກໆຊົ່ວໂມງຖ້າເຕັ້ນລຳຫຼືຢ່າງໄປມາ, ແລະ ຄວນດື່ມນ້ຳ 250ml ທຸກໆຊົ່ວໂມງ ຖ້າບໍ່ໄດ້ເຕັ້ນລຳ.
- ດື່ມນ້ຳຫຼາຍໂພດ - ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງບໍ່ດື່ມນ້ຳຫຼາຍໂພດບາດດຽວ ເພາະເຄີຍມີຄົນຕາຍ ຍ້ອນວ່າ ຖ້ານ້ຳຫຼາຍໂພດມັນຈະໄປກະທົບກະເທືອນສມອງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການໂຄມ່າ.
- ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະບໍ່ຂັບລົດຫຼັງຈາກໃຊ້ຢາເອັກສເຕຊີ ແລະບໍ່ໃຊ້ຢານີ້ປະສົມກັນກັບຢາອື່ນໆແລະບໍ່ໃຊ້ ເຂັມ ສັກຢາຮ່ວມກັນ ຖ້າໃຊ້ໂດຍການສັກເອົາ. ຜູ້ທີ່ບໍ່ວັດສ່ວນຕົວຫຼືຄອບຄົວມີບັດເປັນ ໂຮກຈິດ, ໂຮກ ກັງວິນ, ໂຮກຕື່ນກົວ, ໂຮກຫົວໃຈ, ຄວາມດັນໂລຫິດສູງ, ເບົາຫວານ, ມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບຕັບ ຫຼື ເປັນລົມຊັກ ບໍ່ຄວນໃຊ້ເອັກສເຕຊີ.

ເອັກສເຕຊີເຮັດໃຫ້ຕິດບໍ່?

ເປັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ເອັກສເຕຊີ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຕິດທາງຮ່າງກາຍເຊັ່ນເຮໂຣອິນຫຼືນິໂຄຕິນ, ເຊັ່ນວ່າ, ເຮັດໃຫ້ ເກີດ ອາການ ງ່ວມເຫງົາເມື່ອຢຸດກິນຢາ. ຢ່າງໃດກໍດີ, ບາງຄົນກໍຕິດຢາເອັກສເຕຊີໂດຍທາງຈິດ - ໝາຍຄວາມວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຢຸດກິນຢາໄດ້ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າຕ້ອງການມັນເພື່ອໃຫ້ໂຕເອງມ່ວນຂຶ້ນຫຼືຮູ້ສຶກມ່ວນໃຈ

ຜົນສະທ້ອນລະຍະຍາວຂອງເອັກສເຕຊີມີຫຍັງແດ່?

ໄດ້ມີຫຼັກຖານວ່າເອັກສເຕຊີສາມາດໄປກະທົບສມອງໄດ້, ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການກົດດັນແລະກັງວົນ. ຖ້າຈະເວົ້າ ໄປແລ້ວ ກໍມີຄົນຈຳນວນນ້ອຍທີ່ໃຊ້ເອັກສເຕຊີເປັນລະຍະຍາວ, ອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າ ອາການທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຄວາມ ສຸກມັກຖອຍລົງ ຖ້າໃຊ້ຢາເປັນລະຍະຍາວນານຕິດຕໍ່ກັນ.

ຈະຮູ້ຢ່າງໃດວ່າຄົນຜູ້ນຶ່ງໃຊ້ເອັກສເຕຊີ?

ເນື່ອງຈາກວ່າ ຜົນສະທ້ອນຂອງເອັກສເຕຊີ (ແລະຢາເສບຕິດອື່ນໆອີກຫຼາຍຊະນິດ) ມີອາການຄ້າຍຄື ກັນກັບ ລັກສະນະນິສັຍຂອງວັຍຣຸ່ນໂດຍທົ່ວໄປ (ເຊັ່ນ ອາຣົມປ່ຽນແປງ, ນອນຕື່ນສວຍເປັນເວລາຍາວ ນານ), ກໍເລີຍ ເປັນການຍາກທີ່ຈະແຍກແຍະ. ພໍ່ແມ່ທີ່ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຢາເສບຕິດຂອງ ຄົນໜຸ່ມ ຄວນຕິດ ຕໍ່ທ່ານໝໍ ຫຼື ສູນສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ເພື່ອຂໍເອົາຮາຍລະອຽດເລື່ອງບໍລິການກ່ຽວກັບ ການປິ່ນປົວ ຢາເສບຕິດ ແລະເຫຼົ່າ ໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ.

ຈະເຮັດຢ່າງໃດຖ້າມີໃຜຜູ້ນຶ່ງເຈັບປ່ວຍຍ້ອນໃຊ້ຢາເອັກສເຕຊີ ຫຼື ຢາເສບຕິດຢ່າງອື່ນ?

ຖ້າທ່ານສົງສັຍວ່າມີການເຈັບປ່ວຍຍ້ອນ ເອັກສເຕຊີ, ໃຫ້ເອີ້ນຮົດພຍາບານທັນທີ (ຕຳຮວດຈະບໍ່ມາກ່ຽວຂ້ອງ ເມື່ອເອີ້ນເອົາຮົດພຍາບານ).

ຖ້າທ່ານ ຕ້ອງການ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເລື່ອງການ ໂທຣະສັບເປັນພາສາອັງກິດ, ກະຣຸນາໂທຣະສັບຫາ ຜແນກ ແປ ເອກກະສານ ແລະ ແປ ພາສາ (TIS) ເບີໂທຣ 131 450.

ທ່ານສາມາດຫາເບິ່ງຂໍ້ມູນເລື່ອງສຸຂະພາບເປັນພາສາລາວຕື່ມໄດ້ທາງອິນເຕີແນັດ ທີ່ ເວັບ ໄຊຕ໌ ຂອງ Multicultural Communication ທີ່ <<http://mhcs.health.nsw.gov.au>>

ເບີໂທຣະສັບເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີ່ພົມເອກກະສານນີ້ ແຕ່ວ່າອາດມີການປ່ຽນແປງ. ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ກວດເບິ່ງເລກໂທຣ ໃນສມຸດໂທຣະສັບເບິ່ງໃໝ່.