

**ការធ្លាក់ចិត្តនៅក្នុងអម្ពូងពេលមានគភ៌និងភាពជាមាតានៅក្រៅដំបូង
Depression during Pregnancy and Early Parenthood**

ក្នុងអម្ពូងពេលមានគភ៌និងភាពជាមាតានៅក្រៅដំបូង ស្ត្រីខ្លះរាយការណ៍ថា គេមានអារម្មណ៍:

- ខឹង
- តានតឹងក្នុងចិត្ត
- ខ្វល់ខ្វាយដោយយល់ថាខ្លួនបានធ្វើខុស
- ច្របូកច្របល់
- ព្រួយតក់ហ្រាល់
- តូចចិត្ត
- ធ្លាក់ទឹកចិត្ត
- ភ័យខ្លាច

ស្ត្រីខ្លះបញ្ចេញមតិឲ្យដឹងថា:

- 'ខ្ញុំព្រួយពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងខ្លាំងមែនទែន។'
- 'ខ្ញុំចេះតែចង់យំគ្រប់ពេលទាំងអស់.....'
- 'ខ្ញុំមិនអាចផ្ទុះអារម្មណ៍បាន, ខ្ញុំដូចជាមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់...'
- 'ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ម្តងៗខ្លាំងម៉្លេះ នៅពេលដែលខ្ញុំមានកូនប្រុសដ៏ល្អបែបនេះទៅហើយនោះ?'
- 'ខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ ហើយគ្មានកម្លាំងកំហែងអ្វីទាំងអស់ ។'
- 'ខ្ញុំអស់កម្លាំង អស់កម្លាំងខ្លាំងមែនទែន ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចគេងបានសោះ។'
- 'មនុស្សផ្សេងទាំងពួងមានការចាប់អារម្មណ៍តែទៅលើកូនតូចនោះ...គ្មាននរណាមួយចាប់អារម្មណ៍អំពីអារម្មណ៍ខ្ញុំទេ។'
- 'ខ្ញុំមិនចង់ជួបនរណាមួយសោះ។'

បើសិនអ្នកជួបប្រទះនឹងអារម្មណ៍មួយចំនួនបែបនេះជារឿយៗនោះ អ្នកប្រហែលជាមានបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយ។

ការធ្លាក់ទឹកចិត្តបង្ការរំខានដល់ការស្រវឹងស្រ្តី នៅក្រៅដំបូងខ្លះមួយ ហើយអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅលើទារក កូនច្រើនទៀត និង ទំនាក់ទំនងរវាងដៃគូប្តីប្រពន្ធ។ កំរិតនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្ត ចំពោះឪពុកក៏មានការកើនឡើងគួរសមដែរ នៅឆ្នាំក្រោយពីកំណើតកូនរួចនោះ។

សញ្ញានិងអាការៈនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តរួមបញ្ចូល:

- តែងតែអស់កម្លាំងឬក៏ធ្វើសកម្មភាពហួសហេតុ។
- មិនអាចសំរានបានបើទុកជាមានឱកាសក៏ដោយ។
- ទ្រហោយដំបោយមិនអាចទប់បានឬក៏មានអារម្មណ៍រងរបួសទឹកភ្នែក។
- ដឹងថាអារម្មណ៍អ្នកមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំង។



A combined project of





- មានអារម្មណ៍ថាភាគច្រើន ឬក៏មិនចូលចិត្តសូនសម្លេងនិងការប៉ះពាល់។
- ចេះតែគិតអំពីរឿងរ៉ាវមិនល្អ។
- ការមានអារម្មណ៍មិនពិតថាខ្លួនអ្នកមានការខ្វះខាត។
- អាការៈគ្រុបសន្លប់ដោយការភ័យស្អប់និងតក់ក្រហល់ភ័យខ្លាចខ្លាំងហួស។
- មិនអាចផ្តល់អារម្មណ៍បាន។
- មានការភ្លេចភ្លាំងកាន់តែខ្លាំងឡើង។
- ភាពប្រឡំប្រលំប្រលងចិត្តនិងគិតថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តខុស។
- បាត់បង់នូវចំណាប់អារម្មណ៍ ក្នុងការរួមភេទ ឬក៏អ្វីៗផ្សេងទៀត ដែលអ្នកធ្លាប់ចូលចិត្ត។
- មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច កណ្តោចកណ្តែង ប៉ុន្តែក៏មិនចង់នៅជាមួយនរណាដែរ។
- ទទួលបានតិចពេកឬក៏ច្រើនពេក។
- មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមិនអាចដោះស្រាយអ្វីចេញ។
- ខ្វល់គិតមែនតែពីរឿងអ្វីមួយហួសហេតុឬមានគំនិតអំពីភាពទុក្ខសោកនិងសេចក្តីមរណា។
- មានគំនិតគិតអំពីការធ្វើបាបខ្លួនឬក៏ធ្វើបាបកូន។
- បាត់បង់នូវការទុកចិត្តជឿជាក់លើខ្លួនឯង ហើយនិងការគោរពទ្រង់ទ្រាយខ្លួនឯង។
- គ្មានសមត្ថភាពក្នុងការសប្បាយរីករាយ។

អារម្មណ៍សោកសៅជាប់ជានិច្ច ឬក៏រួមផ្សំជាមួយនឹងអារម្មណ៍ខ្លះៗ ដែលរៀបរាប់រួចមកហើយនេះ អស់រយៈពេលយ៉ាងតិចបំផុត 2 អាទិត្យ អាចជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយ។ បញ្ហានេះ អាចតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យវាយតម្លៃមែនទៀត និងការព្យាបាល។

មូលហេតុនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្ត

ការធ្លាក់ទឹកចិត្តអាចកើតមានគ្រប់ពេលទាំងអស់ នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ បញ្ហានេះជាទូទៅមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ធំៗខ្លះដែលត្រូវការការដោះស្រាយ។ ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំង៖

ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងគ្រួសារ៖

- ការលែងលះគ្នា។
- មរណភាព។
- ផ្លាស់ប្តូរផ្ទះ។
- អាពាហ៍ពិពាហ៍។
- កូនឬក៏សមាជិកណាមួយនៅក្នុងគ្រួសារបែកឆ្ងាយឬ ចាកចេញពីផ្ទះ។

ព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព៖

- របួស/ការបាត់បង់អ្វីមួយផ្ទាល់ខ្លួន។
- ជម្ងឺយាយីសមាជិកជិតជិតណាមួយនៅក្នុងគ្រួសារ។



ព្រឹត្តិការណ៍ថវិកា/ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ:

- ផ្តល់ប្រយោជន៍ការងារ។
- បាត់បង់ការងារ/ត្រូវគេបណ្តេញចេញពីការងារ។
- ដៃគូចាប់ផ្តើម/បញ្ឈប់កិច្ចការងារ។
- មានបំណុលឬក៏បាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិ។

មានកត្តានាំគ្រោះមួយចំនួនផងដែរ ដែលអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីងាយធ្លាក់ទឹកចិត្ត ទាំងនៅមុនពេលនិងក្រោយពេលសំរាលកូន។ កត្តាទាំងនេះរួមបញ្ចូល:

- ប្រវត្តិនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្ត។
- មានបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តកាលពីគ្រាមុនៗ។
- ទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយនឹងដៃគូ/គ្មានដៃគូ
- មានអារម្មណ៍គិតថាខ្លួនខ្វះខាតជួយឧបត្ថម្ភពីជនជិតស្និទ្ធ។
- កុមារភាពដែលមានការលំបាកឬក៏គ្មានការរីករាយ។
- បញ្ហាសុគតស្មារតីចំពោះមាតា ឬក៏ទារកនៅពេលឆ្លងទន្លេ។
- កំណើតកូនមិនគ្រប់ខែឬក៏លើសខែ ឬក៏កូនឆ្កោះ។
- មានអារម្មណ៍មិនល្អឬក៏មិនសូវមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូន។
- បញ្ហាជាមួយនឹងសុខភាពទារក។
- កូននោះមិនមែនជាកូនដែលខ្លួនចង់បាន (ដោយសាររូបរាងឬក៏ភេទជាដើម)
- ការបែកគ្នារវាងម្តាយនិងកូន។
- កូនដែលពិបាកក្នុងការមើលថែ (កាច, ដំណេកមិនទៀងទាត់ និងទម្លាប់បំប្រែ)
- កង្វះខាតធនធានឬថវិកា។
- ការមានផ្ទៃពោះដែលមិនបានគិតទុកជាមុន។
- ធ្លាប់មានប្រវត្តិអំពីការរំលោភ ឬក៏ធ្វើបាបផ្លូវភេទ។

គ្មាននរណាដឹងពិតប្រាកដឡើយអំពីមូលហេតុជាក់លាក់នៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តមុននិងក្រោយពេលកំណើតកូន។ កត្តានាំគ្រោះផ្សេងៗគ្នាមួយចំនួន មានឥទ្ធិពលទៅលើស្ត្រីនីមួយៗ ប៉ុន្តែភាពលំបាកតានតឹងក្នុងជីវិតរួមចំនែកគ្នា គួបផ្សំជាមួយនឹងកត្តាសង្គម អរម្មន និងផ្លូវកាយផង ដែលជំរុញឲ្យមានការធ្លាក់ទឹកចិត្ត។

មិនគួរមានការភាន់ច្រឡំរវាងការធ្លាក់ទឹកចិត្តក្រោយពីកំណើតកូនជាមួយនឹង ការម្តងសោកសៅក្នុងចិត្ត 'ឡើយ ។ ស្ត្រីដល់ទៅ 80% ជួបប្រទះនឹង 'ភាពម្តងសោកសៅក្នុងចិត្ត' ដែលច្រើនតែកើតមានឡើងខ្លាំង នៅពេល 3-5 ថ្ងៃក្រោយពីសំរាលទារករួច ហើយបង្កឡើងជាចំបងដោយការផ្តល់ប្រយោជន៍នៅពេលសំរាលកូន។ ស្ត្រីជាញឹកញាប់ មានអារម្មណ៍រលីងរលាងទឹកភ្នែក ហើយដូចជាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាសមស្រប:ពេល២-៣ថ្ងៃ។



ការយល់ដឹងថាការធ្លាក់ទឹកចិត្តជាបញ្ហាអាចព្យាបាលជាបាន គឺរឿងសំខាន់ ត្បិតអ្នកដែលមានបញ្ហានេះ អាចជាម្ចាស់ស្បើយវិញបាន បើសិនជាមានការព្យាបាលសមរម្យ (ឧទាហរណ៍ ការប្រើថ្នាំ និងការប្រឹក្សាប្តូរយោបល់) ការគាំទ្រពីគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិ ហើយនិងពេលវេលា។

ជំរើសនៃការព្យាបាល

ស្ត្រីមានជំរើសជាច្រើនសំរាប់ព្យាបាលបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្ត។ យើងសុំជូនយោបល់ជាដំបូងថា ការនិយាយប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិត, អ្នកគិលានុបដ្ឋាកសុខភាពគ្រួសារនិងកុមារ, វេជ្ជបណ្ឌិតបង្កើតកូនរបស់អ្នក ឬក៏អ្នកមានមុខវិជ្ជាជីវៈផ្នែកសុខភាពពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ដើម្បីឲ្យគេដឹងថាអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះនឹងអារម្មណ៍ខ្លះក្នុងចំណោមអារម្មណ៍រៀបរាប់រួចមកហើយនេះ។ នៅក្នុងករណីខ្លះ ការមានលទ្ធភាពទទួលស្គាល់ ហើយនិយាយអំពីអារម្មណ៍របស់អ្នក គឺជាការផ្តល់នូវឱកាសឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកធ្វើការបញ្ជាក់អះអាងស្តារទំនុកចិត្តសាឡើងវិញ និងគាំទ្រជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកជំនួយដែលអ្នកត្រូវការ។

ជំរើសទាំងនោះរួមបញ្ចូល:

- **ការប្រឹក្សាប្តូរយោបល់ផ្ទាល់**
អ្នកផ្តល់ការប្រឹក្សាស្តាប់បញ្ហារបស់អ្នក នៅក្នុងលក្ខណៈដែលមិនវាយតម្លៃនិច្ច័យ ហើយផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវការគាំទ្រដើម្បីជួយអ្នកឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ។
- **ការព្យាបាលផ្លូវចិត្ត**
ការព្យាបាលគឺធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់ការជួយគាំទ្រនិងបង្រៀនអ្នកនូវវិធីសាស្ត្រ សំរាប់ដោះស្រាយរោគសញ្ញា នៅគ្រាដែលធ្វើការដោះស្រាយនឹងកត្តាដើមមក ដែលប្រហែលជាធ្វើឲ្យអ្នករឹតតែឆាប់មានបញ្ហានេះ។
- **ការប្រឹក្សាប្តូរយោបល់ជាមួយនឹងដៃគូ**
ទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធមានការប្រែប្រួលនៅ ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ និងក្នុងភាពជាមាតា/បិតាគ្រាន់ដំបូង ហើយបញ្ហានៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងរវាងដៃគូអាចកើតមានឡើងជាក់ច្បាស់។ ការប្រឹក្សាប្តូរយោបល់ជួយឲ្យប្តីប្រពន្ធដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាដោយប្រសិទ្ធភាព ហើយជួយកែសំរួលទៅតាមការផ្លាស់ប្តូរដែលគេឆ្លងកាត់នៅគ្រាមុននិងក្រោយពេលកំណើតទារក។
- **ក្រុមឧបត្ថម្ភគាំពារ**
ក្រុមទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមជួយខ្លួនឯង រៀបចំឡើងដោយអ្នកដែលបានហែលឆ្លងនូវបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះ ឬក៏ក្រុមឧបត្ថម្ភគាំទ្រ ដែលផ្តល់នូវឱកាសសំរាប់ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ ទទួលព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ និងបង្កើតវិធីសាស្ត្រ ដើម្បីជំនះដោះស្រាយទៅលើការបំបាក់ទាំងនោះ។



• ការប្រើប្រាស់

ថ្វីបើការប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពក្តី ក៏ជាទូទៅគេមិនត្រូវប្រើប្រាស់តែឯងឡើយ ហើយប្រើប្រាស់តែប្រើដោយមានការអនុវត្តជាមួយនិងការប្រឹក្សាប្តូរយោបល់ ការព្យាបាលឬក៏សេវាឧបត្ថម្ភគាំពារដទៃទៀត។ ថ្នាំអាចនាំមកនូវការធ្វើទុក្ខខ្លះៗដែលនាំឲ្យមានការរំខាន។ អ្នកគួរតែសុំខំវាងពីវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ ហើយថាតើថ្នាំប្រឆាំងនឹងការធ្លាក់ទឹកចិត្តណាខ្លះដែលមានសុវត្ថិភាព សំរាប់ប្រើនៅពេលមានភ័យនិង/ឬក៏ពេលបំប្រាស់ដោះកូន។

• ការស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឬក៏មន្ទីរសំរាប់មាតានិងទារក

ម្តងម្កាល ស្រ្តីអាចឆ្លងកាត់នូវការធ្លាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដែលធ្វើឲ្យស្រ្តីនោះគម្រាមធ្វើបាបខ្លួនឯង ឬក៏កូនរបស់ខ្លួន។ ការស្នាក់នៅជាអ្នកជម្ងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសំរាប់មាតានិងទារក គឺជាការពិចារណាមួយដ៏សំខាន់។

បើសិនជាជនរងគ្រោះមានមន្ទីរនេះ ទីនោះនឹងផ្តល់កន្លែងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមួយសំរាប់មាតានិងទារករបស់គាត់ ដើម្បីឲ្យមានការឃ្នាំពិនិត្យមើល 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។

មន្ទីរខ្លះក៏ផ្តល់នូវកម្មវិធីមួយចំនួនសំរាប់ស្រ្តីនិងដៃគូរបស់គេ ក្នុងការដោះស្រាយនិងបញ្ហាទំនាក់ទំនង ប្តីប្រពន្ធ ជំនាញការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូន និងទំនាក់ទំនងរវាងកូននិងម្តាយ។

មន្ទីរថែទាំគ្រួសារ (Karitane & Tresillian) សំរាប់ការស្នាក់នៅ ក៏អាចជួយផ្តល់នូវការស្នាក់នៅក្នុងបែបផែនជាអ្នកជម្ងឺ ដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហានៃឥរិយាបថពាក់ព័ន្ធនឹងទារក។

វិធីសាស្ត្រមានប្រយោជន៍សំរាប់ដោះស្រាយ ចំពោះការមានគភ៌និងគ្រាដំបូងនៃភាពជាមាតា/បិតា
មានកិច្ចការជាច្រើនដែលស្រ្តីនិងដៃគូរបស់គេអាចធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍នៃការមានគភ៌និងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូន មានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងមុន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការជូនយោបល់ខ្លះៗ:

ចំពោះមាតា

- មានការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើននៅពេលមានគភ៌ ហើយការផ្លាស់ប្តូរនេះអាចនាំឲ្យមានភាពតានតឹង។ សូមជ្រាបអំពីរឿងនេះ ហើយពិភាក្សាអំពីរឿងនេះ។
- រៀបចំផែនការដើម្បីឲ្យមានជំនួយបន្ថែមទៀតនៅក្នុង១ខែ ២ខែ ដំបូង ដោយសុំឲ្យដៃគូអ្នកឬក៏សមាជិកគ្រួសារអ្នកស្នាក់នៅផ្ទះជាមួយអ្នក។
- ពិភាក្សាជាមួយនិងដៃគូរបស់អ្នក អំពីភាពខុសប្លែកនៅក្នុងជីវិតដែលអ្នកយល់ថា កើតមានឡើងដោយសារទារក ហើយនិងការប្រែប្រួលដែលអ្នកត្រូវអនុវត្ត ឧទាហរណ៍ ចរចាករិធីសំរាប់ការចែករំលែកការងារជាប្រចាំនៅក្នុងផ្ទះ។
- ព្យាយាមកុំធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរធំៗក្នុងជីវិត (ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរការងារ) នៅក្នុងពេល២-៣ខែដំបូងក្រោយពីអ្នកសំរាលបុត្ររួច ឬក៏នៅគ្រាមានគភ៌ចាស់ខែហើយនោះ។



- ថែទាំការងារការប្រារម្ភរបស់អ្នក ជាមួយនិងជនណាមួយដែលអ្នកទុកចិត្ត។
- ឲ្យពេទ្យឆែកពិនិត្យសុខភាពជាទៀងទាត់។
- ជឿទុកចិត្តលើការវាយតម្លៃរបស់ខ្លួន ហើយរំលឹកប្រាប់ខ្លួនឯងថា អ្វីៗនឹងអាចធ្វើទៅបាន នៅក្រៅដែលអ្នករៀបចំខ្លួនទទួលយកតួនាទីថ្មី។
- រក្សានូវភាពកំប្លែងក្រមិចក្រមើម។
- ហៅឲ្យដៃគូចូលរួមនៅក្នុងការថែទាំកូនឱ្យចាប់ផ្តើមពីគ្រាដំបូង។
- សាកព្យាយាមសំរាកនិងសំរាននៅពេលដែលទារកគេង។
- ទៅជួបឲ្យបានស្គាល់គិលានុបដ្ឋាកសុខភាពគ្រួសារនិងកុមារ ឬក៏ក្រុមមាតា ដើម្បីពង្រីក ប្រព័ន្ធខបត្ថម្ភគាំពាររបស់អ្នក។
- សូមរកនរណាមួយដែលគួរឲ្យទុកចិត្តពីងពាក់បាន ឲ្យមើលទារកអ្នក ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចដក ហ្ន៎ចំណាយពេលជាមួយនិងដៃគូតែពីរនាក់។

ចំពោះបិតា

- សូមជំរុញឲ្យដៃគូរបស់អ្នកស្វែងរកជំនួយពីអ្នកមានជំនាញការ បើសិនជាត្រូវការជំនួយ ហើយ គួរតែទៅជាមួយដៃគូដើម្បីឲ្យបានជាគ្នា។
- ត្រូវដឹងអំពីសុខភាពនិងសុខុមាលភាពផ្ទាល់ខ្លួនអ្នក ហើយស្វែងរកជំនួយពីអ្នកមានជំនាញការ ដោយ ខ្លួនឯង បើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្ត។
- ផ្តល់នូវការធានាអះអាងស្តារទំនុកចិត្តឡើងវិញ និងការជួយគាំទ្រដល់ដៃគូអ្នក។
- ចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការថែទាំទារកក្មេងខ្ចីរបស់អ្នក។
- ព្យាយាមយល់ដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់ដៃគូអ្នក ហើយផ្តល់ប្តូរនូវការសង្ឃឹមរំពឹងទៅលើគាត់។
- ទទួលយកនូវសំណើផ្តល់ជំនួយសមរម្យពីអ្នកដទៃ។
- គ្រោងរៀបពេលវេលាជាមួយគ្នាក្នុងឋានៈជាដៃគូ ហើយធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាចំពោះសកម្មភាពទាំង ឡាយណាដែលអ្នកធ្លាប់ចូលចិត្តធ្វើមុនពេលមានកូនខ្ចីនេះ។
- ត្រូវដឹងថា ចំណង់ផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រីជាញឹកញាប់មានការធ្លាក់ចុះថយ ក្រោយពីសំរាលកូនរួច។ សូមបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពស្និទ្ធស្នាល ដោយគ្មានការដាក់សម្ពាធនៅលើការរួមភេទ។

អ្នកអាចចាត់វិធានការខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ....

ស្ត្រីជាច្រើនមានអារម្មណ៍ខ្លាស់អៀន បើសិនជាគេមិនអាចបំបាត់ដោះស្រាយបាន ដោយមានជំនឿថា រឿងនេះ គប្បីជាពេលដឹករាយបំផុតនៃជីវិតរបស់គេ។

ការដឹងខ្លួនទទួលស្គាល់ថា ហេតុការណ៍ទាំងឡាយបានកើតមានឡើង ហើយការដឹងខ្លួនថា ការស្វែងរកជំនួយ គឺជារឿងធម្មតា ហើយការនិយាយប្រាប់គេឯងថា អ្នកមានអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្ត ព្រួយតក់ក្រហល់ ខឹង ឬក៏ច្របូកច្របល់ គឺជារឿងសំខាន់។



ការធ្លាក់ទឹកចិត្តមិនមែនសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលអ្នកអាចដោះស្រាយបានដោយខ្លួនឯងឡើយ ហើយផ្នែកដែល ពិបាកបំផុតនោះ គឺការស្វែងរកជំនួយ។ កូនសៀវភៅនេះគួរតែជួយអ្នកក្នុងការជ្រើសរើសយកជំហានដំបូង ទាំងឡាយ ដើម្បីរើបម្រុងខ្លួនចេញពីបញ្ហានេះ។

សូមចងចាំថា ការធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺជាបញ្ហាអាចព្យាបាលបាន ហើយជាបញ្ហាដែលអ្នកដែលអាចរើបម្រុងខ្លួនចេញ បាន។

ស្វែងរកជំនួយ

- ស្វែងរកជំនួយពីអ្នកមានជំនាញក្នុងការធ្វើការងារ ជាមួយនឹងស្ត្រីដែលមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ពាក់ព័ន្ធនឹងកំណើតទារក។ វេជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើនក៏មានសេចក្តីរក្សាយក្នុងការផ្តល់សេវានេះ ឬក៏ធ្វើ ការបញ្ជូន បើសិនជាកិច្ចការនេះ ជារឿយសមរម្យក្នុងអន្តរកាល។
- សាកសួរស្ត្រីដទៃទៀតដែលអ្នកដឹងអំពីបទពិសោធន៍របស់គេ ហើយអំពីរបៀបដែលគេបានដោះ ស្រាយទប់ទល់នឹងបញ្ហា ពាក់ព័ន្ធនឹងការមានផ្ទៃពោះនិងភាពជាមាតា។ ចូរសាកសួរស្ត្រីទាំងនោះ អំពីទីកន្លែងនិងនរណាដែលគេស្វែងរកជំនួយ។
- ស្វែងរកនរណាម្នាក់ (មិត្តភក្តិ, សាច់ញាតិ ឬក៏សហការី) ដែលស្តាប់ការសារសម្រាប់អ្នកដោយយក ចិត្តទុកដាក់និងដោយគាំទ្រ ហើយដោយគ្មានការវាយតម្លៃ ហើយជាអ្នកដែលទំនងជាយល់ស្តាប់អ្វីដែល អ្នកកំពុងតែហែលឆ្លង និងជាជនដែលអ្នកមានអារម្មណ៍សុខស្រួលក្នុងការនិយាយជាមួយ និងសាកសួរ សំណួរទាំងពួង។

បើសិនជាអ្នកមានការប្តូរអំពីរបៀបដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ ឬក៏ទប់ទល់ដោះស្រាយនិងភាពជាមាតានេះ សូម ពិភាក្សា ជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នក ឆ្លុប វេជ្ជបណ្ឌិតបង្កើតកូន ឬក៏គិលានុបដ្ឋាកសុខភាពគ្រួសារនិងកុមារ។

បើសិនជាអ្នកត្រូវការខ្លាំងពីអ្នកឯកទេស ស្តីអំពីការធ្លាក់ទឹកចិត្តក្រោយពេលសំរាលកូនរួច អ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅ Transcultural Mental Health Centre (មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពផ្លូវចិត្តឆ្លងកាត់វប្បធម៌) តាមរយៈទូរស័ព្ទ (02) 9840 3800 ។

បើសិនជាលោកអ្នកត្រូវការជំនួយដើម្បីប្រើទូរស័ព្ទជាភាសាអង់គ្លេស សូមទូរស័ព្ទទៅសេវាបកប្រែភាសា (TIS) លេខ 131 450 ដែលអាចទាក់ទង Transcultural Mental Health Centre ជំនួសឱ្យអ្នកបាន។

អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានអំពីសុខភាពថែមទៀតជាភាសាអ្នក នៅតាមគេហទំព័រនៃអ៊ិនធឺណិត របស់អង្គការ Multicultural Communication (ទំនាក់ទំនងពហុវប្បធម៌) នៅឯ <http://mhcs.health.nsw.gov.au> ។

លេខទូរស័ព្ទទាំងនេះគឺជាលេខត្រឹមត្រូវនៅគ្រាដែលបោះពុម្ពផ្សាយ ប៉ុន្តែមិនបានទទួលការកែតម្រូវជាហូរហែទេ។ លោកអ្នកប្រហែលជាត្រូវតែងតែរកលេខទូរស័ព្ទទាំងនេះ នៅតាមសៀវភៅទូរស័ព្ទហើយ។