

ໂຮກໄຂ້ຫວັດນົກ Avian Influenza (“Bird Flu”)

ສບັບວັນທີ: 9 ກັນຍາ 2005

ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໂຮກໄຂ້ຫວັດມີຄວາມກັງວົນຢ້ານວ່າໂຮກ H5N1 ທີ່ລະບາດກັບນົກເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ອາດເກີດການປ່ຽນແປງກາຍເປັນໂຮກໄວຣັສຈຳພວກໄຂ້ຫວັດຊຸມໃໝ່ຂຶ້ນ. ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການລະບາດຂອງໂຮກໄຂ້ຫວັດແຜ່ໄປທົ່ວໂລກຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຮອດປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີກໍຣະນີ ສົງສັຍ ຫຼືຍັງຢືນວ່າມີໄຂ້ຫວັດນີ້ໃນ ອອສເຕຣເລັຍ.

ໄຂ້ຫວັດນົກແມ່ນຫຍັງ?

ໄຂ້ຫວັດນົກແມ່ນພຍາດຕິດຕໍ່ຊຸມນຶ່ງຂອງນົກ. ຕາມປົກກະຕິ ເຊື້ອໂຮກໄວຣັສຈະຕິດຕໍ່ແຜ່ຜ່າຍກັນ ໃນລະຫວ່າງ ຜູງນົກປ່າ ແລະບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພຍາດໃດໆຫຼືຈະມີກໍຣະນີແຕ່ພຍາດທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ. ການຕິດເຊື້ອໃນກຸ່ມສັດປີກລ້ຽງ, ເຊັ່ນໄກ່, ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດພຍາດຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນກຸ່ມສັດປີກເຫຼົ່ານີ້. ພຍາດໄຂ້ຫວັດນົກມີຫຼາຍຊຸມ ດ້ວຍກັນ, ແຕ່ວ່າມີພຽງສອງສາມຊຸມເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນພຍາດຂຶ້ນໄດ້ກັບມະນຸດ.

ໂຮກໄຂ້ຫວັດນົກຊຸມໃໝ່ຊຸມນຶ່ງ, ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ ໄຂ້ຫວັດປະເພດ A H5N1, ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 1997 ທີ່ປະເທດຮົງກົງ. ພຍາດຊຸມນີ້ໄດ້ກັບຄືນມາອີກເມື່ອທ້າຍປີ 2003 ແລະໄດ້ແຜ່ຂຍາຍຢ່າງໄວ ໄປສູ່ຫຼາຍປະເທດໃນເອເຊັຍ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນຜູງສັດປີກລ້ຽງຫຼາຍແຫ່ງ. ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີຫຼັກຖານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໄດ້ມີການຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດນົກໃນຜູງນົກໃນອອສເຕຣເລັຍ.

ໄວຣັສຊຸມນີ້ໄດ້ແຜ່ເຊື້ອໄປຫາຄົນທີ່ໃກ້ຊິດກັບສັດປີກທີ່ເຈັບປ່ວຍຫຼືອາຈົມຂອງສັດເຫຼົ່ານັ້ນ. ນັບແຕ່ ວັນທີ 28 ເດືອນທັນວາ ປີ 2003 ເປັນຕົ້ນມາ, ໄດ້ມີກວ່າ 110 ກໍຣະນີ ຊຶ່ງໄດ້ມີລາຍງານຍັງຢືນວ່າ ແມ່ນກໍຣະນີຂອງໄຂ້ຫວັດນົກ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຄົນ ໃນປະເທດໄທ, ວຽດນາມ, ກຳປູເຈັຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊັຍ, ແລະຫຼາຍຄົນ ທີ່ເປັນໄຂ້ຫວັດນົກໄດ້ເສັຍຊີວິດ.

ຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ A H5N1 ບໍ່ປາກົດວ່າສາມາດແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ໂດຍງ່າຍ. ການຢູ່ໃກ້ຊິດກັບສັດທີ່ຕິດເຊື້ອຫຼືອາຈົມຂອງສັດເຫຼົ່ານັ້ນ (ຫຼືຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ຂີ້ດິນທີ່ມີເຊື້ອໂຮກຈາກອາຈົມຂອງສັດປີກ) ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອຂຶ້ນກັບຄົນໄດ້. ການກິນອາຫານທີ່ຜິດຈາກສັດປີກທີ່ປຸງຈົມສຸກດີຫຼືໄຂ່ໄກ່ທີ່ປຸງສຸກແລ້ວ ຈະບໍ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດຕິດເຊື້ອ.

ການລະບາດຂອງໂຮກ (epidemic) ທີ່ເກີດຂຶ້ນທົ່ວໂລກແລະເປັນກັນແຜ່ຫຼາຍ ເອີ້ນວ່າ ການລະບາດຂອງໂຮກຢ່າງກວ້າງຂວາງຮ້າຍແຮງ (pandemic). ການລະບາດຢ່າງກວ້າງຂວາງຮ້າຍແຮງສາມາດອຸບັດຂຶ້ນໄດ້

ເມື່ອມີເຊື້ອໄວຣັສຊນິດໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ມະນຸດຍັງມີພູມຕ້ານທານຕໍ່າ ຕໍ່ພຍາດຊນິດນັ້ນ ຫຼື ຍັງບໍ່ມີເລີຍ. ໂຮກຫວັດທີ່ລະບາດຢ່າງຮ້າຍແຮງເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນໃນປີ 1918-19, 1957-58 ແລະ 1968-69. ເມື່ອໂຮກລະບາດຮ້າຍແຮງເກີດຂຶ້ນໃນປີ 1918-19, ໄດ້ມີຄົນຕາຍເປັນຈໍານວນ ລະຫວ່າງ 20 ຫາ 40 ລ້ານຄົນ. ນັກວິທະຍາສາດຫຼາຍທ່ານມີຄວາມກັງວົນຢ້ານວ່າ ເຊື້ອໂຮກ H5N1 ທີ່ລະບາດຂຶ້ນໃນຝູງນົກເມື່ອບໍ່ດົນມາ ນີ້ອາດເກີດການປ່ຽນແປງກາຍເປັນເຊື້ອໄວຣັສໄຂ້ຫວັດຊນິດໃໝ່ທີ່ແຜ່ຜ່າຍຢ່າງງ່າຍດາຍລະຫວ່າງຄົນ, ຊຶ່ງຈະເປັນຜົນໃຫ້ເກີດການລະບາດ ຂອງເຊື້ອໂຮກ ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະຮ້າຍແຮງ.

ອາການຂອງໂຮກນີ້ມີຫຍັງແດ່?

ໄຂ້ຫວັດນົກຊນິດຕ່າງໆ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແຕກຕ່າງກັນໄປເມື່ອເກີດຂຶ້ນກັບຄົນ. ໄຂ້ຫວັດນົກທຸກຊນິດສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການທີ່ຄ້າຍຄືກັບໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ແບບທັມມະດາທົ່ວໄປຂອງຄົນ (ເປັນໄຂ້, ໄອ, ເມື່ອຍອ່ອນເພີຍ, ປວດຕາມກ້າມເນື້ອ, ເຈັບຄໍ, ຫັນໃຈຝັດ, ຂໍ້ມູກໄຫຼ, ເຈັບຫົວ). ໃນບາງກໍລະນີ ເຊື້ອໂຮກຊນິດ H5N1 ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການເປັນໂຮກປອດບວມຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະໃນກໍລະນີສ່ວນນ້ອຍ, ຄົນເຈັບອາດ ເປັນໂຮກ ເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບ ຫຼື ຖອກທ້ອງໄດ້. ອາການທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນກັບຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອຊນິດ H7 ແມ່ນເປັນໂຮກຕາແດງ (ເຍື່ອຫຸ້ມຕາຂາວອັກເສບ). ຕາມປົກກະຕິ ອາການຕ່າງໆຈະສະແດງອອກໃນ ລະຫວ່າງ ສອງຫາສີ່ ມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເຊື້ອ.

ແມ່ນໃຜແດ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອນີ້?

ຄົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ. ຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ H5N1 ແມ່ນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ຊິດກັບນົກທີ່ເຈັບປ່ວຍຫຼືອາຈົມຂອງມັນ ໃນລະຫວ່າງທີ່ພັກອາໄສຢູ່ຫຼືເດີນທາງໄປໃນເຂດທີ່ເຊື້ອໂຮກກຳລັງແຜ່ຜ່າຍໝູນວຽນຢູ່, ຫຼືວ່າ (ແຕ່ວ່າເປັນສ່ວນນ້ອຍ) ຜູ້ທີ່ໃກ້ຊິດກັບຄົນທີ່ມີເຊື້ອໂຮກແບບພຍາດຂອງຄົນຢູ່ໃນຕົວ ແລະ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ເຊື້ອກຳລັງແຜ່ຜ່າຍຢູ່.

ຈະປ້ອງກັນໂຮກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ການສັກຢາປ້ອງກັນພຍາດໄຂ້ຫວັດນົກໃຫ້ມະນຸດຍັງບໍ່ທັນມີເທື່ອ. ຢາສັກປ້ອງກັນຫວັດຂອງຄົນແບບທັມມະດາ ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນຈະບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໂຮກຈາກໄຂ້ຫວັດນົກໄດ້, ຊຶ່ງຮວມເຖິງເຊື້ອໂຮກ ຊນິດ H5N1 ດ້ວຍ. ປັດຈຸບັນນີ້ ນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກກຳລັງສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອຜລິດຢາສັກ ປ້ອງກັນ ທີ່ເໝາະສົມ ຕໍ່ໂຮກຊນິດນີ້.

ຈະກວດຫາພຍາດນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ການກວດຫາໂຮກໄຂ້ຫວັດນົກສາມາດກະທຳໄດ້ໂດຍໃຊ້ຕົວຢ່າງຂອງເລືອດ, ຂີ້ເຖົ້ ຫຼື ຈາກເນື້ອເຍື່ອໃນດັງ ແລະ ຮູຄໍ. ການວິຈັຍແມ່ນເຮັດທີ່ຫ້ອງທົດລອງພິເສດສະເພາະ.

ຈະປິ່ນປົວພຍາດນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຢາຕ້ານເຊື້ອຫວັດຊນິດນີ້ໂດຍສະເພາະອາດໃຊ້ເປັນຜົນໃນການຕໍ່ຕ້ານໂຮກໄຂ້ຫວັດນົກທີ່ເກີດກັບຄົນແລະ ນຳມາໃຊ້ປົວຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອພຍາດຊນິດ H5N1 ນີ້.

ມີການຮັບມືວິທີໃດເພື່ອສຸຂະພາບຂອງຂຸມຊີນ?

ການລະບາດຂອງໂຮກໄຂ້ຫວັດນິກຊິນດ່າງໆເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນໃນອອສເຕຣເລັຍ. ຢ່າງໃດກໍດີ, ຍັງບໍ່ໄດ້ມີລາຍງານວ່າມີໄຂ້ຫວັດນິກຊິນລະບາດຂຶ້ນຫວ່າງບໍ່ດົນນີ້ ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດອອສເຕຣເລັຍເທື່ອ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ມີລາຍງານວ່າມີຄົນອອສເຕຣລຽນຕິດເຊື້ອໄວຣັສ H5N1 ນີ້ເທື່ອ. ປະເທດອອສເຕຣເລັຍ ບໍ່ໄດ້ນຳເຂົ້າສັດປີກທີ່ມີຊີວິດ ຫຼື ຜລິຕັພັນສັດປີກດິບຈາກປະເທດເອເຊັຍ ແລະ ໄດ້ມີການກວດຂັ້ນຕາມຊາຍແດນ ຂອງປະເທດ ອອສເຕຣເລັຍ ບໍ່ໃຫ້ມີການນຳເອົານົກຫຼືຜລິຕັພັນຈາກນົກເຂົ້າປະເທດໂດຍຜິດກົດໝາຍ.

ຄຳເຕືອນເຮືອງການເດີນທາງ

ຄົນອອສເຕຣລຽນທີ່ເດີນທາງໄປໃນເຂດທີ່ມີໂຮກໄຂ້ຫວັດນິກລະບາດ ສາມາດລົດຜ່ອນການສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໂຮກໄດ້ໂດຍຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄປຟາມລ້ຽງສັດປີກ ແລະ ຕລາດທີ່ຂາຍສັດປີກທີ່ຍັງເປັນ. ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າເມື່ອຈັບຕ້ອງສັດປີກທີ່ຍັງເປັນ ຫຼື ຈັບບາຍໄຂ່ຕ້ອງຈັບບາຍໃຫ້ຖືກຫຼັກອະນາມັຍ, ໂດຍການລ້າງມືຫຼັງຈາກຈັບຕ້ອງ ຂອງ ເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າສັດປີກນັ້ນໄດ້ປຸງຈົນສຸກດີຢ່າງທົ່ວເຖິງກ່ອນກິນ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

Australian Government Department of Health and Ageing information hotline
1800 004 599.

ຂໍ້ມູນເຊື່ອມໂຍງ (Related links)

NSW Health influenza factsheet (usual human influenza)
<http://www.health.nsw.gov.au/pubs/topics/Influenza.pdf>

Australian Government Department of Health and Ageing – Avian influenza
http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/Content/health-avian_influenza-index.htm

World Health Organization
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en

Travel Advice (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade)
<http://www.smarttraveller.gov.au>

U.S. Centers for Disease Control and Prevention
<http://www.cdc.gov/flu/avian/index.htm>

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ – ໜ່ວຍສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຣັດ ນຊວ (Public Health Units in NSW)					
ຖ້າຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະຮຸນາຕິດຕໍ່ທ່ານໝໍຂອງທ່ານ, ໜ່ວຍສາທາລະນະສຸກຫຼືສູນອະນາມັຍຊຸມຊົນ ໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ – ໃຫ້ເບິ່ງພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ NSW Government ຊຶ່ງຢູ່ທາງໜ້າຂອງສມຸດໂທຣະສັບ White Pages.					
ເຂດໃນຕົວເມືອງ Metropolitan Areas			ເຂດຊົນນະບົດ Rural Areas		
Northern Sydney	Hornsby	02 9477 9400	Greater Southern	Goulburn	02 4824 1837
/ Central Coast	Gosford	02 4349 4845		Albury	02 6021 4799
South Eastern	Randwick	02 9382 8333	Greater Western	Broken Hill	08 8080 1499
Sydney / Illawarra	Wollongong	02 4221 6700		Dubbo	02 6841 5569
Sydney South	Camperdown	02 9515 9420		Bathurst	02 6339 5601
West	Liverpool	02 9828 5944			
Sydney West	Penrith	02 4734 2022	Hunter / New	Newcastle	02 4924 6477
	Parramatta	02 9840 3603	England	Tamworth	02 6767 8630
Justice Health Service	Matraville	02 9289 2977	North Coast	Port Macquarie	02 6588 2750
				Lismore	02 6620 7500
NSW Department of Health	Nth Sydney	02 9391 9000			
NSW Health website	www.health.nsw.gov.au				
					© NSW Department of Health 2005

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການໂທຣະສັບເປັນພາສາອັງກິດ, ກະຮຸນາໂທຣຫາຜແນກແປເອກກະສານແລະແປພາສາ (TIS) ທີ່ ເລກໂທຣ 131 450.

ບັນດາເລກໂທຣະສັບແມ່ນຖືກຕ້ອງເມື່ອເວລາເອກກະສານນີ້ພິມອອກ ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ມີການກວດເບິ່ງການປຸງແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ທ່ານຄວນກວດເບິ່ງເລກໂທຣອີກເທື່ອນຶ່ງ ໃນສມຸດໂທຣະສັບ ເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈ.

ທ່ານສາມາດຫາເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເປັນພາສາລາວໄດ້ ທີ່ເວັບໄຊຕ໌ ຂອງ Multicultural Communication ທີ່ <http://mhcs.health.nsw.gov.au>