

ການຕິດເຊື້ອໄວຣັສບາຣ໌ມາພໍແຣສ Barmah Forest virus infection

ບາຣ໌ມາພໍແຣສແມ່ນຫຍັງ?

- ເຊື້ອໄວຣັສບາຣ໌ມາພໍແຣສແມ່ນພຍາດຊຸມິດນຶ່ງຊຶ່ງສາມາດແຜ່ຜາຍເຊື້ອເຖິງຄົນໄດ້ໂດຍການຖືກຍູງກັດ.
- ການທີ່ເຄີຍຕິດເຊື້ອບາຣ໌ມາພໍແຣສມາກ່ອນອາດປ້ອງກັນຈາກການຕິດເຊື້ອໃນອະນາຄົດໄດ້.
- ເຊື້ອໄວຣັສບາຣ໌ມາພໍແຣສມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັນກັບເຊື້ອໄວຣັສ ຣອສຣີເວີ (Ross River).

ເຊື້ອໄວຣັສບາຣ໌ມາພໍແຣສແຜ່ຜາຍຢ່າງໃດ?

- ເຊື້ອໄວຣັສນີ້ແຜ່ຜາຍໂດຍຍູງໂຕແມ່ບາງຊຸມິດ
- ຍູງໂຕແມ່ຈະດູດກິນເລືອດສັດແລະຄົນ. ຖ້າມັນດູດກິນເລືອດສັດທີ່ຕິດເຊື້ອຢູ່ແລ້ວ, ຍູງໂຕນັ້ນກໍອາດຕິດເຊື້ອໄປນຳ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຊື້ອໄວຣັສກໍຈະແຜ່ເຊື້ອໄປຫາສັດໂຕຕໍ່ໄປຫຼືຄົນ ຕໍ່ໄປທີ່ມັນດູດເລືອດ.
- ມີການເຊື່ອກັນວ່າ ສັດພື້ນບ້ານເຊັ່ນ ແຄ້ງກາຣູ ແລະ ວອລລາບີ ເປັນສາເຫດໃຫຍ່ໃນການເຮັດໃຫ້ການຕິດເຊື້ອນີ້ໝູນວຽນໄປມາ.
- ເຊື້ອໄວຣັສນີ້ຈະບໍ່ແຜ່ໂດຍຕົງຈາກຄົນນຶ່ງໄປຫາອີກຄົນນຶ່ງ.

ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອບາຣ໌ມາພໍແຣສຈະມີອາການຢ່າງໃດແດ່?

- ມີຫຼາຍຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສນີ້ແລ້ວແຕ່ບໍ່ມີອາການຫຍັງເລີຍ.
- ອາການຂອງເຊື້ອບາຣ໌ມາພໍແຣສຄ້າຍຄືກັນກັບການຕິດເຊື້ອໄວຣັສຣອສຣີເວີ.
- ອາດຈະເກີດອາການຄ້າຍໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ມີອາການຄົງຮ້ອນ, ໜາວສັ່ນ, ເຈັບຫົວ, ແລະເຈັບຕາມກ້າມເນື້ອແລະຕາມຂໍ້.
- ບາງຄົນກໍອາດມີອາການໃຄ່ແລະປວດຕາມຂໍ້, ຊຶ່ງຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນຍາມເຊົ້າ.
 - ບາງເທື່ອຈະເກີດເປັນຕຸ່ມຜືນແດງຕາມຮ່າງກາຍ ຫຼືຕາມ ແຂນ ຫຼືຂາ. ຕຸ່ມນີ້ຕາມປົກກະຕິ ຈະ ຫາຍໄປຫຼັງຈາກເຈັດຫາສິບວັນ.
 - ໃນລະຫວ່າງທີ່ເປັນພຍາດຢູ່ນັ້ນ ບາງຄັ້ງ ອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍທົ່ວໄປໃນໂຕ, ພ້ອມທັງ ຮູ້ສຶກເມື່ອຍຫຼືອ່ອນເພັຍ. ອາການເຫຼົ່ານີ້ອາດເຮັດໃຫ້ມີຜົນສະທ້ອນ ຕໍ່ ທັງການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ປະສິດທິພາບ ໃນການເຮັດວຽກ.

ດົນປານໃດຈຶ່ງອອກອາການຫຼັງຈາກຖືກຍູງທີ່ມີເຊື້ອກັດແລ້ວ?

- ອາການຕ່າງໆຈະເລີ້ມໃນລະຫວ່າງ 5-21 ມື້, ແຕ່ວ່າຕາມປົກກະຕິແມ່ນໃນລະຫວ່າງ 7-10 ມື້ຫຼັງຈາກຖືກຍູງທີ່ມີເຊື້ອໂຣກັດ.

ຈະເປັນພຍາດນີ້ດົນປານໃດ?

- ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈະເຊົາຫາຍຂາດຫຼັງຈາກສອງສາມອາທິດ. ຄົນອື່ນໆອາດມີອາການເປັນໆ ຢຸດໆ ຢູ່ເກີນ ສາມເດືອນ, ແລະໃນກໍລະນີນ້ອຍທີ່ສຸດຊຶ່ງມີອາການເກີນກວ່ານັ້ນໆ.
- ຄົນທີ່ເປັນພຍາດນີ້ສາມາດເຊົາຫາຍຂາດໄດ້.

ການປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອບາຣ໌ມາພໍແຣສມີແບບໃດແດ່?

- ບໍ່ມີການປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ບາຣ໌ມາພໍແຣສແບບໃດແບບນຶ່ງສະເພາະ.
- ທ່ານໝໍຂອງທ່ານຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ບັນເທົາອາການບໍ່ສະບາຍໃນໂຕທີ່ເກີດຈາກອາການຕ່າງໆ ໄດ້.
- ການພັກຜ່ອນໃຫ້ເຕັມປຸງມ, ພ້ອມທັງອອກແຮງກາຍປານກາງ ແລະ ກິນອາຫານ ໃຫ້ຖືກຫຼັກ ອະນາມັຍ, ອາດຊ່ວຍໃຫ້ເຊົາຈາກພຍາດໄດ້.

ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າຂ້ອຍຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ບາຣ໌ມາພໍແຣສ ແລ້ວ?

- ຖ້າທ່ານມີອາການ, ໃຫ້ໄປຫາທ່ານໝໍ, ເພິ່ນສາມາດສັ່ງໃຫ້ກວດເລືອດເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານ ຕິດເຊື້ອ ໄວຣັສ ບາຣ໌ມາພໍແຣສ ຫຼືບໍ່.

ຈະປ້ອງກັນພຍາດບາຣ໌ມາພໍແຣສ ໄດ້ຫຼືບໍ່?

- ການປ້ອງກັນທີ່ໄດ້ຜົນທີ່ສຸດກໍແມ່ນໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນຈາກການຖືກຍູງກັດ, ໂດຍສະເພາະໃນລະຫວ່າງ ຣະດູຮ້ອນ ແລະຣະດູ ໃບໄມ້ຫຼົ່ນ.
- ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນຈາກການຢູ່ຂ້າງນອກໃນເວລາຄ້ອຍບ່າຍແລະຍາມເລີ້ມຄ່ຳ. ຍູງສ່ວນຫຼາຍຈະອອກຫາກິນ ຈາກ 1-3 ຊົ່ວໂມງຫຼັງ ຈາກຕາເວັນຕົກດິນ ແລະອີກເທື່ອນຶ່ງ ໃນລະຫວ່າງເຊົ້າໆ ຕອນຕາເວັນຂຶ້ນ.
- ເມື່ອຍາມຢູ່ທາງນອກ ໃຫ້ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງຫຼີມໆ ມີສີແຈ້ງ ແລະໃຫ້ປົກແຂນແລະຂາໄວ້, ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຢາທາໂລ່ແມງໄມ້ຊຶ່ງມີສ່ວນປະກອບຂອງ ສານເຄມີ diethyl toluamide (DEET) ຫຼື Picaridin.
- ໃຫ້ຕິດຕັ້ງຕານ່າງໃສ່ ປ່ອງຢ້ຽມ, ປະຕູ ທຸກໆບ່ອນ ແລະ ປ່ອງໄຟ (ຍາມບໍ່ໃຊ້) ແລະ ໃຫ້ຕານ່າງຢູ່ໃນ ສະພາບດີສເມີ.
- ໃຫ້ໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ຕາມຫ້ອງນອນ ຕາມຄຳແນະນຳທີ່ຢານັ້ນຂຽນໄວ້.
- ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໃຫ້ເອົາຖົງນ້ຳທີ່ບໍ່ມີຝາອອກຫ່າງຈາກເຂດອ້ອມແອ້ມເຮືອນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຍູງ ໄຂ່ໃສ່ໃນຖົງນັ້ນ.

- ເວລາໄປນອນປ່າ (ແຄ່ມປີ້ງ), ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຣະມັດຣະວັງເຊັ່ນໃຊ້ຕານ່າງຢູ່ຣົດຜູ້ຄາຣາວານ ແລະ ເຕັນ, ແລະ ໃຫ້ນອນຢູ່ມຸ້ງທີ່ກັນຍູງໄດ້.
- ໃຫ້ຣະວັງເປັນພິເສດຍາມໄປຕົກເບັດ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ກະທຳຕາມຂັ້ນຕອນປ້ອງກັນຕົນເອງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຈາກການຖືກຍູງກັດ.

ຮາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ - Public Health Units in NSW (ໜ່ວຍອະນາມັຍສາທາຣະນະໃນຣັດ NSW)

ຖ້າຕ້ອງການຮາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ ກະຣຸນາຕິດຕໍ່ທ່ານໝໍຂອງທ່ານ, ໜ່ວຍອະນາມັຍສາທາຣະນະ ທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ສູນອະນາມັຍຊຸມຊົນ - ໃຫ້ເບິ່ງພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ 'NSW Government' ທາງໜ້າຂອງປື້ມ ໂທຣະສັບ ຫົວຂາວ.

ເຂດໃນຕົວເມືອງ

Central Sydney	9515 3180
South Eastern Sydney	9382 8333
Northern Sydney	9477 9400
South Western Sydney	9828 5944
Western Sydney	9840 3603
Wentworth	4734 2022

ເຂດຊົນນະບົດ

Central Coast	4349 4845
Mid North Coast	6588 2750
Mid Western	6339 5548
Hunter	4924 6477
Illawarra	4255 2200
New England	6766 2288
Northern Rivers	6620 7500
Macquarie	6841 2216
Southern	4827 3428
Greater Murray	6021 4799
Far West	(08) 8080 1499

NSW Department of Health

73 Miller Street
 North Sydney NSW 2059
 Tel. (02) 9391 9000
 Fax. (02) 9391 9101
 TTY. (02) 9391 9900

NSW Health website
www.health.nsw.gov.au