

ໂຮກ ມື, ຕີນ ແລະ ປາກ Hand, Foot and Mouth Disease

ໂຮກມື, ຕີນ ແລະ ປາກແມ່ນຫຍັງ?

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໂຮກມື, ຕີນ ແລະ ປາກ (hand, food and mouth disease) ແມ່ນພຍາດທີ່ບໍ່ ຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນຈາກເຊື້ອໄວຣັສ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ coxsackievirus ຫຼື enterovirus. ໂຮກນີ້ບໍ່ແມ່ນ ໂຮກຮ້າຍແຮງແລະບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຮກຂອງສັດຊຶ່ງເອີ້ນວ່າໂຮກຕີນແລະປາກ (food and mouth disease). ໂຮກນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເກີດກັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 10 ປີ ແຕ່ວ່າ ອາດເກີດກັບ ເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນ ຫຼື ກັບຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ໂຮກນີ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງໃດຕໍ່ທ່ານ?

ການຕິດເຊື້ອ Coxsackievirus ຫຼື enterovirus ອາດບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການໃດໆທັງໝົດ ຫຼື ມີອາການ ພຽງເລັກນ້ອຍບໍ່ຮ້າຍແຮງ. ເມື່ອອາການເລີ່ມສະແດງ ຈະເຫັນວ່າມີຕຸ່ມໃສ່ ຊຶ່ງເລີ່ມຈາກຈຸດນ້ອຍໆ ແດງໆ ຊຶ່ງຕໍ່ມາກໍຈະກາຍເປັນຕຸ່ມໂພງ. ຕຸ່ມໃສ່ຈະປາກົດພາຍໃນກະພິ່ງແກ້ມ, ເຫງືອກ, ແລະທາງ ຂ້າງຂອງລິ້ນ, ເຊັ່ນດຽວກັບຕາມມືແລະຕີນ. ຢູ່ໃນກໍລະນີຂອງເດັກນ້ອຍ, ບາງເທື່ອຕຸ່ມໃສກໍຈະເຫັນ ຕາມແຖວຜ້າອ້ອມ. ຕຸ່ມໃສຈະເປັນປະມານ ເຈັດ ຫາ 10 ມື້. ບາງເທື່ອ ເດັກນ້ອຍອາດຖືກຮ້າຍໄຂ້ເລັກ ນ້ອຍ, ເຈັບຄໍ, ເມື່ອຍ, ມີສີຂີດ ແລະ ອາດຈະກິນບໍ່ໄດ້ປະມານມື້ນຶ່ງຫຼືສອງມື້. ນ້ອຍນັກນ້ອຍໜ້າ, ທີ່ ເຊື້ອ coxsackieviruses ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບປ່ວຍຢ່າງອື່ນຊຶ່ງໄປມີຜົນກະທົບຕໍ່ຫົວໃຈ, ສມອງ, ຫຼືເຍື່ອສມອງ (meningitis), ປອດ, ຫຼື ຕາ.

ໂຮກນີ້ເປັນກັນຫຼາຍບໍ?

ໂຮກ ມື, ຕີນ ແລະ ປາກ ແມ່ນພຍາດທີ່ເປັນກັນຫຼາຍ ແລະ ການຮະບາດອາດເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງ ກຸ່ມຂອງເດັກນ້ອຍ; ຕົວຢ່າງ, ໃນສູນດູແລເດັກ.

ໂຮກນີ້ແຜ່ຜາຍຢ່າງໃດ?

ຕາມປົກກະຕິ ໂຮກ ມື, ຕີນ ແລະ ປາກ ຈະແຜ່ຜາຍດ້ວຍການຕິດຕໍ່ທາກັນຈາກຄົນ. ເຊື້ອໄວຣັສ ແຜ່ຜາຍຈາກອາຈົມຂອງຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໄປສູ່ປາກຂອງຄົນຕໍ່ໄປ ໂດຍຜ່ານມືທີ່ມີເຊື້ອໂຮກ. ນອກຈາກ ນັ້ນ ມັນຍັງແຜ່ຜາຍໂດຍນ້ຳຈາກປາກຫຼືລະບົບຫາຍໃຈ, ແລະຈາກການຕ້ອງຂູນນ້ຳຈາກຕຸ່ມໃສໂດຍ ຕົງ.

ຕາມປົກກະຕິຈະໃຊ້ເວລາລະຫວ່າງສາມຫາຫ້າມື້ຫຼັງຈາກຕິດຕໍ່ໄກ້ຊິດ ກັບຄືນທີ່ຕິດເຊື້ອ ກ່ອນທີ່ຕຸ່ມ ໃສະຢາກິດ. ຕາບໃດທີ່ຕຸ່ມຍັງມີນ້ຳໃສຢູ່ ມັນກໍຈະຍັງຢູ່ໃນສະພາບແຜ່ຜາຍເຊື້ອໄດ້. ເຊື້ອໄວຣັສນີ້ ສາມາດຢູ່ໃນອາຈິມເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ.

ຈະປິ່ນປົວຢ່າງໃດ?

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປິ່ນປົວຫຍັງ. ຢາ Paracetamol ຈະຊ່ວຍປິ່ນເທົາອາການຄືງຮ້ອນແລະບໍ່ສະບາຍໃນເນື້ອຕົວ. ຢາເອົາຢາ aspirin ໃຫ້ເດັກນ້ອຍກິນ. ຖ້າບວດຫົວໜັກ, ຫຼື ໄຂ້ບໍ່ລົດ, ໃຫ້ໄປປຶກສາທ່ານໝໍ.

ຈະປ້ອງກັນໄດ້ຢ່າງໃດ?

- ການຮັກສາຄວາມສະອາດແມ່ນການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດ: ໃຫ້ລ້າງມືດ້ວຍສະບູແລະນ້ຳ ຫຼັງຈາກເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ, ກ່ອນກິນ, ຫຼັງຈາກເຊັດດັງ, ແລະຫຼັງຈາກປ່ຽນຜ້າອ້ອມຫຼືເຄື່ອງນຸ່ງເປື້ອນ.
- ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ຈອກ, ເຄື່ອງຕັກອາຫານ, ເຄື່ອງໃຊ້ອະນາມັຍສ່ວນຕົວ (ເຊັ່ນຜ້າເຊັດໂຕ, ຜ້າລ້າງໜ້າ ແລະ ແບງຄູແຂ້ວ), ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງ (ໂດຍສະເພາະ ເກີບແລະຖົງເທົ້າ) ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ.
- ໃຫ້ຊັກເຄື່ອງນຸ່ງເປື້ອນໃຫ້ສະອາດດີ.
- ຕ້ອງອັດປາກແລະດັງເວລາໄອຫຼືຈາມ. ໃຫ້ເຊັດດັງແລະປາກດ້ວຍເຈ້ຍພິຊຊູ, ເອົາເຈ້ຍນັ້ນ ຖິ້ມ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ລ້າງມື.

ຈະຄວບຄຸມການແຜ່ຜາຍຂອງພຍາດນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນໂຣກ ມື, ຕີນ ແລະ ປາກ ບໍ່ຄວນໃຫ້ໄປໂຮງຮຽນຫຼືໄປສູນດູແລເດັກຈົນກ່ວາຕຸ່ມໃສເຂົາເຈົ້າຈະແທ້ງ.

ເມື່ອເປັນໂຣກນີ້ ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການຂອງສູນດູແລເດັກຫຼືຄູໂທຍຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ຮູ້.

ຮາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ - Public Health Units in NSW (ຜແນກອະນາມັຍສາທາຣະນະ ໃນລັດ NSW)

ຖ້າຕ້ອງການຮາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກະຣຸນາຕິດຕໍ່ທ່ານໝໍຂອງທ່ານ, ໜ່ວຍອະນາມັຍສາທາຣະນະ ທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ສູນອະນາມັຍຊຸມຊົນ - ໃຫ້ເບິ່ງພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ 'NSW Government' ທາງໜ້າຂອງປື້ມໂທຣະສັບ ຫົວຂາວ.

ເຂດໃນຕົວເມືອງ

Central Sydney	9515 3180
South Eastern Sydney	9382 8333
Northern Sydney	9477 9400

South Western Sydney	9828 5944
Western Sydney	9840 3603
Wentworth	4734 2022

ຂອດຊົນນະບົດ

Central Coast	4349 4845
Mid North Coast	6588 2750
Mid Western	6339 5548
Hunter	4924 6477
Illawarra	4255 2200
New England	6766 2288
Northern Rivers	6620 7500
Macquarie	6841 2216
Southern	4827 3428
Greater Murray	6021 4799
Far West	(08) 8080 1499

NSW Department of Health

73 Miller Street
North Sydney NSW 2059
Tel. (02) 9391 9000
Fax. (02) 9391 9101
TTY. (02) 9391 9900

NSW Health website
www.health.nsw.gov.au