

# Rubella

በማህበረሰቡ ላይ ማገኛውም ሰው ጠቃሚ የእውነት ጽሁፍ ሲሆን በተለይ ለሌቶች ህፃን በሚወልዱበት እድሜያቸው



በማህበረሰብ ውስጥ ላይ ሰዎች ጠቃሚ እውነታዎች

## ማን ነው የMMR ወይም የኩፍኝ ከትባት መውሰድ የሌለበት?

- ለፀረ-ሐዋሳት/ካንቲባዮቲክስ neomycin የሚቆጣ ሰውነት ያለው
- ነብሰ-ጦር የሆነች ሴት ወይም ከትባቱን ከወሰዱ በአንድ ወር ውስጥ የሚርገዝ አቅድ ያላት ሴት
- ማንም በሽታ ያለበትና በሕክምና መድኃኒት አንደ ኮርቲሶን/cortisone ወይም ፕረደኒሶሎን/prednisolone የሚወሰድ እና ለሰውነት በሽታ መከላከል አቅም አሠራር ሊያዳከሙ ስለሚችሉ ይሆናል።
- ማንም ሰው በሃይለኛ ቁሰል/ኢንፌክሽን የሚሰቃይ ከሆነ።

## ለበለጠ ማብራሪያ

- ከህክምና ጋር መወያየት
- በአካባቢዎ የሚገኝ የመንግሥት ጤና ጥበቃ ጽ/ቤትን መጠየቅ
- የእናቶች ህፃናት ጤና ጥበቃ ክሊኒክ ነርስን መጠየቅ
- የቤተሰብ መምሪያ ክሊኒኮች መረጃ አላቸው
- በቪክተሪያ መንግሥት የበሽታ መከላከያ ክፍል፣ ስልክ ቁጥር 1300 882 008 ወይም በዌብሳይት፡ [www.health.vic.gov.au/immunisation](http://www.health.vic.gov.au/immunisation)
- ለኩፍኝ ትምህርት ነርስ፣ የደፍ-ነስ ፋውንዴሽን/Deafness Foundation ስልክ ቁጥር [03] 9887 8683 ኢሜል፡ [rubella@deafness.org.au](mailto:rubella@deafness.org.au) ዌብሳይት፡ [www.deafness.org.au](http://www.deafness.org.au)

## በቋንቋ የተተረጎሙ

ይህ ጥራዝ ወረቀት በሌሎች የማህበረሰብ ቋንቋዎች ትርጉም በደፍ-ነስ ፋውንዴሽን (Deafness Foundation) ጽ/ቤት ይገኛል። የቋንቋ እርዳታ በነፃ ለማግኘት 13 1450 በመደወል የትርጉም አገልግሎት (TIS) ማናገር ይቻላል።

# Rubella



Deafness Foundation

Published by  
DEAFNESS FOUNDATION  
(VICTORIA)  
P.O. Box 42, Nunawading 3131.  
Telephone (03) 9887 8683 Fax (03) 9887 8848  
E.mail [rubella@deafness.org.au](mailto:rubella@deafness.org.au)  
Web site [www.deafness.org.au](http://www.deafness.org.au)

Publication sponsored as a community service by:



Endorsed by Immunisation Unit,  
State Government of Victoria

February 2005  
Project CSLV 2100.5.00

# Rubella

## ኩፍኝ (rubella) ምንድን ነው?

ኩፍኝ [አንዳሁም የጀርመን ኩፍኝ ተብሎ

ይጠራል] በጣም ህይወትና በሻይረስ

የሚመጣ/የሚተላለፍ በሽታ ሲሆን በሐፃናት

ላይ የተለመደ ይሁን አንጂ ያደጉ ወጣቶችንና

አዋቂ ሰዎችንም ሊበክል ይችላል። የበሽታው

ምልክት አይታይም ወይም ብዙ ጊዜ

አንደተለመደው ትንሽ ትኩሳትን የክጢ

ክብጠትን፣ የመጋጠሚያ ሐመምን አንዳሁም

በአንገትና በሬት ላይ ሽፍ ያለ ነገርን ከሁለት

እስከ ሦስት ቀናት የሚቆይ አንዳወጣ

ምክንያት ይሆናል። ሁልጊዜ የመዳን አድሎ

የተሟላና ፈጣን ይሆናል።

ሴቶች በመጀመሪያው 20 ሳምንት ፅንሰ

ላይ በዚህ በሽታ ከተያዙ በጣም አደገኛ

ነው። አንዳሁም በሚወለደው ሐፃን ላይ

ከባድ ችግር ያመጣል ማለት አንድ ድንቁርና፣

የልብ በሽታና የአካምር ጉድለትን ሊያስከትል

ይችላል። ይህ ሁኔታ ሲከሰት ኩፍኝ ከተፈጥሮ

የመጣ (CRS) ተብሎ ይነገራል።

## ኩፍኝ አንደት ሊስፋፋ/ሊተላለፍ ይችላል?

አንድ ጉንፋን ኩፍኝም በተመሳሳይ መንገድ ሊተላለፍ ሲችል የታመመ ሰው በሚሰልጠኑና በሚያገለግሉት ጊዜ ሊተላለፍ ይችላል። ብዙ ጊዜ የኩፍኝ ምልክት ለመታየት ሁለት ሳምንት የሚሆን ሲወስድ ሰዎች በሽታው ከሌሎች ጋር ለመኖሩ አያውቁም። በዚህን ጊዜ በሽታውን ለሌሎች ጤነኛ ሰዎች ሊያስተላልፉ ሲችሉ፣ ይህም በመጀመሪያው የእርግዝና ወቅት ላሉ ሴቶች እና ከትባቱን ካልወሰዱ አደገኛ ይሆናል። ያስተወለደ ጫቅላ በአደጋው ሊጋለጥ የሚችለው በመጀመሪያው እርግዝና ወቅት ይሆናል።

## ኩፍኝ የሚይዘው ለማን ነው?

ቀደም ሲል በሽታው ያሰበረበት፣ ከትባት ያለወሰደ ሰው ወይም በሆነ ምክንያት የበሽታ መከላከል አቅም የገደለው ሰው በበሽታው ሊያዝ ይችላል። ብዙ ጊዜ ከትባት በመውሰድ በሽታውን መከላከል ይቻላል ነገር ግን ከ5-10% የበሽታ መከላከያውን የወሰዱ ሰዎች በኩፍኝ ሊያዙ ይችላሉ ምክንያቱም በሰውነታቸው በቂ የበሽታ መከላከያ አቅም ስለሚኖራቸው ይሆናል።

## በተፈጥሮ የሚመጣ ኩፍኝ አንደት መከላከል አንችላለን?

የCRS ኩፍኝን መከላከል ይቻላል! ካልተለመደና ከወሊድ ጋር አብሮ ለሚመጣ ችግር ለመከላከል ሁሉም ሴቶች እርግዝና ከመጀመሪያቸው በሬት የኩፍኝ በሽታ መከላከያን ለመውሰዳቸው ማረጋገጡ ጥሩ መንገድ ሊሆን ይችላል። የበሽታ መከላከያውን ከወሰዱ በኋላ ለአንድ ወራት የሚሆን አለማርገዝ አንዳሁም ነብሰጡር የሆኑ ሴቶች እስከወልዱ ድረስ የበሽታ መከላከያ ከትባት መውሰድ የለባቸውም። ህፃናት ሁሉ የበሽታ መከላከያ ከትባት ከወሰዱ በሽታው በማህበረሰቡ ውስጥ አንዳይዛመት ይጠቅማል።

በአውስትራሊያ ውስጥ ህፃናት ሁለት የተለያዩ መጠን ያለው የMMR (ኅኩፍኝ፣ ጀር ደግፍና የጀርመን ኩፍኝ) ከትባት አንዳወሰዱ ይደረጋል። አንደኛው ከትባት የሚሰጠው በ12 ወር አድሜ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በ4 ዓመት አድሜ ይሰጣል።

ይህን በማካሄድ ከሶስት በሽታዎች ለመከላከል ይሆናል።

እስከ ወይም በ1966 ዓ.ም የተወለዱ ሰዎች ሁለት ጊዜ የMMR በሽታ መከላከያ ከትባት ለመውሰዳቸው ማረጋገጥ አለባቸው። እነዚህ ሰዎች በቀላሉ ሲታመሙና በሽታውን ወደ ሌሎች ሰዎች የማስተላለፍ ችግር ይፈጥራሉ። አንዳሁም የበሽታ መከላከያ ከትባቱን አንዳወሰዱ በማደፋፈር ራሳቸውንና ሀብረተሰቡን ከበሽታው ለመከላከል ይሆናል።

ሴቶች ከማርገዛቸው በሬትና የሰውነት በሽታ መከላከያ አቅም ተመጣጣኝ ለመሆኑ ለማረጋገጥ የኩፍኝ ደም ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል። የሰውነት በሽታ መከላከያ አቅም ዝቅተኛ ከሆነ ወይም ከሌለ የMMR እና የኩፍኝ በሽታ መከላከያ ከትባት በድጋሚ መውሰድ ያስፈልጋል። ከ6 እስከ 8 ወር የመከላከያ ከትባቱን ከተወሰደ በኋላ ተጨማሪ የደም ምርመራ በማድረግ የመጀመሪያው ከትባት መሥራትና አለመሥራቱን ለማረጋገጥ ይሆናል።

## ማን ነው ይበልጡን አደጋ ላይ የሚወድቅ?

በልጅነት ወቅት በተከታታይ የበሽታ መከላከያ ከትባት በማይሰጥበት አገር ለመጡ ሰዎችና አድሜያቸው ከ4 ዓመት አድሜ በታች ወደ አውስትራሊያ ከመጡ የኩፍኝ በሽታ መከላከያ ከትባት ያስፈልጋቸዋል። በተለይ ከኤሲያና አፍሪካ አገር የተወለዱ ሴቶች ከማርገዛቸው በሬት ቀደም መከላከያውን ሲል ስላልወሰዱ የኛ/ኩፍኝ በሽታ መከላከያ ከትባት አንዳወሰዱ ይገደዳሉ።

በልጅነት ወቅት በኩፍኝ በሽታ ቢያዙም በቀጣዩ የሕይወት ዘመን ኩፍኝ አይዘም ለማለት አያስተማምንም። የሰውነት የበሽታ መከላከል አቅም ለመኖሩ ለማረጋገጥ አእርግዝና በሬት የደም ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል።

## የበሽታ መከላከያ ከትባት የት ነው የሚሰጠው?

በአካባቢዎት ያለው ሐኪም፣ የቤተሰብ መምሪያ ክሊኒክ፣ የማህበረሰብ ጤና ጥበቃ ማክከልና በአካባቢ ባለ የመንግሥት በሽታ መከላከያ አገልግሎት በኩል የMMR/ኩፍኝ በሽታ መከላከያ ከትባት ማግኘት ይቻላል።

## የሚያስከትለው ችግር- ውስብስብ

በእርግዝና ወቅት የኩፍኝ ከትባት የሚያስከትለው ችግር ከኩፍኝ/ጀር ደግፍ/ የጀርመን ኩፍኝ/MMR ከትባት የሚያስከትለው ችግር ጋር ሲወዳደር አምብዛም ለውጥ የለውም። ደህና አለመሆን፣ መጠነኛ ትኩሳት በግምት ከ6 እስከ 11 ቀናት በኋላ የመከላከያ ከትባቱ አንደተወሰደ በቀዳ ላይ ሽፍታ መታየት የተለመደ ችግር ይሆናል። የመከላከያ ከትባት የወሰዱ ሰዎች ለሌሎች ሰዎች በሽታውን አያስተላልፉም። በከትባቱ ምክንያት የተነሳ በጣም አደገኛ የሆነ ችግር/ውስብስብ ማለት አንድ አከምር መኖራቸው የመሳሰሉ በጣም ያልተለመዱ ናቸው። ምናልባት ከትባቱን ከወሰዱ ከሚሊዮን ሰዎች አንድ ወይም በታች ቢሆን ነው። የሚያስከትለው ጥቅምና ጉዳቱን ከነዚህም ጋር መወያየት ነው።