



ashm

KHMER

# ព័ត៌មានសង្ខេបអំពី

# ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C

ប័ណ្ណព័ត៌មាននេះគឺសំរាប់អ្នកដែលបានទទួលលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមាន ថាមានអង្គបដិបក្ខជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងសំរាប់អ្នកដែលចង់ដឹងថែមទៀតអំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ។

លទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានមានន័យថា លោកអ្នកមានវីរុសជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ។ លទ្ធផលនេះអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកភ័យខ្លាច ហើយលោកអ្នកអាចមានសំណួរដែលលោកអ្នកត្រូវការចម្លើយ។

មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមបួននាក់ដែលបានឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C នឹងកំចាត់មេរោគនេះចេញអស់ពីក្នុងខ្លួនដោយខ្លួនឯង។ វេជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកអាចបញ្ជាឲ្យធ្វើតេស្តថែមទៀត ដើម្បីឲ្យដឹងថា តើលោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះដែរឬទេ។ បើតេស្តបន្ថែមទៀតបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា លោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C នោះ វេជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកអាចផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវព័ត៌មានបន្ថែមទៀត។ អង្គការទាំងឡាយដែលរាយឈ្មោះនៅខាងខ្ទង់បណ្ណព័ត៌មាននេះ អាចផ្តល់ជូនព័ត៌មានបន្ថែមនិងជំនួយ។

### ▶ តើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ជាអ្វីទៅ?

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C គឺជាជំងឺឆ្លងដោយវីរុសដែលចម្លងតាមឈាម ដែលអាចបំផ្លាញថ្លើមរបស់លោកអ្នក។ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C អាចក្លាយជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ (រយៈពេលយូរ)។ លោកអ្នកអាចមានជំងឺនេះរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយ ដោយពុំមានជួបប្រទះនឹងរោគសញ្ញាណាឡើយ។ យ៉ាងណាមិញ រោគសញ្ញាទូទៅទាំងពួងមានរួមទាំងការអស់កម្លាំងលើកលែង ចង្កោរ ឈឺចាប់នៅខាងក្រោមឆ្អឹងដំនី និងធ្វើឲ្យក្រហាយពេលបរិភោគអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់និងស្ករ។ មិនដូចជាការឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទផ្សេងទៀតទេ ជាធម្មតាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C មិនបណ្តាលឲ្យលោកអ្នកធ្លាក់ខ្លួនឈឺឡើយនៅ ពេលដែលលោកអ្នកកើតមានវីរុសនេះជាលើកដំបូងនោះទេ។ មនុស្សជាច្រើនប្រហែលជាមិនដឹងថាខ្លួនកើតមានជំងឺនេះទៀតផង ទោះជាព្រួយពីកើតមានវីរុសនេះរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ដោយ។ ប្រភេទចម្លងនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C មានយ៉ាងតិច 6 ដើមដែលហៅថាគំរូហ្សេន (genotypes) (មានលេខ 1, 2, 3, 4 ជាដើម) ហើយទាំងអស់នេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិច។

### ▶ តើលោកអ្នកអាចកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C តាមរបៀបណា?

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់ឈាមនិងឈាម។ មនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសព្រំប្រទល់ ដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C បានឆ្លងជំងឺនេះតាមរយៈការប្រើគ្រឿងសម្រាប់ចាក់ថ្នាំឬឆ្នាំ។ ការឆ្លងរោគក៏អាចកើតមានតាមរយៈការសាត់រាងកាយឬចោះរន្ធលើរាងកាយដែលគ្មានការការពារថែទាំផងដែរ ដោយសារតែការចាក់និងមូល ឬដោយសារការចាក់បញ្ចូលឈាម ឬ សារធាតុមានឈាម នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី មុនឆ្នាំ 1990 ។ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ក៏អាចឆ្លងតាមរយៈការព្យាបាលឬការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគដោយគ្រឿងសម្រាប់ចាក់ថ្នាំថែទាំមេរោគ នៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតផងដែរ។ ការឆ្លងពីម្តាយទៅទារកក៏មានលទ្ធភាពតិចតួច។ លទ្ធភាពនៃការឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ក្នុងអង្គការរួមភេទ រក្សា មានកំរិតតិចតួចណាស់។ ជំងឺនេះមិនអាចឆ្លងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រដាប់ប្រដារក្នុងផ្ទះរួមគ្នា ដូចជាពេងទឹកឬចាន ឬតាមរយៈការបរិភោគអាហារជាមួយគ្នានោះឡើយ។

### ▶ ការព្យាបាល

ការព្យាបាលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យលោកអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងកាត់បន្ថយការខូចខាតថ្លើមលោកអ្នកឲ្យដល់កំរិតទាបបំផុត។ មិនមែនមនុស្សរាល់រូបត្រូវការការព្យាបាលឡើយ ព្រោះជាញឹកញយ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C មានសភាពមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរទេ ហើយនិងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្នុងរយៈពេលយូរឡើយ។ ការព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺការប្រើថ្នាំ pegylated interferon និង ribavirin គ្រប់ផ្សំគ្នា។ ការព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C មានការរីកចម្រើនយ៉ាងលឿននៅក្នុងពេលពីរបីឆ្នាំកន្លងមកនេះ ហើយចំនួនប្រហែល 80% នៃ អ្នកដែលមានគំរូហ្សេនខ្លះនៃជំងឺថ្លើមនេះ និងចំនួនប្រហែល 50% ដល់ 60% នៃអ្នកទាំងអស់ដែលទទួលបានការព្យាបាលតាមវិធីគ្រោងថ្មី ពុំមានវីរុសនេះតទៅទៀតទេ។

ការព្យាបាលចំពោះគំរូហ្សេនខ្លះមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងគំរូហ្សេនផ្សេងទៀត។ នេះមានន័យថា មនុស្សជាច្រើនដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C អាចបំបាត់វីរុសនេះចេញបាន ហើយពុំមានរោគសញ្ញាទៀតឡើយ។ គេប្រើថ្នាំ Interferon ដោយចាក់នៅក្រោមស្បែក និងលេបថ្នាំគ្រាប់ ribavirin។ ជាធម្មតា ការព្យាបាលមានរយៈពេលពី 6 ទៅ 12 ខែ។ ការវែកពិនិត្យជាប្រក្រតីដោយវេជ្ជបណ្ឌិតបច្ចេកទេសរបស់លោកអ្នក គឺជាការសំខាន់ចាំបាច់ក្នុងអង្គការព្យាបាលលោកអ្នក ដើម្បីតាមពិនិត្យការរីកចម្រើនរបស់លោកអ្នក និងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរណាមួយដែលលោកអ្នកអាចមាន

### ▶ ការពិនិត្យតាមដានសុខភាពលោកអ្នក

ដើម្បីស្វែងយល់របៀបដែលរាងកាយលោកអ្នកកំពុងទប់ទល់នឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C លោកអ្នកត្រូវពិនិត្យតាមដានសុខភាពលោកអ្នក។ ទង្វើនេះអាចជួយក្នុងការសម្រេចថាតើត្រូវចាប់ផ្តើមការព្យាបាលឬទេ ឬពេលណាទៅដែលត្រូវចាប់ផ្តើមការព្យាបាលនោះ។ ការតាមពិនិត្យជាប្រក្រតីនៃសុខភាពលោកអ្នកអាចជាប់ទាក់ទងនឹងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងតំបន់ ឬអ្នកវេជ្ជសាស្ត្ររបស់លោកអ្នក នៅឯមន្ទីរព្យាបាលថ្លើមជំងឺរលាកថ្លើម ឬក៏គ្រប់ផ្សំទាំងអស់នេះ។ ជាការសំខាន់បំផុតក្នុងការរក្សាការបរិភោគចំណីអាហារផ្តល់សុខភាពល្អ បញ្ឈប់ប្តីរឹតត្បិតការសេពស្រា និងបាត់ប្រាណជាប្រក្រតី។ នៅពេលដែលអ្នកណាមួយបានកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ហើយនោះ ជាធម្មតាការធ្វើតេស្តអង្គបដិបក្ខជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C នឹងផ្តល់លទ្ធផលវិជ្ជមាន ទោះជានៅក្រោយពីខ្លួនលោកអ្នកពុំមានវីរុសនេះតទៅទៀតក៏ ឬ ក្រោយពីការព្យាបាលដោយជោគជ័យក៏ដោយ។ ការធ្វើតេស្តមួយចំនួនត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ថា តើលោកអ្នកលែង កើតមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ហើយឬនៅ (ដែលមានន័យថា លោកអ្នកពុំមានមេរោគតទៅទៀត ហើយវីរុសនេះ មិនបំផ្លាញថ្លើមលោកអ្នកតទៅទៀតទេ)។

**▶ ការធ្វើតេស្ត**

ការធ្វើតេស្តមុខងារថ្លើម ពិនិត្យមើលថាតើថ្លើមលោកអ្នកកំពុងបំពេញមុខងារយ៉ាងណាដែរ។ ការធ្វើតេស្តមួយក្នុងចំណោមតេស្តទាំងនេះមានឈ្មោះថា តេស្តរកមើលកំរិតសារធាតុ ALT (alanine aminotransferase) ។ សារធាតុនេះប្រាប់អំពីការខូចខាតថ្លើមនៅក្រាស់ព្យាបាល។ សារធាតុនេះអាចឡើងចុះនៅក្នុងពេលមួយរយៈកាល ដោយសារតែមូលហេតុច្រើន ដោយមានរួមទាំងការស្រពាស្រាវ។ ការប្រើគ្រឿងញៀនឯទៀត ឬប្រើថ្នាំកាត់បន្ថយលោកអ្នកកំពុងប្រយុទ្ធតាមនឹងរោគមួយទៀត។ សារធាតុនេះក៏អាចឡើងចុះផងដែរ ដោយសារតែជាលទ្ធផលនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ។

បើកំរិតសារធាតុ ALT លោកអ្នកឡើងនៅពេលមួយក្រោយប្រើគ្រឿងញៀន វាបង្ហាញពីលោកអ្នកអាចធ្វើតេស្ត PCR (ប្រតិកម្មអង់ប៉ូរីម polymerase តព្យា) ដើម្បីកំណត់ថា តើលោកអ្នកបានបំបាត់វីរុសជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C អស់ហើយឬនៅ ឬថាវីរុសនេះនៅមាននៅឡើយឬទេ។ លោកអ្នកក៏អាចធ្វើតេស្តគំរូហ្វេរ៉ូសផងដែរ ដែលប្រាប់អំពីប្រភេទវីរុសដែលលោកអ្នកមាន និងធ្វើតេស្តបន្តកំរិតវីរុស ដែលវាស់វែងបរិមាណវីរុសនៅក្នុងប្រព័ន្ធកាយលោកអ្នក។ តេស្តគំរូហ្វេរ៉ូស និងបន្តកំរិតវីរុសផ្តល់នូវការចង្អុលបង្ហាញនូវលទ្ធផលនៃការព្យាបាល។ គេនឹងធ្វើតេស្ត PCR សាឡើងវិញនៅពេលមួយ ក្រោយពីការព្យាបាលដើម្បីកំណត់ថា តើលោកអ្នកលែងមានវីរុសជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C តទៅទៀតឬទេ។

**▶ រច្ចប្បវត្តិសេវាកម្ម**

លោកអ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកអំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ទៅតាមលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននិងលាក់ការសម្ងាត់នៅក្នុងរដ្ឋ NSW, ACT និងរដ្ឋ Victoria វេជ្ជបណ្ឌិតខ្លះមានការអនុញ្ញាតដើម្បីចេញវេជ្ជបញ្ជាប្រើថ្នាំប្រឆាំងវីរុស នៅក្នុងកិច្ចសហការជាមួយអ្នកឯកទេស នៅឯមន្ទីរពេទ្យ ឬមន្ទីរព្យាបាលថ្លើមសាធារណៈ។ អង្គការទាំងឡាយដែលមានរាយឈ្មោះនៅលើប័ណ្ណនេះ អាចជួយលោកអ្នកនិងវេជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នក ក្នុងការរកមើលសេវាព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ។

**▶ ការលាក់ការសម្ងាត់**

នៅក្នុងកាលៈទេសៈភាគច្រើន លោកអ្នកមិនចាំបាច់ប្រាប់អ្នកណាមួយថា លោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ឡើយ។ យ៉ាងណាមិញ លោកអ្នកមានតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ក្នុងការជំរាបប្រាប់ភ្នាក់ងារក្រហម អំពីស្ថានភាពជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C របស់លោកអ្នក បើលោកអ្នកធ្វើអំណោយឈាម ហើយដូចគ្នានេះដែរ លោកអ្នកត្រូវប្រាប់កងកម្លាំងការពារជាតិអូស្ត្រាលីអំពីស្ថានភាពជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C របស់លោកអ្នក បើលោកអ្នកដាក់ពាក្យសុំចូលបំរើក្នុងកងកម្លាំងនេះ។ បើលោកអ្នកជាបុគ្គលិកថែទាំសុខភាព ហើយមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C នោះ លោកអ្នកមិនត្រូវអនុវត្តកិច្ចការណាដែលអាចចម្លងមេរោគនេះឡើយ។

**▶ ជំនួយលោកអ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយ**

បើលោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ហើយមានបំណងពិភាក្សាជាមួយអ្នកណាមួយអំពីជំងឺនេះ លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋឬដែនដីនៃជំងឺរលាកថ្លើម ក្នុងតំបន់លោកអ្នក។ ក្រុមប្រឹក្សាជំងឺរលាកថ្លើម ផ្តល់ព័ត៌មាននិងសេវាមួយចំនួន ដោយមានរួមទាំងការពិគ្រោះយោបល់លាក់ការសម្ងាត់ និងការបញ្ជូនទៅកាន់សេវាសុខភាពផ្សេងទៀត បើចាំបាច់។

បើលោកអ្នកមានបំណងពិភាក្សាជាភាសាលោកអ្នក ជាមួយសេវាណាមួយក្នុងចំណោមសេវាទាំងនេះ លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នកបកប្រែភាសានៃសេវាបកប្រែភាសា (Translating and Interpreting Service [TIS]) តាមទូរស័ព្ទលេខ 131 450 (បង់ថ្លៃទូរស័ព្ទក្នុងតំបន់)។ ប្រាប់អ្នកឆ្លើយទូរស័ព្ទថា លោកអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែភាសា ហើយនៅពេលដែលគេភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកបកប្រែភាសាហើយនោះ សូមប្រាប់អ្នកបកប្រែទូរស័ព្ទទៅលេខដែលលោកអ្នកចង់ទាក់ទង។ បន្ទាប់មក លោកអ្នកនឹងអាចនិយាយទៅកាន់សេវាដែលលោកអ្នកត្រូវការ តាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសា។

<p><b>Australian Hepatitis Council</b> Tel: 02 6232 4257 (metro) Help line: 1300 301 383 (regional) Web: www.acthepc.org</p>	<p><b>Hepatitis C Council of South Australia</b> Tel: 08 8362 8443 (metro) Help line: 1800 021 133 (regional) Web: www.hepcouncilsa.asn.au</p>
<p><b>ACT Hepatitis C Council</b> Tel: 02 6257 2911 Help line: 1300 301 383 Web: www.acthepc.org</p>	<p><b>Tasmanian Council on AIDS, Hepatitis and Related Diseases (TASCAHRD)</b> Tel: 03 6234 1242 (metro) Info line: 1800 005 900 (regional) Web: www.tascahrd.org.au</p>
<p><b>Hepatitis C Council of New South Wales</b> Tel: 02 9332 1853 (metro) Help line: 1800 803 990 (regional) Web: www.hepatitisc.org.au</p>	<p><b>Hepatitis C Council of Victoria</b> Tel: 03 9380 4644 (metro) Help line: 1800 703 003 (regional) Web: www.hepcvic.org.au</p>
<p><b>Northern Territory AIDS &amp; Hepatitis Council</b> Tel: 08 8941 1711 (metro) Info, support &amp; referral: 1800 880 899 (regional) Web: www.ntahc.org.au</p>	<p><b>Hepatitis Council of Western Australia</b> Info &amp; support: 08 9328 8538 (metro) Info &amp; support: 1800 800 070 (regional) Web: www.hepatitiswa.com.au</p>
<p><b>Hepatitis C Council of Queensland</b> Tel: 07 3236 0612 (metro) Info line: 1800 648 491 (regional) Web: www.hepatitisc.asn.au</p>	