

Кламидија Chlamydia

Што е кламидија?

Кламидија е инфекција што се пренесува со сексуален контакт и може да се сретне и кај мажите и кај жените. Кламидијата ја предизвикува бактерија. Многу луѓе кои се инфицирани со бактеријата немаат симптоми на инфекција, но, и покрај тоа, можат да ја пренесат бактеријата. Кламидијата може да се одрази врз мочниот канал, грлото на матката, задното дебело црево и чмарот, грлото и очите. Инфекцијата со кламидија може да доведе до компликации, но може да се спречи.

Како се добива кламидија?

Кламидијата се пренесува ако се има сексуален однос со некој кој што е веќе инфициран.

Лицата кои се најмногу изложени на ризик да добијат кламидија се:

- младите сексуално активни мажи и жени;
- оние кои што неодамна смениле сексуални партнери;
- оние кои што неодамна имале друга инфекција што се пренесува преку сексуален контакт.

Како ќе знаете дали сте биле инфицирани со кламидија?

Симптомите можат да се појават во рок од 2–14 дена после инфицирањето. Меѓутоа, некој може да има кламидија со месеци, дири и години, без да знае.

Кај жените

Ако жената има кламидија, таа може да го забележи следново:

- грчеви или болки во долниот дел од мевот;
- промени во менструацијата;
- болки кога моча;
- крварење или болки за време и после сексуален однос;
- проблеми во вагиналниот исцедок.

Кај мажите

Ако мажот има кламидија, тој може да го забележи следново:

- исцедок од пенисот;
- болки кога моча;
- потечени и болни тестиси.

Кај мажите и жените

Може да дојде до инфекција на чмарот, но, обично, не се забележува. Понекогаш може да предизвика болки во чмарот, или да доведе до формирање на исцедок.

Како се спречува кламидија?

Користењето на кондоми при вагинален и анален секс може да ја спречи кламидијата и другите инфекции што се пренесуваат при сексуален однос. Користењето на кондоми е особено важно за оние кои што имаат повеќе од еден сексуален партнер.

Further information – Public Health Units in NSW



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au