

Clamidia (Chlamydia)

¿Qué es la clamidia?

La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual que puede afectar a hombres y mujeres. La ocasiona una bacteria. Muchas personas infectadas con la bacteria no tienen síntomas de infección, pero igual pueden transmitirla. La clamidia puede afectar la uretra (el conducto urinario), el cuello del útero (o cuello de la matriz), el recto y el ano, la garganta y los ojos. La infección de clamidia puede llevar a complicaciones, pero se puede prevenir.

¿Cómo se contrae la clamidia?

La clamidia se propaga al mantener relaciones sexuales con una persona infectada.

Las personas que corren mayor riesgo de contraer clamidia son:

- los jóvenes (varones y mujeres) sexualmente activos;
- toda persona que haya cambiado de pareja sexual recientemente;
- toda persona que haya tenido otra infección de transmisión sexual recientemente.

¿Cómo sabe usted si ha contraído clamidia?

Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después del contagio. No obstante, la persona puede tener clamidia durante meses o aun años, sin saberlo.

En la mujer

Si una mujer tiene clamidia, es posible que note:

- calambres o dolores en la parte inferior del abdomen;
- cambios en su menstruación (es decir cambios en sus períodos);
- dolor al orinar;
- hemorragias o dolor durante o después del acto sexual;
- cambios en el flujo vaginal.

En el hombre


Si un hombre tiene clamidia, es posible que note:

- una descarga del pene;
- dolor al orinar;
- hinchazón y dolor en los testículos.

En el hombre y la mujer

Puede haber una infección en el ano, pero generalmente pasa desapercibida. En ciertos casos puede haber dolor o descarga del ano.

Further information – Public Health Units in NSW



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au