

បណ្តាញព័ត៌មានអំពីជំងឺឆ្លង

ជំងឺរលាកក្រពះនិងពោះ រៀនបង្កដោយវីរុស

ជាទូទៅជំងឺរលាកក្រពះនិងពោះរៀនកើតមានឡើងដោយការឆ្លងវីរុស ដែលបណ្តាលឲ្យក្អកនិងរាករូស។ វីរុសទាំងនេះឆ្លងយ៉ាងងាយពីមនុស្សម្នាក់ទៅកាន់ម្នាក់ទៀត។ ការលាងសម្អាតដៃឲ្យម៉ត់ចត់ជាមួយនឹងសាប៊ូនិងទឹកហូរចេញពីក្បាលម៉ាស៊ីន មានសារសំខាន់ក្រែកលែងដើម្បីបង្ការកុំឲ្យវាឆ្លងរាលដាល។

កែតម្រូវចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី 29 ខែវិច្ឆិកា 2007

តើជំងឺរលាកក្រពះនិងពោះរៀនបង្កដោយវីរុសគឺជាអ្វី?

ជំងឺរលាកក្រពះនិងពោះរៀនបង្កដោយវីរុសគឺជាជំងឺឆ្លងទូទៅមួយដែលកើតមាននៅក្នុងក្រពះនិងពោះរៀន ហើយដែលបណ្តាលឲ្យក្អកនិងរាករូស។ ជំងឺនេះអាចបណ្តាលដោយវីរុសមួយចំនួនផ្សេងៗគ្នា ដូចជា Rotavirus និង Norovirus (ដែលស្គាល់កាលត្រាមុនថាជាវីរុសដូច Norwalk)។ ជំងឺរលាកក្រពះនិងពោះរៀនមានមូលហេតុច្រើនផ្សេងទៀត ដោយមានរួមទាំងបាក់តេរីសារធាតុពុល ប៉ារ៉ាស៊ីត និងជំងឺមិនឆ្លងខ្លះទៀត។

តើជំងឺនេះមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ?

រោគសញ្ញាចម្បងទាំងឡាយនៃជំងឺរលាកក្រពះនិងពោះរៀនបង្កដោយវីរុសគឺក្អក និងរាកមានលាមករាវដូចទឹក។ រោគសញ្ញាផ្សេងទៀតអាចមានរួមទាំងចង្កោរ ត្រជាក់ ឈឺពោះ ឈឺក្បាល និងឈឺចាប់សាច់ដុំ។ កង្វះជាតិទឹកក្នុងខ្លួនអាចកើតមាននៅគ្រាបន្ទាប់មកទៀត។ រោគសញ្ញាទាំងឡាយអាចត្រូវការពេលពីមួយថ្ងៃទៅបីថ្ងៃដើម្បីចេញជារូបរាងឡើង ហើយជាធម្មតាមានរយៈពេលពីមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃ ជួនកាលក៏យូរជាងនេះ។

តើជំងឺនេះឆ្លងតាមរបៀបណា?

ជំងឺរលាកក្រពះនិងពោះរៀនបង្កដោយវីរុសគឺជាជំងឺឆ្លងខ្លាំងណាស់ ហើយវាឆ្លងតាមរយៈកម្រិតបូលាមករបស់អ្នកកើតជំងឺនេះតាមរយៈ៖

- ការប៉ះពាល់ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត ឧទាហរណ៍៖ ការចាប់ដៃរលាក់ជាមួយអ្នកកើតជំងឺដែលមានវីរុសនេះនៅលើដៃរបស់ខ្លួន
- វត្ថុដែលប្រឡាក់កម្រិតបូលាមកអ្នកជំងឺ
- ចំណីអាហារឬភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកម្រិតបូលាមករបស់អ្នកជំងឺ

ការឆ្លងក៏អាចកើតមានផងដែរតាមរយៈចំហាយនៃកម្រិតរបស់អ្នកជំងឺ។ នៅក្នុងករណីភាគច្រើន ការឆ្លងកើតមានឡើងពីមនុស្សម្នាក់ដែលមានរោគសញ្ញា។ អ្នកខ្លះអាចចម្លងមេរោគនេះដោយគ្មានរោគសញ្ញា ជាពិសេសនៅក្នុងពេល 48 ម៉ោងដំបូងក្រោយពីជាសះស្បើយមកវិញ។

តើអ្នកណាខ្លះដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺនេះ?

មនុស្សគ្រប់អាយុទាំងអស់អាចកើតមានជំងឺរលាកក្រពះនិងពោះវៀនបង្កដោយវីរុស។

តើវិធីបង្ការជំងឺនេះធ្វើឡើងដោយរបៀបណា?

ក្រោយពីទៅបង្គន់ ផ្លាស់ក្រណាត់កន្លបកូនក្មេង និងមុនពេលបរិភោគឬធ្វើម្ហូបអាហារ សូមលាងសម្អាតដៃលោកអ្នកឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាមួយនឹងសាប៊ូនិងទឹកហូរចេញពីក្បាលម៉ាស៊ីន រយៈពេលយ៉ាងតិច 10 វិនាទី ហើយជួតសម្អាតដៃដោយប្រើកន្សែងពោះគោស្អាត។

តើការវិនិច្ឆ័យរោគធ្វើទៅតាមរបៀបណា?

ជាធម្មតា រោគវិនិច្ឆ័យនៃជំងឺរលាកក្រពះនិងពោះវៀនបង្កដោយវីរុសគឺផ្អែកលើរោគសញ្ញារបស់អ្នកកើតជំងឺតែម្តង។ ការបញ្ជាក់ដោយមន្ទីរពិសោធន៍មានសារសំខាន់នៅក្នុងអំឡុងពេលកើតមានជំងឺ ហើយតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តសំណាកលាមក។

តើវិធីព្យាបាលជំងឺធ្វើឡើងដោយរបៀបណា?

ពុំមានការព្យាបាលជាក់លាក់សំរាប់ជំងឺរលាកក្រពះនិងពោះវៀនបង្កដោយវីរុសទេ ក្រៅពីការសំរាកនិងទទួលបានជាតិទឹកឲ្យបានច្រើន។ មនុស្សភាគច្រើននឹងជាសះស្បើយមកវិញដោយគ្មានផលវិបាកអ្វីទេ។ យ៉ាងណាមិញ ជំងឺរលាកក្រពះនិងពោះវៀនបង្កដោយវីរុស អាចមានភាពធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកដែលប្រហែលជាលំបាកក្នុងការបំពេញមកវិញនូវជាតិទឹកនិងជាតិអំបិលដែលបាត់បង់តាមរយៈការក្អក និងរាករូស។

អ្នកដែលក្អកក្អួតក្នុងរយៈពេលខ្លះ៖

- ឈប់សំរាកនៅផ្ទះនិងកុំទៅធ្វើការឬទៅសាលារៀនឬមណ្ឌលថែទាំកុមារឡើយ នៅក្នុងពេលកំពុងមានជំងឺ
- កុំធ្វើម្ហូបអាហារឲ្យអ្នកដទៃឬថែទាំអ្នកជំងឺ កុមារ ឬមនុស្សចាស់ឡើយ។ ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនទាំងនេះគួរអនុវត្តរហូតដល់ទៅ 48 ម៉ោង ក្រោយពីរាករូសឬការក្អកឈប់កើតមានតទៅទៀត។ ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនទាំងនេះរួមមានទាំងសំរាប់អ្នកដែលធ្វើម្ហូបអាហារនៅផ្ទះ ឬធ្វើការនៅក្នុងអាជីវកម្មផលិតចំណីអាហារ។
- លាងសម្អាតដៃឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាមួយនឹងសាប៊ូនិងទឹកចេញពីក្បាលម៉ាស៊ីនរយៈពេល 10 វិនាទី ក្រោយពីទៅបង្គន់។
- ទទួលបានភេសជ្ជៈរាវថ្លាឲ្យបានច្រើន ឧទាហរណ៍៖ ទឹកផ្លែឈើ ឬភេសជ្ជៈទឹកក្រូច ដោយលាយភេសជ្ជៈនោះចំណុះ 1 ផ្នែក ក្នុងលាយជាមួយទឹកចំណុះ 4 ផ្នែក ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យខ្វះជាតិទឹក។ សូមប្រើសរាងទឹកផ្លែឈើនិងភេសជ្ជៈទឹកក្រូចសុទ្ធ ដោយសារតែវាអាចបង្កើនភាពខ្វះជាតិទឹក និងរាករូស។ ឱសថស្ថានមានលក់ភេសជ្ជៈសំរាប់បំពេញជាតិទឹកនិងអំបិលដែលបាត់បង់មកវិញ។ ការបន្តកំសេរម្ហូបអាហារសរសៃឈាមអាចជាការចាំបាច់នៅក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរនៃការខ្វះជាតិទឹក។

អ្នកថែទាំអ្នកជំងឺរលាកក្រពះនិងពោះវៀន គួរលាងសម្អាតដៃឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាមួយនឹងសាប៊ូនិងទឹកហូរចេញពីក្បាលម៉ាស៊ីន បន្ទាប់ពីប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺ។ ការសម្អាតផ្ទៃលើនិងសំលៀកបំពាក់ដែលប្រឡាក់ កាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសជំងឺនេះ។

នៅពេលជួតសម្អាតកម្មតបូលាមក៖

- សូមពាក់ស្រោមដៃ
- សូមលាងសម្អាតដៃជាមួយនឹងសាប៊ូនិងទឹកហូរចេញពីក្បាលម៉ាស៊ីនរយៈពេល 10 វិនាទីក្រោយពីដោះស្រោមដៃចេញ និងបោះវាចោល
- ប្រើកន្សែងក្រដាសឬកំទេចក្រណាត់ដែលបោះចោលក្រោយប្រើរួច ដើម្បីចាប់យកចេញនូវសារធាតុរឹងណាមួយ ហើយដាក់វាទៅក្នុងស្បែកផ្លាស្ទិកនិងបិទស្បែកឲ្យជិត មុនពេលដាក់វាទៅក្នុងធុងសំរាម
- ជួតសម្អាតវត្ថុឬផ្ទៃដែលប្រឡាក់ទាំងអស់ជាមួយនឹងទឹកក្តៅនិងសាប៊ូ ហើយទុកឲ្យវត្ថុឬផ្ទៃនោះស្ងួតពេញលេញ
- អ្នកខ្លះក៏សុំឲ្យពាក់ក្រណាត់គ្របច្រមុះមាត់ផងដែរ។

តើផ្នែកសុខភាពសាធារណៈមានវិធានការឆ្លើយតបអ្វីខ្លះ?

ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺរលាកក្រពះនិងពោះវៀនបង្កដោយវីរុស មានកំណើតនៅរដូវវស្សា និងកើតមានជាទូទៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារ និងទីកន្លែងស្នាក់នៅជាក្រុម ដោយមានរួមទាំងទីលំនៅថែទាំមនុស្សចាស់ មន្ទីរពេទ្យ មណ្ឌលថែទាំកុមារ និងសាលារៀន។ វេជ្ជបណ្ឌិតនិងមន្ទីរពេទ្យត្រូវប្រាប់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ នៅពេលដែលមានករណីទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាចំនួនយ៉ាងតិចពីរករណី ក្នុងការកើតមានជំងឺរលាកក្រពះនិងពោះវៀន។

ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈអាច៖

- ប្រាប់នូវរបៀបរកមើលដឹងការឆ្លងរាលដាល
- ប្រាប់នូវរបៀបគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាល
- ជួយអង្កេតការឆ្លងរាលដាលដើម្បីកំណត់ឲ្យដឹងនូវប្រភពនិងវិធីឆ្លងរាលដាល
- ផ្តល់ឱកាសអំពីការហាមឃាត់កុំឲ្យអ្នកមានជំងឺរលាកក្រពះនិងពោះវៀនទៅធ្វើការ សាលារៀន ឬការជួបជុំសាធារណៈផ្សេងទៀត។

ព័ត៌មានបន្ថែម - ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ (Public Health) នៅក្នុងរដ្ឋ NSW

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងវេជ្ជបណ្ឌិត ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈក្នុងតំបន់ ឬមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍របស់លោកអ្នក។ សូមរកមើលនៅក្រោមពាក្យ *NSW Government* នៅផ្នែកខាងមុខនៃសៀវភៅទូរស័ព្ទ *White Pages* ។

តំបន់ទីក្រុង	ទីតាំង	លេខទូរស័ព្ទ	តំបន់ជនបទ	ទីតាំង	លេខទូរស័ព្ទ
Northern Sydney/Central Coast	Hornsby	02 9477 9400	Greater Southern	Goulburn	02 4824 1837
	Gosford	02 4349 4845		Albury	02 6080 8900
South Eastern Sydney/Illawarra	Randwick	02 9382 8333	Greater Western	Broken Hill	08 8080 1499
	Wollongong	02 4221 6700		Dubbo	02 6841 5569
Sydney South West	Camperdown	02 9515 9420		Bathurst	02 6339 5601
Sydney West	Penrith	02 4734 2022	Hunter/New England	Newcastle	02 4924 6477
	Parramatta	02 9840 3603		Tamworth	02 6767 8630
Justice Health Service	Matraville	02 9311 2707	North Coast	Port Macquarie	02 6588 2750
NSW Department of Health	Nth Sydney	02 9391 9000		Lismore	02 6620 7500
NSW Health: www.health.nsw.gov.au					