

ເຈ້ຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່

ໂຮກກະເພາະແລະ ສຳໃສ້ອັກເສບ ຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັສ

ໂຮກກະເພາະແລະລຳໃສ້ອັກເສບສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮາກແລະຖອກທ້ອງ. ເຊື້ອໄວຣັສເຫຼົ່ານີ້ສາມາດແຜ່ຜ່າຍຈາກຄົນຕໍ່ຄົນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ການລ້າງມືໃຫ້ສະອາດດີດ້ວຍສະບູແລະນໍ້າກ້ອນນັ້ນເປັນສິ່ງສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ຜ່າຍ.

ສະບັບປັບປຸງແກ້ໄຂ: 29 ພຶສຈິກາ 2007

ໂຮກກະເພາະແລະລຳໃສ້ອັກເສບຍ້ອນໄວຣັສແມ່ນຫຍັງ?

ໂຮກກະເພາະແລະລຳໃສ້ອັກເສບຍ້ອນໄວຣັສ (Viral gastroenteritis) ແມ່ນການຕິດເຊື້ອໃນທ້ອງແລະໃສ້ທີ່ເປັນກັນຫຼາຍ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮາກແລະຖອກທ້ອງ. ໂຮກນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັສຫຼາຍຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ, ເຊັ່ນ Rotavirus ແລະ Norovirus (ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນເອີ້ນກັນວ່າໄວຣັສຄ້າຍຄື Norwalk). ນອກນີ້ ຍັງມີສາເຫດຢ່າງອື່ນອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນ gastroenteritis ຮວມມີເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ຢາເບື້ອ, ແມ່ທ້ອງ, ແລະພະຍາດທີ່ບໍ່ຕິດແປດບາງຢ່າງ.

ໂຮກນີ້ມີອາການຫຍັງແດ່?

ອາການໃຫຍ່ຂອງໂຮກ viral gastroenteritis ແມ່ນ ຮາກແລະຖ່າຍເປັນນໍ້າ. ອາການຢ່າງອື່ນກໍ່ຮວມມີການປຸ້ນທ້ອງ, ເປັນໄຂ້, ເຈັບໃນຊ່ອງທ້ອງ, ເຈັບຫົວ, ແລະເຈັບຕາມກ້າມເນື້ອ. ຈາກນັ້ນ ກໍ່ອາດມີອາການຮ່າງກາຍຂາດນໍ້າຕາມມາ. ອາດຈະໃຊ້ເວລາ ປະມານນຶ່ງຫາສາມມື້ກ່ອນສໍ່ສະແດງອາການແລະຕາມປົກກະຕິຈະເປັນຢູ່ປະມານນຶ່ງຫາສອງມື້, ບາງເທື່ອອາດເປັນດົນກວ່ານັ້ນ.

ໂຮກນີ້ແຜ່ຜ່າຍຢ່າງໃດ?

Viral gastroenteritis ແມ່ນໂຮກທີ່ແຜ່ຜ່າຍຢ່າງງ່າຍໂດຍທາງຮາກຫຼືອາຈິມຂອງຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ ໂດຍຜ່ານ:

- ໂດຍຜ່ານຄົນຕໍ່ຄົນ, ຕົວຢ່າງ ການຈັບມືກັບຄົນທີ່ເຈັບຢູ່ແລະທີ່ມີເຊື້ອໄວຣັສຕິດຢູ່ມືຂອງຄົນນັ້ນ
- ວັດຖຸທີ່ມີເຊື້ອໂຮກຕິດຢູ່
- ອາຫານແລະນໍ້າທີ່ມີເຊື້ອໂຮກຕິດຢູ່

ນອກນີ້ ເຊື້ອໂຮກຍັງອາດແຜ່ຜ່າຍຈາກສ່ວນທີ່ປົວໃນອາກາດເມື່ອຄົນຮາກ. ໃນກໍລະນີສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ, ການແຜ່ເຊື້ອຈະເກີດຈາກຄົນທີ່ສ່ຽງແຕ່ງອາການອອກມາໃຫ້ເຫັນແລ້ວ. ຄົນບາງຄົນກໍສາມາດ ແຜ່ຜ່າຍໂຮກໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ໂດຍບໍ່ສ່ຽງແຕ່ງອາການ, ໂດຍສະເພາະໃນລະຫວ່າງ 48 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກເຊົາແລ້ວ.

ແມ່ນໃຜແດ່ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຮກນີ້?

Viral gastroenteritis ສາມາດເປັນໄດ້ກັບຄົນທຸກອັນ.

ຈະປ້ອງກັນໂຮກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຫຼັງຈາກເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ, ປຸງຜ້າອ້ອມ, ແລະກ່ອນກິນຫຼືປຸງແຕ່ງອາຫານ, ໃຫ້ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດດີດ້ວຍສະບູ ແລະນ້ຳກອ້ກ ຢ່າງນ້ອຍເປັນເວລາ 10 ວິນາທີ ແລະ ເຊັດມືໃຫ້ແຫ້ງດ້ວຍຜ້າຂົນໝູທີ່ສະອາດ.

ຈະກວດຫາໂຮກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ການກວດຫາໂຮກ viral gastroenteritis ຕາມປົກກະຕິແມ່ນອີງໃສ່ອາການຂອງຄົນເຈັບ. ການຍັງຢືນຈາກຫ້ອງທົດລອງຖືວ່າສຳຄັນໃນລະຫວ່າງທີ່ໂຮກລະບາດ, ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ມີການວິຈັຍຕົວຢ່າງອາຈົມ.

ຈະຮັກສາໂຮກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ບໍ່ມີການຮັກສາຈຳເພາະສຳລັບໂຮກ viral gastroenteritis ນອກຈາກວ່າຕ້ອງພັກຜ່ອນແລະດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ. ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈະເຊົາເອງໂດຍບໍ່ມີອາການແຊກຊ້ອນຫຍັງ. ຢ່າງໃດກໍດີ, viral gastroenteritis ອາດຮ້າຍແຮງໄດ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ຮ່າງກາຍມີບັນຫາໃນການຮັບການທົດແທນນ້ຳ ແລະທາດເກືອຍ້ອນການຮາກ ແລະຖອກຫ້ອງ.

ຜູ້ທີ່ຮາກແລະຖອກຫ້ອງຄວນຈະ:

- ຢູ່ເຮືອນແລະບໍ່ໄປເຮັດວຽກຫຼືໄປໂຮງຮຽນຫຼືສູນດູແລເດັກໃນລະຫວ່າງທີ່ຍັງເຈັບຢູ່
- ບໍ່ປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ຄົນອື່ນຫຼືດູແລຄົນເຈັບ, ເດັກນ້ອຍ, ຫຼື ຜູ້ສູງອາຍຸ.
ການຮະມັດຮະວັງໃນເຮືອງດັ່ງກ່າວຄວນເຮັດຕໍ່ເນື່ອງຈົນກວ່າອາການຮາກແລະຖອກຫ້ອງຈະຢຸດ.
ການກະທຳດັ່ງນີ້ແມ່ນຄວນເຮັດໂດຍຜູ້ທີ່ປຸງແຕ່ງອາຫານຢູ່ໃນເຮືອນຕົນເອງຫຼືເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮງງານ ຜລິດອາຫານ.
- ໃຫ້ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດດີດ້ວຍສະບູແລະນ້ຳກອ້ກເປັນເວລາ 10 ວິນາທີຫຼັງຈາກເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ.
- ໃຫ້ດື່ມນ້ຳແບບໃສງຫຼາຍໆ, ຕົວຢ່າງນ້ຳໝາກໄມ້ຫຼືນ້ຳອັດລົມ ປະສົມ 1 ສ່ວນຕໍ່ນ້ຳລ້ຳ 4 ສ່ວນ, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນອາການຮ່າງກາຍ ຂາດນ້ຳ. ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນນ້ຳໝາກໄມ້ຫຼືນ້ຳອັດລົມທີ່ບໍ່ໄດ້ປົນນ້ຳເພາະວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເພີ່ມອາການຂາດ ນ້ຳແລະຖອກຫ້ອງ ຫຼາຍ ຂຶ້ນຕື່ມ.
ນ້ຳແຮ່ທີ່ໃຊ້ຕື່ມເພື່ອທົດແທນນ້ຳແລະທາດເກືອທີ່ສູນເສຍໄປນັ້ນມີຂາຍຕາມຮ້ານຂາຍຢາທົ່ວໄປ.
ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳຢ່າງຮຸນແຮງອາດຕ້ອງໄດ້ໃສ່ນ້ຳທະເລ.

ສຳລັບຜູ້ທີ່ດູແລຄົນເຈັບດ້ວຍໂຣກ gastroenteritis ຄວນລ້າງມືໃຫ້ສະອາດດີດ້ວຍສະບູແລະນ້ຳກອ້ກຫຼັງຈາກທີ່ຈັບບາຍຄົນເຈັບ. ການລ້າງພື້ນແລະຊັກເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ເປື້ອນຈະຊ່ວຍລົດຜ່ອນການແຜ່ຜາຍຂອງເຊື້ອໄວຣັສນີ້ໄດ້.

ເວລາທຳຄວາມສະອາດຮາກຫຼືອາຈົມ:

- ໃຫ້ໃສ່ຖົງມື
- ໃຫ້ລ້າງມືດ້ວຍສະບູແລະນ້ຳກອ້ກເປັນເວລາ 10 ວິນາທີຫຼັງຈາກດຶງຖົງມືຖິ້ມແລ້ວ
- ໃຫ້ໃຊ້ເຈ້ຍທີ່ໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມໂລດຫຼືຜ້າເສດຈັບເອົາວັດຖຸໃດໆທີ່ເປື້ອນແລະຫໍ່ມັນໄວ້ໃນຖູງຢາງກ່ອນນຳເອົາໄປຖິ້ມໃສ່ໃນຖັງ ຂີ້ເຫຍື້ອ.
- ໃຫ້ທຳຄວາມສະອາດວັດຖຸຫຼືພື້ນດ້ວຍນ້ຳຮ້ອນແລະນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອແລະປ່ອຍໃຫ້ ແຫ້ງຢ່າງທີ່ວ່າເຖິງ.
- ບາງຄົນກໍແນະນຳໃຫ້ໃສ່ຜ້າອັດດັງ.

ທາງການສາທາຣະນະສຸກມີທ່າທີ່ຢ່າງໃດກ່ຽວກັບໂຣກນີ້?

ການລະບາດຂອງໂຣກ viral gastroenteritis ຈະມີເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊ່ວງຣະດູໜາວ ແລະມັກເປັນພາຍໃນຄອບຄົວຫຼືບ່ອນທີ່ໂຮມກັນ ຊຶ່ງຮວມມີ ບ້ານພັກຄົນຊະຣາ, ໂຮງໝໍ, ສູນຝາກເດັກ, ແລະໂຮງຮຽນ. ທ່ານໝໍແລະໂຮງໝໍຕ້ອງ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ທາງຜແນກ ສາທາຣະນະສຸກ ໃນເຂດທີ່ທ່ານຢູ່ ເມື່ອໃດທີ່ມີຢ່າງນ້ອຍສອງກໍຣະນີຂອງໂຣກ gastroenteritis ຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັນ.

ທາງຜແນກສາທາຣະນະສຸກສາມາດ:

- ແນະນຳວ່າຈະຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າມີການລະບາດຂອງໂຣກນີ້
- ແນະນຳວ່າຈະຄວບຄຸມໂຣກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ
- ຊ່ວຍຕິດຕາມເບິ່ງການລະບາດເພື່ອໃຫ້ຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ມາແລະຮູບແບບການແຜ່ຜາຍໃຫ້ກັນ
- ແນະນຳໃນການແຍກຄົນທີ່ເປັນໂຣກ viral gastroenteritis ອອກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ, ໂຮງຮຽນຫຼືແຫຼ່ງຊຸມນຸມອື່ນໆ.

ຮາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ - ຜແນກສາທາຣະນະສຸກແຫ່ງຣັດ NSW

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທ່ານໝໍຂອງທ່ານ, ຜແນກສາທາຣະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ສູນອະນາໄມຊຸມຊົນ - ໃຫ້ເບິ່ງພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຮຽບຮ້ອນປະຈຳຣັດ *NSW Government* ທາງໜ້າຂອງສມຸດ ໂທຣະສັບ (White Pages).

ເຂດໃນຕົວເມືອງ	ສະຖານທີ່	ເລກໂທຣະສັບ	ເຂດຊົນນະບົດ	ສະຖານທີ່	ເລກໂທຣະສັບ
Northern Sydney/Central Coast	Hornsby	02 9477 9400	Greater Southern	Goulburn	02 4824 1837
	Gosford	02 4349 4845		Albury	02 6080 8900
South Eastern Sydney/Illawarra	Randwick	02 9382 8333	Greater Western	Broken Hill	08 8080 1499
	Wollongong	02 4221 6700		Dubbo	02 6841 5569
Sydney South West	Camperdown	02 9515 9420		Bathurst	02 6339 5601
Sydney West	Penrith	02 4734 2022	Hunter/New England	Newcastle	02 4924 6477
	Parramatta	02 9840 3603		Tamworth	02 6767 8630
Justice Health Service	Matraville	02 9311 2707	North Coast	Port Macquarie	02 6588 2750
NSW Department of Health	Nth Sydney	02 9391 9000		Lismore	02 6620 7500
NSW Health: www.health.nsw.gov.au					