

# ជំងឺ គ្រីពតូស្ទ័រីទីឌីស (Cryptosporidiosis)

## Cryptosporidiosis

### តើជំងឺ cryptosporidiosis ជាអ្វី ?

- ជំងឺ cryptosporidiosis ជាជំងឺរាកមួយប្រភេទបង្កឡើងដោយប៉ារ៉ាស៊ីតឈ្មោះ Cryptosporidium ដែលយាយីពោះវៀន ។
- ការឆ្លងមេរោគ cryptosporidium ត្រូវគេរាយការណ៍ថា កើតមានមនុស្ស និងកសិដ្ឋានមួយចំនួនផ្សេងៗគ្នា, សត្វចិញ្ចឹម លេង និងពពួកសត្វក្នុងស្រុក។
- ទោះបីជាមានពួក cryptosporidium ច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នាក៏ដោយ ក៏មានតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះគឺ cryptosporidium parvum ត្រូវបានគេគិតថាបង្កឲ្យមានការឆ្លងចំពោះមនុស្ស ។
- ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ NSW បានទទួលដំណឹងអំពីជំងឺ cryptosporidiosis តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៦ម៉្លេះ។ ចំនួនករណីជំងឺនេះច្រើនកើនឡើងនៅរដ្ឋក្តៅនៅរដ្ឋ NSW ។

### តើជំងឺនេះឆ្លងរាលដាលយ៉ាងដូចម្តេច ?

- មេរោគ cryptosporidium មានវត្តមានក្នុងលាមករបស់មនុស្សនិងសត្វដែលមានមេរោគហើយឆ្លងតាមរយៈការលេបចូលតាមមាត់នូវលាមកដែលមានមេរោគ ។
- ជំងឺនេះឆ្លងបន្តនៅពេលដែលមានការលេបទំពារប៉ារ៉ាស៊ីតនេះ។
- ការចំលងភាគច្រើនកើតឡើងតាមរយៈ ៖
  - ការប៉ះពាល់រវាងមនុស្សម្នាក់និងមនុស្ស ជាពិសេសក្នុងគ្រួសារ និងក្នុងចំណោមក្មេងតូចៗ (ឧទាហរណ៍ មណ្ឌលថែរក្សាកូនក្មេង)។
  - ការទទួលទានទឹកដែលមានមេរោគ
  - ហែលទឹកក្នុងអាងហែលទឹកដែលមានមេរោគ
  - ចំណីអាហារ (ក្នុងករណីកំរ)
  - ប៉ះពាល់សត្វដែលមានផ្ទុកមេរោគ
  - សកម្មភាពផ្លូវភេទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ះពាល់ជាមួយលាមក
- មនុស្សដែលងាយចំលងមេរោគខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលពួកគេមានជំងឺរាក។ យ៉ាងណាមិញ ប៉ារ៉ាស៊ីតនៅតែអាចបញ្ចេញមកក្រៅ ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ បើទុកណាជាពេលសញ្ញាបានបាត់អស់ក្តី។

### តើមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ ?

- រោគសញ្ញានៃជំងឺ cryptosporidiosis ដែលកើតមានញឹកញាប់ គឺ រាកស្មៅតែទឹក, ចុកពោះ, ក្តៅខ្លួន, ក្អក និងចង្កេះ ។ រោគសញ្ញាទាំងនេះអាចបណ្តាលឲ្យស្រកទម្ងន់ និង បាត់បង់ជាតិទឹក ។

- បណ្តាសញ្ញាដំបូងនៃជំងឺនេះលេចឡើងក្នុងរវាង ១-១២ ថ្ងៃ (ជាមធ្យម ៧ ថ្ងៃ) បន្ទាប់ពីជនណាម្នាក់បានឆ្លងមេរោគ ។
- ក្នុងករណីខ្លះពុំមានចេញជាមេរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ ។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ជនទាំងនោះ នៅតែអាចចំលងជម្ងឺទៅអ្នកផ្សេងទៀតបានដែរ។
- មនុស្សដែលមានសុខភាពល្អ ភាគច្រើននឹងជាសះស្បើយឡើងវិញ ក្នុងរវាងពេលមិនដល់ ២ សប្តាហ៍ផង។
- មនុស្សដែលមានប្រព័ន្ធការពាររោគចុះខ្សោយ អាចមានមេរោគសញ្ញាច្រើនជាងនេះ ដែលអាចបិទថែរអស់ពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ ។

**តើគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាលជម្ងឺនេះយ៉ាងដូចម្តេច ?**

- បើសិនលោកអ្នកមានរាករូស គេមានមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យជឺង គឺទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិត និងយកលាមកទៅពិនិត្យ បើសិនការរាកនេះ បង្កឡើងដោយ cryptosporidiosis នោះ។
- ការទទួលបានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះអ្នកមានជម្ងឺរាក ដើម្បីជៀសវាងកង្វះជាតិទឹក ។
- គេពុំមានការព្យាបាលជាក់លាក់ចំពោះជម្ងឺ cryptosporidiosis ទេ។

**តើគេបង្ការជម្ងឺនេះយ៉ាងដូចម្តេច ?**


ដើម្បីជៀសវាងការកើតជម្ងឺ cryptosporidiosis ត្រូវ ៖

- លាងដៃជាប្រចាំជាមួយសាប៊ូនិងទឹកម៉ាស៊ីនឲ្យបានស្អាតក្រោយពេលចេញពីបង្គន់, ប៉ះពាល់សត្វពាហនៈ, ផ្លាស់ប្តូរកន្ទួប ឬ ធ្វើការក្នុងស្ថានច្បារ និងមុនពេលរៀបចំម្ហូបអាហារនិងភោជនៈ។
- មិនត្រូវទទួលបានទឹកដែលមិនមានការសម្លាប់មេរោគទេ (ឧទាហរណ៍ ទឹកស្ទឹង/ទន្លេ, អូរ, បឹង ,និងត្រពាំង)។ ការដាំទឹកដែលបានមកពីប្រភពទាំងនេះឲ្យពុះ ឲ្យបានមួយនាទីនឹងអាចសំលាប់មេរោគបានដោយរួមទាំងមេរោគនៃជម្ងឺ cryptosporidiosis ផង។

**ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងរាលដាលនៃជម្ងឺ Cryptosporidiosis :**

- កុំឲ្យក្មេងតូចៗដែលមានជម្ងឺរាករូសទៅសាលា, មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាក្មេង ឬ លេងជាក្រុមរហូតដល់ជម្ងឺរាករូសបាត់ទាំងស្រុង។
- អ្នករៀបចំម្ហូបអាហារ, អ្នកថែទាំក្មេង និង បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពដែលមានជម្ងឺ cryptosporidiosis មិនគួរ ធ្វើការទេរហូតទាល់តែជម្ងឺរាករូសបាត់ទាំងស្រុង ។
- ក្រោយពីយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយអាទិត្យដែរ បន្ទាប់ពីជម្ងឺរាកនេះបានជាសះស្បើយ លោកអ្នកមិនត្រូវ : ប្រើអាងហែលទឹក ឬក៏កន្លែងមុជទឹកកំសាន្តផ្សេងៗទៀតដែរ, ឬក៏ប្រើប្រាស់ស្រោមពូក, ខ្នើយ ឬ កន្សែងពោះគោរួមជាមួយអ្នកផ្សេងទៀត។

ព័ត៌មានបន្ថែម - ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ (Public Health) នៅក្នុងរដ្ឋ NSW



**1300 066 055**

**[www.health.nsw.gov.au](http://www.health.nsw.gov.au)**