

Информативен лист за заразни болести

Криптоспоридиозата е болест која се предизвикува со голтање на паразитот *Cryptosporidium*. Таа воглавно предизвикува пролив и грчеви во стомакот.

... ?

Cryptosporidium,
Cryptosporidium

Cryptosporidium,
Cryptosporidium parvum *Cryptosporidium*
hominis

... ?

... % %& fl +

... ?

Cryptosporidium

fl

- да не користат крпи за бришење или постелнина заедно со други лица најмалку две недели откако ќе престанат да имаат пролив
- да не ракуваат со храна најмалку 48 часа откако ќе престанат да имаат пролив.

Малите деца со пролив треба да останат дома и да не одат на училиште, во установа за деца на претшколска возраст, центар за дневен престој на деца или игротека додека не поминат 24 часа откако сосема престанале да имаат пролив.

Како се поставува дијагноза?

Криптоспоридиозата ја потврдува доктор откако ќе направи проверка на примерок од изметот.


Како се лекува болеста?

Не постои одредено лекување за криптоспоридиозата. Пијте многу течности за да избегнете да се дехидрирате.

Како реагира здравството?

Според *Законот за здравство од 1991*, лабораториите се обврзани да ги пријават случаите на криптоспоридиоза во локалната државна служба за здравство. Државните служби за здравство ги испитуваат случаите и ги прегледуваат можните извори на зараза за да го спречат понатамошното ширење на болеста.

Further information – Public Health Units in NSW



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au