


悉尼性保健中心



悉尼性保健中心提供免费，保密和全面性的服务，以便帮助你掌管你的性方面的健康。本服务帮助你维持性方面的健康的方法是提供性感染的检验，疫苗接种和处理，包括人体免疫力缺乏病毒(简称 HIV)，乙型肝炎(HEPATITIS B)，女士和男士性健康方面的医疗服务，教育，给予个别人士和夫妻的辅导，及注射和针筒的交换。本服务让你选择见男或女的医生，护士和辅导员，他们都会尊重你的生活方式和性行为。

无需出示医疗卡

Opening hours

Please visit our website

Web Address:

<http://www.sshc.org.au/>

Telephone Number: 02 9382 7440

Sexual Health Info line: 1800 451 624

新南威尔士州性保健

免费和保密的性保健方面的医疗服务

Albury	Ph: (02) 6058 1840
Armidale	Ph: (02) 6776 4738
Bourke	Ph: (02) 6872 2145
Broken Hill	Ph: (08) 8080 1556
Canberra	Ph: (02) 6244 2184
Coffs Harbour	Ph: (02) 6656 7865
Dareton	Ph: (03) 5021 7200
Dubbo	Ph: (02) 6885 1700
Forster	Ph: (02) 6555 6822
Gosford	Ph: (02) 4320 2114
Goulburn	Ph: (02) 4827 3913
Griffith	Ph: (02) 6966 9900
Katoomba	Ph: (02) 4784 6560
Kings Cross	Ph: (02) 9360 2766
Kogarah	Ph: (02) 9350 2742
Lightning Ridge	Ph: (02) 6829 1022
Lismore	Ph: (02) 6620 2980
Liverpool	Ph: (02) 9827 8022
Manly	Ph: (02) 9977 3288
Marrickville	Ph: (02) 9560 3057
Mt Druitt	Ph: (02) 9881 1733
Newcastle	Ph: (02) 4923 6909
Nowra	Ph: (02) 4423 9353
Orange	Ph: (02) 6392 8600
Parramatta	Ph: (02) 9843 3124
Penrith	Ph: (02) 4734 2507
Port Kembla	Ph: (02) 4276 2399
Queanbeyan	Ph: (02) 6298 9233
Richmond	Ph: (02) 4578 1622
St Leonards	Ph: (02) 9926 7414
Sydney City	Ph: (02) 9382 7440
Tamworth	Ph: (02) 6766 3095
Taree	Ph: (02) 6592 9421
Wagga Wagga	Ph: (02) 6938 6492



人如何受到感染?

梅毒通常是由于没有使用避孕套而与患者进行阴道,肛门或口腔性交时受到感染的.它也能在怀孕期间由受感染的妇女传给胎儿.

如何知道患有梅毒?

梅毒有四个不同的时期. **早期梅毒** 发生在性交后 10-90 天,在感染部位出现一个溃疡.溃疡通常是不痛的,所以不引起注意. 在 2-6 周内溃疡便自动愈合. 在最初感染后约 7-10 周就发展为**二期梅毒**. 这个时期, 患者可能会出现一系列症状,包括类似感冒的症状,或手心和脚心的皮疹. 这些症状通常比较轻微而且可以自动消失,所以也可能不引起注意.其后,感染便成为潜伏性的. **潜伏期梅毒** 没有症状,感染在这个时期可以持续数年. 在 3-35 年后,可以发展为三期梅毒. **三期梅毒** 可以造成内脏器官的损害,如脑,脊髓和心脏.

如何检测梅毒?

梅毒可以通过血液检测得以诊断. 血液检测可以在医生或性健康门诊进行.

有无治疗方法?

一旦发现患有梅毒,可以通过注射抗生素或服用抗生素治疗. 治疗时间的长短在于所处的感染期.

性伴侣是否需要治疗?

这在于所处的感染期以及如何受到的感染. 医生或护士将会和你讨论这些问题.

对梅毒患者有哪些忠告?

- ★ 治愈梅毒必须要完成整个疗程的治疗.
- ★ 在开始治疗的几天,会出现类似感冒的症状,这是正常的反应.
- ★ 如果在治疗的第二天后出现皮疹或其它症状,应通知医生或护士.因为这些症状可能表示患者有过敏反应.
- ★ 完成治疗后,应继续进行接下来的血液检测.这是为了保证感染可以被充分治愈.
- ★ 经过第一个星期治疗后,一般可以进行性行为.详情可询问医生或护士.

以后的梅毒血液检测能显示什么?

如果你曾患有梅毒,那么以后的梅毒血液检测常会显示出来. 但这并不能避免你再次受到感染.

如何正确使用避孕套



- 选择一个适合你的品牌的避孕套.
- 不要用牙咬开包装. 不要用指甲撕破避孕套.
- 查看使用日期.



- 挤压住避孕套的末端并套在勃起的阴茎上.
- 如果没有进行过包皮切割手术,在戴避孕套之前拉开包皮.
- 将避孕套完全戴到阴茎的根部.



- 经常使用水性润滑剂.
- 不要使用按摩油或凡士林.
- 在性交过程中,经常检查避孕套是否保持在原位.



- 性交结束后,在阴茎仍勃起的情况下取下避孕套.
- 紧握避孕套的根部以避免精液流出.
- 一个避孕套只能使用一次.