

## 시드니 성건강 센터



시드니 성건강 센터는 비공개적이고 무료이며 여러분의 성건강 관리에 도움이 되는 포괄적 서비스를 제공합니다. 본 서비스는 예비검사, 예방접종, HIV 와 B 형 간염을 비롯한 성병 관리, 남녀 성건강 관리, 교육, 개인 및 커플 상담, 주사기 및 주사바늘 교환 등을 통해 여러분의 성건강에 도움을 드립니다. 본 서비스는 여러분의 라이프스타일과 성적 특질을 존중하는 남녀 의사/간호사/카운셀러로 구성되어 있습니다.

**메디케어 카드가 필요없음**

### Opening hours

Please visit our website

### Web Address:

<http://www.sshc.org.au/>

**Telephone Number:** 02 9382 7440

**Sexual Health Info line:** 1800 451 624

## NSW 성건강 서비스

### 무료 & 비공개 성건강 관리

Albury	Ph: (02) 6058 1840
Armidale	Ph: (02) 6776 4738
Bourke	Ph: (02) 6872 2145
Broken Hill	Ph: (08) 8080 1556
Canberra	Ph: (02) 6244 2184
Coffs Harbour	Ph: (02) 6656 7865
Dareton	Ph: (03) 5021 7200
Dubbo	Ph: (02) 6885 1700
Forster	Ph: (02) 6555 6822
Gosford	Ph: (02) 4320 2114
Goulburn	Ph: (02) 4827 3913
Griffith	Ph: (02) 6966 9900
Katoomba	Ph: (02) 4784 6560
Kings Cross	Ph: (02) 9360 2766
Kogarah	Ph: (02) 9350 2742
Lightning Ridge	Ph: (02) 6829 1022
Lismore	Ph: (02) 6620 2980
Liverpool	Ph: (02) 9827 8022
Manly	Ph: (02) 9977 3288
Marrickville	Ph: (02) 9560 3057
Mt Druiit	Ph: (02) 9881 1733
Newcastle	Ph: (02) 4923 6909
Nowra	Ph: (02) 4423 9353
Orange	Ph: (02) 6392 8600
Parramatta	Ph: (02) 9843 3124
Penrith	Ph: (02) 4734 2507
Port Kembla	Ph: (02) 4276 2399
Queanbeyan	Ph: (02) 6298 9233
Richmond	Ph: (02) 4578 1622
St Leonards	Ph: (02) 9926 7414
Sydney City	Ph: (02) 9382 7440
Tamworth	Ph: (02) 6766 3095
Taree	Ph: (02) 6592 9421
Wagga Wagga	Ph: (02) 6938 6492



### 전염 경로는 어떻게 되나?

매독은 일반적으로 감염된 사람과 콘돐을 사용하지 않고 가진 질섹스, 항문섹스, 또는 오럴섹스를 통해 전염됩니다. 그리고 임신부가 감염되었을 경우 태아에게 전염될 수도 있습니다.

### 매독의 증상은 어떻게 나타나나?

매독은 4 단계로 나뉩니다. **제 1 기 매독**의 경우는 접촉후 약 10-90 일에 감염 부위에 상처가 나타납니다. 이 상처는 보통 무통성이어서 모르고 지나치는 경우가 많습니다. 상처는 2-6 주 내에 자연적으로 치유됩니다. **제 2 기 매독**은 감염된 지 약 7-10 주 후에 진전됩니다. 이 기간 동안에는 감기와 비슷한 증상이나 손바닥과 발바닥의 발진 등, 여러 가지 증상이 나타날 수 있습니다. 이 증상들은 보통 가볍게 나타났다가 저절로 사라지므로 역시 모르고 지나칠 수 있습니다. 그리고 나서는 잠복성 매독이 됩니다. **잠복성 매독**의 경우는 증상이 나타나지 않으며 감염 상태가 이 단계에서 수 년간 계속될 수 있습니다. 3-35 년 후에는 제 3 기 매독으로 진전될 수 있습니다. **제 3 기 매독**은 뇌, 척수, 심장 등, 장기의 손상으로 그 증상이 나타납니다.

### 매독의 검사 방법은 어떻게 되나?

매독은 혈액 검사로 진단할 수 있으며, 의원 또는

### 섹스파트너도 치료를 받아야 하나?

이것은 매독의 단계와 감염된 경로에 따라 달라집니다. 이 문제에 관해서는 담당 의사/간호사와 상의하게 될 것입니다.

### 매독에 감염된 사람이 주의해야 할 사항은?

- ★ 매독을 완치하려면 치료를 완전히 끝내야 합니다.
- ★ 치료를 받기 시작한 후 첫 몇 일 동안 감기와 비슷한 증상이 나타나는 것은 정상입니다.
- ★ 첫 치료를 받은 다음날 이후에 몸에 발진이 나타나거나 기타 증상이 나타날 경우에는 간호사나 의사에게 알려야 합니다. 이런 증상들은 알러지 반응일 가능성도 있습니다.
- ★ 치료를 완료한 후에는 추후 혈액검사를 하는 것이 바람직합니다. 이 혈액검사는 매독이 완치되었는지 확인하기 위한 것입니다.
- ★ 치료를 받기 시작하여 1 주일이 지난 후에는 일반적으로 성교를 해도 괜찮습니다. 의사나 간호사에게 물어보십시오.

### 매독 혈액검사 결과는 앞으로 어떻게 나타날 것인가?

매독에 감염된 적이 있는 사람의 경우에는 매독 혈액검사를 할 때마다 그 증거가 나타날 것입니다. 하지만 애석하게도 혈액검사에 이 증거가

### 콘돐을 바르게 사용하는 방법

편안하게 맞는 브랜드를 선택합니다.

포장을 뜯을 때 치아를 사용하지 않도록 합니다. 콘돐을 손톱으로 찢는 일이 없도록 주의합니다. “사용 유효” 날짜를 확인합니다.



콘돐의 끝부분을 잡고 누른 후 발기한 음경 위에 펼칩니다. 포경수술을 하지 않은 경우에는 포피를 뒤로 잡아당기고 펼칩니다. 콘돐을 음경의 밑부분까지 완전히 펼칩니다.



반드시 수성 윤활제를 사용합니다. 기름이나 바셀린을 사용하면 안됩니다. 섹스 도중 콘돐이 빠지지 않았는지 확인합니다.



끝난 후에는 음경이 여전히 발기된 상태에서 뺍니다.



뺍 때는 콘돐이 같이 나오도록 내용물이 흘러나오지 않도록 콘돐의 밑부분을 잡고 뺍니다. 콘돐은 일회용입니다.