

## បណ្តាញព័ត៌មានអំពីជំងឺឆ្លង

# ជំងឺរាកមូល

រាកមូលគឺជាជំងឺរាកមូលមួយបង្កដោយការឆ្លងបាក់តេរី **Shigella** ។ ជំងឺនេះបណ្តាលឲ្យរាក ហើយអាចឆ្លងដោយងាយស្រួលនៅក្នុងចំណោមមនុស្សយើង។ អនាម័យល្អគឺជាវិធីសំខាន់ដើម្បីបង្ការជំងឺនេះ។

### តើជំងឺរាកមូលគឺជាអ្វី?

រាកមូល គឺជាជំងឺរាកមូលមួយដែលបង្កដោយការឆ្លងបាក់តេរី *Shigella* ។

### តើជំងឺនេះមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ?

ជាធម្មតាការឆ្លង *Shigella* បណ្តាលឲ្យរាក ត្រងក្តៅ ចង្កោរ ក្អក និងចុករមាស់ពោះ។ ជាញឹកញយលាមកអាចមានលាយឈាម ឬសំបោរ។ រោគសញ្ញាចាប់ផ្តើមនៅពេល 1-7 ថ្ងៃ (ជាធម្មតាគឺ 1-3 ថ្ងៃ) ក្រោយពីឆ្លងបាក់តេរីនេះហើយ។ ជាធម្មតារោគសញ្ញាមានរយៈពេល 4-7 ថ្ងៃ ប៉ុន្តែជួនកាលយូរជាងនេះ។

### តើជំងឺនេះឆ្លងតាមរបៀបណា?

ជំងឺរាកមូលឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀតតាមរយៈការចម្លងលាមកចូលទៅក្នុងមាត់ តាមរយៈការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬមិនផ្ទាល់ និងជាតិលាមក។ ការឆ្លងនេះកើតមានជាទូទៅចំពោះមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានការព្យាបាលទឹកប្រព័ន្ធមិនល្អ ជាពិសេសក្រោយពីទៅបង្គន់ ឬផ្លាស់ក្រណាត់កន្ទប និងជាលទ្ធផលនៃការប៉ះពាល់រួមភេទ។ ការឆ្លងបាក់តេរី *Shigella* ក៏កើតមានពីការបរិភោគអាហារដែលមានបាក់តេរីនេះផងដែរ។ សត្វរុយក៏អាចពាំនាំ *Shigella* ហើយអាចចម្លងបាក់តេរីនេះទៅក្នុងអាហារបានដែរ។

អ្នកខ្លះអាចមាន *Shigella* នៅក្នុងលាមករបស់ខ្លួនរយៈពេលច្រើនអាទិត្យនិងគ្មានរោគសញ្ញាសោះឡើយ ហើយនៅតែចម្លងបាក់តេរីនេះទៅកាន់អ្នកដទៃដែរ។

### តើវិធីបង្ការជំងឺនេះធ្វើឡើងដោយរបៀបណា?

ដើម្បីបង្ការជំងឺរាកមូល៖

- លាងសំអាតឲ្យបានម៉ត់ចត់នូវបន្លែផ្លែឈើស្រស់ដែលត្រូវបរិភោគ
- លាងសំអាតដៃលោកអ្នកឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាមួយទឹកស្អាត និងទឹករមាស់ពោះយ៉ាងតិច 10 វិនាទី
  - ក្រោយពីទៅបង្គន់
  - ក្រោយពីផ្លាស់ក្រណាត់កន្ទប
  - ក្រោយពីប៉ះជាតិលាមក
  - មុនពេលរៀបចំទុកដាក់អាហារ ឬថែទាំអ្នកដទៃ។

អ្នកកើតជំងឺរាកម្មល គួរចៀសវាងធ្វើការនិងមិនគួររៀបចំអាហារឬថែទាំអ្នកដទៃឡើយនៅក្នុងពេលដែលខ្លួនមានជំងឺ។ កុមារមានជំងឺ ជាពិសេសកុមារប្រើក្រណាត់កន្ទប គួរនៅផ្ទះនិងកុំទៅមណ្ឌលថែទាំកុមាររយៈពេល 24 ម៉ោង ក្រោយពីលែងរាកទៅទៀត។ កុមារនិងជនពេញវ័យគួរចៀសវាងការហែលទឹក រហូតទាល់តែលែងរាកទៅទៀត។

អ្នកដែលធ្វើការជាអ្នករៀបចំទុកដាក់អាហារ ឬដែលថែទាំកុមារឬមនុស្សចាស់ មិនគួរទៅធ្វើការវិញរយៈពេល 48 ម៉ោង ក្រោយពីលែងរាកទៅហើយ។

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ (Public Health Unit) មណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ ឬ វេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងតំបន់លោកអ្នក។

### តើអ្នកណាខ្លះដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺនេះ?

ជំងឺមូលអាចកើតមានចំពោះជនរាល់រូប។ ប៉ុន្តែកុមារ អ្នកមានប្រព័ន្ធការពារទប់ទល់រោគទង់ខ្សោយ និងមនុស្សចាស់ មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតក្នុងការកើតជំងឺនេះ។

### តើការវិនិច្ឆ័យរោគធ្វើទៅតាមរបៀបណា?

ការវិនិច្ឆ័យរោគមូលតម្រូវឲ្យរកមើលវត្ថុមាននៃបាក់តេរី *Shigella* នៅក្នុងសំណាកលាមក។ វេជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកអាចបញ្ជាឲ្យធ្វើតេស្តនេះ បើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាទាំងឡាយ។

### តើវិធីព្យាបាលជំងឺនេះធ្វើឡើងដោយរបៀបណា?


ជាធម្មតា អ្នកកើតជំងឺនេះមិនសូវខ្លាំងក្លានិងជាសះស្បើយដោយគ្មានការព្យាបាលអ្វីឡើយ។ ការទទួលទានជាតិទឹកឲ្យបានច្រើន មានសារសំខាន់ក្នុងការចៀសវាងកង្វះជាតិទឹកក្នុងខ្លួន។ កុមារក្មេងខ្ចី(ជាពិសេសទារក)អាចបាត់បង់ជាតិទឹកដោយសារការរាករូស ដូច្នេះមាតាបិតាគួរស្វែងរកការព្យាបាល។

ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកអាចព្យាបាលជំងឺរាកម្មលធ្ងន់ធ្ងរ ប៉ុន្តែបាក់តេរី *Shigella* ខ្លះអាចសាំនិងថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកបាន។

### តើផ្នែកសុខភាពសាធារណៈមានវិធានការឆ្លើយតបអ្វីខ្លះ?

មន្ទីរពិសោធន៍ត្រូវរាយការណ៍នូវករណីទាំងឡាយនៃជំងឺរាកម្មលដោយសារ *Shigella* ប្រាប់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ (Public Health Unit) ក្នុងតំបន់។ នៅពេលរកមើលដឹងចង្កោមនៃជំងឺនេះហើយ បុគ្គលិកផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនឹងធ្វើសម្ភាសន៍អ្នកជំងឺទាំងឡាយនិងអ្នកថែទាំអ្នកទាំងនោះ ដើម្បីខិតខំរកមើលឲ្យដឹងនិងគ្រប់គ្រងប្រភពទូទៅនៃការកើតមានជំងឺនេះ។

ព័ត៌មានបន្ថែម - ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ (Public Health) នៅក្នុងរដ្ឋ NSW



1300 066 055

[www.health.nsw.gov.au](http://www.health.nsw.gov.au)