

ເຈັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່

ໂຮກຖອກທ້ອງແມ່ນພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຊຸມິດນຶ່ງຊື່ງເອີ້ນ ວ່າ **Shigella**. ພະຍາດນີ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ອາການ ຖອກທ້ອງແລະສາມາດແຜ່ຜ່າຍ ໃຫ້ກັນ ໄດ້ໂດຍງ່າຍດາຍ. ການມີ ອະນາໄມທີ່ດີ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການ ປ້ອງກັນ.

ໂຮກຖອກທ້ອງ

ໂຮກຖອກທ້ອງແມ່ນຫຍັງ?

ໂຮກຖອກທ້ອງແມ່ນພະຍາດທີ່ເຮັດໃຫ້ຖ່າຍເປັນນ້ຳຊຶ່ງເກີດຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ *Shigella*.

ໂຮກນີ້ມີອາການຫຍັງແດ່?

ການຕິດເຊື້ອຈາກ *Shigella* ຕາມປົກກະຕິຈະເຮັດໃຫ້ຖອກທ້ອງ, ເປັນໄຂ້, ບຸ້ນທ້ອງ ແລະ ເຈັບຈຸກ ໃນທ້ອງ. ສ່ວນຫຼາຍ ໃນອາຈິມຈະມີເລືອດຫຼືມູກປົນຢູ່. ອາການຈະເລີ່ມພາຍໃນ 1-7 ມື້ (ປົກກະຕິ ແມ່ນ 1-3 ມື້) ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເຊື້ອແລ້ວ. ຕາມປົກກະຕິ ອາການຕ່າງໆຈະເປັນຢູ່ ລະຫວ່າງ 4-7 ມື້ ແຕ່ວ່າບາງທີກໍ່ເປັນ ດົນ ກວ່ານັ້ນ.

ໂຮກນີ້ແຜ່ຜ່າຍຢ່າງໃດ?

ໂຮກຖອກທ້ອງນີ້ຈະແຜ່ຜ່າຍໃຫ້ກັນຈາກຄົນຕໍ່ຄົນ ໂດຍທາງອາຈິມ-ມາເຖິງປາກ, ໂດຍການຕ້ອງຂູນກັບວັດຖຸ ທີ່ເປື້ອນອາຈິມໂດຍຕົງຫຼືຜ່ານທາງອື່ນ. ສ່ວນຫຼາຍ ພາວະດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຍ້ອນບໍ່ໄດ້ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດດີ, ໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກເຂົ້າທ້ອງນ້ຳຫຼືປຸງຜ້າອ້ອມ, ແລະ ຈາກການຮ່ວມເພດ. ເຊື້ອ *Shigella* ອາດຈະ ຕິດ ຈາກການກິນອາຫານທີ່ມີເຊື້ອໂຮກ. ແມງວັນກໍ່ສາມາດນຳ ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍມາໃສ່ອາຫານ ໄດ້ແລະເຮັດ ໃຫ້ ອາຫານເປື້ອ.

ຄົນຜູ້ນຶ່ງສາມາດມີເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ *Shigella* ຢູ່ໃນອາຈິມເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ ແລະ ບໍ່ສ່ຽງແດງອາການ ຫຍັງເລີຍ, ແຕ່ວ່າກໍ່ສາມາດແຜ່ຜ່າຍເຊື້ອໂຮກໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້.

ຈະປ້ອງກັນໂຮກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ການປ້ອງກັນໂຮກຖອກທ້ອງຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

- ລ້າງຜັກແລະໝາກໄມ້ທີ່ຈະກິນດິບ ໃຫ້ສະອາດ
- ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດດີດ້ວຍສະບູແລະນ້ຳຢ່າງນ້ອຍ 10 ວິນາທີ
 - ຫຼັງຈາກເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ
 - ຫຼັງຈາກປ່ຽນຜ້າອ້ອມ
 - ຫຼັງຈາກໄດ້ແຕະຕ້ອງວັດຖຸທີ່ເບື້ອນອາຈົມ
 - ກ່ອນຈັບບາຍອາຫານຫຼືດູແລຄົນອື່ນ.

ຄົນທີ່ເປັນໂຮກຖອກທ້ອງຄວນຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄປເຮັດວຽກແລະຕ້ອງບໍ່ປຸງແຕ່ງອາຫານຫຼືດູແລຄົນອື່ນ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຕົນຍັງເຈັບປ່ວຍຢູ່. ເດັກນ້ອຍທີ່ຖອກທ້ອງ, ໂດຍສະເພາະພວກທີ່ຍັງໃສ່ຜ້າອ້ອມຢູ່, ຄວນຢູ່ເຮືອນບໍ່ໃຫ້ໄປ ສູນ ດູແລເດັກເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກອາການຖອກທ້ອງຢຸດແລ້ວ. ເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ໃຫຍ່ຄວນ ຫຼີກເວັ້ນ ບໍ່ໄປລອຍນ້ຳຈົນກວ່າອາການຖອກທ້ອງຢຸດເສັຍກ່ອນ.

ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈັບບາຍອາຫານຫຼືດູແລເດັກນ້ອຍຫຼືຜູ້ສູງອາຍຸ ບໍ່ຄວນກັບໄປເຮັດວຽກເປັນເວລາ 48 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກອາການຖອກທ້ອງຢຸດລົງ.

ຖ້າຕ້ອງການຮາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກະຮຸນາຕິດຕໍ່ຜແນກສາທາຣະນະສຸກໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ, ສູນອະນາມັຍຊຸມຊົນ ຫຼື ທ່ານໝໍ.

ແມ່ນໃຜແດ່ທີ່ສ່ຽງຕໍ່ໂຮກນີ້?

ໂຮກຖອກທ້ອງແມ່ນເປັນໄດ້ກັບທຸກໆຄົນ; ຢ່າງໃດກໍດີ, ເດັກນ້ອຍ, ຄົນທີ່ມີລະບົບຕ້ານທານຕໍ່າ, ແລະຜູ້ສູງອາຍຸແມ່ນພວກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ຈະກວດຫາໂຮກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ການກວດຫາພະຍາດຖອກທ້ອງນີ້ຕ້ອງໄດ້ວິຈິຍໂດຍການກວດຫາເບິ່ງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ *Shigella* ຈາກຕົວຢ່າງອາຈົມ. ທ່ານໝໍຂອງທ່ານສາມາດສັ່ງໃຫ້ເຮັດການກວດນີ້ໄດ້ ຖ້າທ່ານມີອາການ.

ຈະປິ່ນປົວໂຮກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?


ຄົນທີ່ເປັນໂຮກນີ້ແບບບໍ່ແຮງຕາມປົກກະຕິກໍຈະເຊົາໄປເອງ. ການດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆເປັນສິ່ງສຳຄັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນ ອາການຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ. ເດັກນ້ອຍ (ໂດຍສະເພາະພວກອາຍຸຍັງນ້ອຍ) ມັກມີອາການຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ ໄດ້ງ່າຍຈາກການຖ່າຍທ້ອງ, ເພາະສະນັ້ນ ພໍແມ່ຄວນພາລູກໄປຫາໝໍ.

ຢາປະຕິຊີວະນະ (Antibiotics) ສາມາດນຳມາໃຊ້ປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອ *Shigella* ທີ່ເປັນຮຸນແຮງໄດ້, ຢ່າງໃດກໍດີ, ເຊື້ອໂຮກ *Shigella* ບາງຢ່າງກໍລື່ງຢາປະຕິຊີວະນະແລ້ວ.

ຜແນກສາທາຣະນະສຸກມີທ່າທີຢ່າງໃດຕໍ່ໂຮກນີ້?

ທາງຫ້ອງທົດລອງຕ້ອງໄດ້ລາຍງານກໍຣະນີຂອງການຕິດເຊື້ອ *Shigella* ໃຫ້ຜແນກສາທາຣະນະສຸກ ທ້ອງຖິ່ນຊາບ. ຖ້າວ່າເປັນກ້ອນເປັນກຸ່ມ, ພະນັກງານຂອງຜແນກສາທາຣະນະສຸກຈະສຳພາດຄົ້ນເຈັບ ຫຼືຜູ້ດູແລເພື່ອຈະໄດ້ຄົ້ນຫາແລະຄວບຄຸມແຫຼ່ງຂອງເຊື້ອໂຮກ.

ຮາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ - ຜແນກສາທາຣະນະສຸກແຫ່ງຣັດ NSW



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au