

يمكن أن تؤدي الإصابة ببكتيريا
المستدمية النزلية من النوع باء إلى
أمراض خطيرة تشمل التهاب السحايا
والتهاب اللهاة. ومع استخدام اللقاح
المضاد للمستدمية النزلية من النوع باء
أصبحت هذه الحالات نادرة الآن. والعلاج
العاجل ضروري لأن مرض المستدمية
النزلية من النوع باء يمكن أن يكون مهدداً
للحياة.

مرض المستدمية النزلية من النوع باء (Hib)

ما هو مرض المستدمية النزلية من النوع باء؟

ينتج مرض المستدمية النزلية من النوع باء عن العدوى ببكتيريا المستدمية النزلية من النوع باء.

يمكن أن تؤدي العدوى إلى:

- التهاب السحايا (التهاب الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي)
- التهاب اللهاة (ورم شديد في اللهاة الموجودة في مؤخرة الحلق)
- ذات الرئة (عدوى بالرئتين)
- التهاب النقي (التهاب العظام والمفاصل)
- التهاب النسيج الخلوي (التهاب الأنسجة الموجودة تحت الجلد، وعادة على الوجه)

يمكن أن تظهر هذه الحالات سريعاً، ويمكن لالتهاب السحايا والتهاب اللهاة أحياناً أن يكونا مميتين (يمكن أن تتسبب جراثيم أخرى كذلك في هذين المرضين). توجد أنواع أخرى من بكتيريا المستدمية النزلية (عدا النوع باء) ولكنها غير مرتبطة بالتفشييات. أصبحت الإصابات بالمستدمية النزلية من النوع باء نادرة الآن. ولكن قبل البدء في استخدام لقاح المستدمية النزلية من النوع باء كان المرض أكبر مسبب لالتهاب السحايا لدى الأطفال دون سن خمس سنوات.

ما هي الأعراض؟

تتوقف الأعراض على الجزء المصاب من الجسد.

- التهاب السحايا – الحمى والصداع وتيبس الرقبة والغثيان والقيء والنعاس
- ذات الرئة – قصر النفس والحمى وقلة الحيوية وفقدان الشهية والصداع والام الصدر والسعال.
- التهاب اللهاة – صعوبة التنفس والبلع والشحوب والحمى
- التهاب النقي – التورم والالتهاب والألم عند العظمة المصابة.

كيف ينتقل المرض؟

يمكن أن تعيش بكتيريا المستدمية النزلية من النوع باء بلا ضرر في حلق الأصحاء. وتنتقل البكتيريا عن طريق الاتصال بقطيرات من أنف أو حلق شخص مصاب في بيئة مشابهة للمنزل. وليس من الضروري أن تبدو الأعراض على الشخص لكي ينقل المرض.

من العرضة للخطر؟

يشمل الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة:

- الأطفال الأصغر من خمس سنوات
- الأطفال من السكان الأصليين ومن سكان جزر مضيق تورس
- المصابين بحالات طبية أخرى مثل مرض الخلية المنجلية أو فيروس نقص المناعة البشري / متلازمة نقص المناعة المكتسبة أو عدم عمل الطحال أو زرع نخاع العظام أو الذين يتلقون علاجاً للسرطان.

كيف يتم منع المرض؟

يُنصح بأربع جرعات من لقاح المستدمية النزلية من النوع باء في نيو ساوث ويلز لجميع الرضع في سن شهرين وأربعة وستة أشهر و12 شهراً.

كيف يتم تشخيص المرض؟

يمكن أن يشخص طبيبك المستدمية النزلية من النوع باء من أعراضك وعن طريق فحصك وإجراء بعض الاختبارات. وقد تشمل الاختبارات أخذ عينات لاختبارها بحثاً عن البكتيريا في الجزء المصاب من جسدك (على سبيل المثال الدم أو السائل المخي الشوكي).


كيف يتم علاج المرض؟

يتضمن العلاج المضادات الحيوية وأدوية للسيطرة على الحمى والألم (مثل الباراسيتامول) وسوائل لمنع الجفاف.

ما هو رد فعل الصحة العامة؟

يجب أن تبلغ المستشفيات والمختبرات وحدة الصحة العامة المحلية بحالات مرض المستدمية النزلية من النوع باء. يتعاون موظفو وحدة الصحة العامة مع الطبيب أو الممرض أو أقارب المريض لتحديد المتصلين المقربين المعرضين لخطر العدوى والإعداد لتلقيهم معلومات عن المرض ومضادات حيوية خاصة إذا دعت الضرورة.

معلومات إضافية – وحدات الصحة العامة في نيو ساوث ويلز



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au