

ការឆ្លងវីរុស បារម៉ា ហ្វ័រេស្ត (Barmah Forest) Barmah Forest virus infection

តើវីរុស Barmah Forest ជាអ្វី?

- វីរុស Barmah Forest ជាមេរោគមួយប្រភេទដែលអាចឆ្លងទៅមនុស្សតាមរយៈមូសខាំ។
- ការឆ្លងវីរុស Barmah Forest នៅគ្រាន់តែកាល អាចផ្តល់នូវការបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៅពេលអនាគត។
- វីរុស Barmah Forest ជាប់ពូជសន្តានជាមួយនឹងវីរុស Ross River ។

តើវីរុស Barmah Forest ឆ្លងរាលដាលយ៉ាងដូចម្តេច?

- វីរុសនេះឆ្លងតាមរយៈប្រភេទមូសញីមួយចំនួន។
- មូសញីបីតឃាមពីសត្វនិងមនុស្ស ។ បើសិនវាបីតឃាមពីសត្វដែលបានផ្ទុកមេរោគ មូសនោះអាចក្លាយទៅជាមូសផ្ទុកមេរោគ ។ បន្ទាប់មកវីរុសអាចឆ្លងបន្តទៅសត្វឬមនុស្សផ្សេងទៀតនៅពេលមូសដែលមានផ្ទុកមេរោគនោះខាំបីតឃាមម្តងទៀត ។
- ពូជសត្វជាច្រើនដូចជាកងក្រូច និង វ៉ែលឡាប៊ី (Wallabies) ត្រូវបានគេគិតថា ជាសត្វសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខួបនៃការឆ្លងជំងឺនេះ ។
- វីរុសនេះមិនឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់ផ្សេងទៀតទេ ។

តើជម្ងឺបង្កដោយវីរុស Barmah Forest មានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ ?

- មនុស្សជាច្រើនដែលមានផ្ទុកវីរុសនេះនឹងមិនមានចេញជា រោគសញ្ញាអ្វីទេ។
- រោគសញ្ញានៃជម្ងឺបង្កដោយវីរុស Barmah Forest ស្រដៀងគ្នានឹងជម្ងឺបង្កដោយវីរុស Ross River ដែរ។
- បណ្តារោគសញ្ញាដូចជម្ងឺផ្តាសាយអាចកើតមាន, ដោយមានឡើងកំដៅខ្ពស់, រងារញាក់, ឈឺក្បាល, ឈឺសាច់ដុំនិងសន្លាក់
- មនុស្សខ្លះអាចមានហើមសន្លាក់និងវីរុសសន្លាក់ជាពិសេសកត់សំគាល់ឃើញនៅពេលព្រឹក ។
- ជួនកាលមានឡើងកន្ទួល, ជាទូទៅនៅលើខ្ពស់ឬដៃជើង ។ ជាទូទៅស្នាមកន្ទួលនេះបាត់ទៅវិញ ក្រោយពី ៧-១០ ថ្ងៃ ។
- មានអារម្មណ៍ហែរហាត់, អស់កំលាំងនៅក្នុងពេលកំពុងមានជម្ងឺ ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់បែបបទនៃការរស់នៅ និងការអនុវត្តការងារ ។

តើរោគសញ្ញាទាំងនេះកើតឡើងអាចរហ័សប៉ុណ្ណាបន្ទាប់ពីមូសដែលមានផ្ទុកមេរោគបានខាំ?

- រោគសញ្ញាទាំងនេះកើតឡើងក្នុងរវាង ៥ ទៅ ២១ ថ្ងៃប៉ុន្តែជាធម្មតាពី ៧ ទៅ ១០ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមូសដែលផ្ទុកមេរោគបានខាំ ។

តើជម្ងឺនេះបិតថេរយូរប៉ុណ្ណា?

- មនុស្សភាគច្រើននឹងជាសះស្បើយទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេល ២ ឬ ៣ អាទិត្យ ។ មនុស្សផ្សេងទៀតអាចជួបប្រទះរោគសញ្ញាម្តងហ្នឹងម្តងឃើញ ក្នុងរយៈពេលលើសពី ៣ ខែ ។ ក្នុងករណីដ៏កំរ, មនុស្សខ្លះអាចមានរោគសញ្ញារហូតលើសពីមួយឆ្នាំ ។
- គេអាចសង្ឃឹមទុកថា ជម្ងឺនេះអាចជាសះស្បើយទាំងស្រុងបាន ។

តើគេព្យាបាលជម្ងឺបង្កដោយវីរុស **Barmah Forest** យ៉ាងដូចម្តេច ?

- ពុំមានការព្យាបាលជាក់លាក់សំរាប់ជម្ងឺបង្កដោយវីរុស **Barmah Forest** នោះទេ ។
- វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកនឹងអាចជួយលោកអ្នក ក្នុងការបន្តការធ្វើទុក្ខនៃរោគសញ្ញាទាំងនោះ។
- ការសំរាកគ្រប់គ្រាន់រួមជាមួយការធ្វើលំហាត់ប្រាណសមល្មម និងការបរិភោគអាហារផ្តល់អំណោយផលដល់សុខភាព អាចជួយឲ្យលោកអ្នកឆាប់បានជាសះស្បើយ។

តើខ្ញុំនឹងដោយរបៀបណា ថាខ្ញុំមានជម្ងឺបង្កដោយវីរុស **Barmah Forest** ?

បើសិនលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាសូមទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក ដែលអាចបញ្ជាឲ្យធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺបង្កដោយវីរុស **Barmah Forest** ។

តើគេអាចបង្ការជម្ងឺបង្កដោយវីរុស **Barmah Forest** បានឬទេ?

- គន្លឹះនៃការបង្ការគឺការជៀសវាងកុំឲ្យមូសខាំជាពិសេសក្នុងរង្វង់ក្តៅ និងរង្វង់ស្លឹកឈើជ្រុះ។
- ជៀសវាងចេញក្រៅក្រោយពេលរសៀលនិងព្រលប់ ។ ជាទូទៅមូសមានសកម្មភាពខ្លាំងក្នុងរយៈពេល ១-៣ ម៉ោងបន្ទាប់ពីថ្ងៃលិច និងម្តងទៀតនៅពេលជិតភ្លឺ ។
- នៅពេលចេញក្រៅត្រូវស្លៀកពាក់សំលៀកបំពាក់រលុងៗ, ពណ៌ស្រាលព្រឿងៗដោយគ្របដៃនិងជើងឲ្យជិត ហើយប្រើថ្នាំបណ្តាញសត្វល្អិត ដែលមានផ្ទុកជាតិគីមី ឌីយេមីលតូលុយអាមីត (DEET) ឬ ពីការីឌីន (Picaridin) ។
- ដាក់សំណាញ់ការពារនៅគ្រប់បង្អួចនិងទ្វារទាំងអស់និងបំពង់ផ្សេង (នៅពេលមិនប្រើ) និងរក្សាវាឲ្យមានដំណើរការល្អ ។
- ប្រើថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតនៅកន្លែងជេក ដោយធ្វើតាមការណែនាំ
- ត្រូវយកសំភារៈដាក់ទឹកបើកចំហទាំងអស់ចេញពីបរិវេណផ្ទះ ដើម្បីកុំឲ្យមូសពងដាក់ ។ គ្របផ្ទះ/អាងដាក់ទឹកទាំងអស់ដោយគំរូបធ្វើពីសំណាញ់ដៃកយ៉ាងញឹក ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមូសពងដាក់ ។
- នៅពេលបោះជំរុញប្រុងប្រយ័ត្ន ដូចជាប្រើសំណាញ់បង្ការរុយលើការវាវាស់ និងសំពត់តង់ ហើយលើកក្នុងមុងដែលមូសចូលមិនបាន។
- ជាពិសេសត្រូវការពារនៅពេលនេសាទ ដោយត្រូវអនុវត្តនូវការប្រុងប្រយ័ត្នផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជៀសវាងមូសខាំ។



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au