

ການຕິດເຊື້ອໄວຣັສບາຣ໌ມາພໍແຣສ Barmah Forest virus infection

ບາຣ໌ມາພໍແຣສແມ່ນຫຍັງ?

- ເຊື້ອໄວຣັສບາຣ໌ມາພໍແຣສແມ່ນພຍາດຊນິດນຶ່ງຊຶ່ງສາມາດແຜ່ຜ່າຍເຊື້ອເຖິງຄົນໄດ້ໂດຍການຖືກຍູງກັດ.
- ການທີ່ເຄີຍຕິດເຊື້ອບາຣ໌ມາພໍແຣສມາກ່ອນອາດປ້ອງກັນຈາກການຕິດເຊື້ອໃນອະນາຄົດໄດ້.
- ເຊື້ອໄວຣັສບາຣ໌ມາພໍແຣສມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັນກັບເຊື້ອໄວຣັສ ຣອສຣີເວີ (Ross River).

ເຊື້ອໄວຣັສບາຣ໌ມາພໍແຣສແຜ່ຜ່າຍຢ່າງໃດ?

- ເຊື້ອໄວຣັສນີ້ແຜ່ຜ່າຍໂດຍຍູງໂຕແມ່ບາງຊນິດ
- ຍູງໂຕແມ່ຈະດູດກິນເລືອດສັດແລະຄົນ. ຖ້າມັນດູດກິນເລືອດສັດທີ່ຕິດເຊື້ອຢູ່ແລ້ວ, ຍູງໂຕນັ້ນກໍອາດຕິດເຊື້ອໄປນຳ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຊື້ອໄວຣັສກໍຈະແຜ່ເຊື້ອໄປຫາສັດໂຕຕໍ່ໄປຫຼືຄົນ ຕໍ່ໄປທີ່ມັນດູດເລືອດ.
- ມີການເຊື່ອກັນວ່າ ສັດພື້ນບ້ານເຊັ່ນ ແຄ້ງກາຣູ ແລະ ວອລລາບີ ເປັນສາເຫດໃຫຍ່ໃນການເຮັດໃຫ້ການຕິດເຊື້ອນີ້ໝູນວຽນໄປມາ.
- ເຊື້ອໄວຣັສນີ້ຈະບໍ່ແຜ່ໂດຍຕົງຈາກຄົນນຶ່ງໄປຫາອີກຄົນນຶ່ງ.

ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອບາຣ໌ມາພໍແຣສຈະມີອາການຢ່າງໃດແດ່?

- ມີຫຼາຍຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສນີ້ແລ້ວແຕ່ບໍ່ມີອາການຫຍັງເລີຍ.
- ອາການຂອງເຊື້ອບາຣ໌ມາພໍແຣສຄ້າຍຄືກັນກັບການຕິດເຊື້ອໄວຣັສຣອສຣີເວີ.
- ອາດຈະເກີດອາການຄ້າຍໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ມີອາການຄົງຮ້ອນ, ໜາວສັ່ນ, ເຈັບຫົວ, ແລະເຈັບຕາມກ້າມເນື້ອແລະຕາມຂໍ້.
- ບາງຄົນກໍອາດມີອາການໃຄ່ແລະປວດຕາມຂໍ້, ຊຶ່ງຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນຍາມເຊົ້າ.
 - ບາງເທື່ອຈະເກີດເປັນຕຸ່ມຜືນແດງຕາມຮ່າງກາຍ ຫຼືຕາມ ແຂນ ຫຼືຂາ. ຕຸ່ມນີ້ຕາມປົກກະຕິ ຈະ ຫາຍໄປຫຼັງຈາກເຈັດຫາສິບວັນ.
 - ໃນລະຫວ່າງທີ່ເປັນພຍາດຢູ່ນັ້ນ ບາງຄັ້ງ ອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍທົ່ວໄປໃນໂຕ, ພ້ອມທັງ ຮູ້ສຶກເມື່ອຍຫຼືອ່ອນເພັຍ. ອາການເຫຼົ່ານີ້ອາດເຮັດໃຫ້ມີຜົນສະທ້ອນ ຕໍ່ ທັງການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ປະສິດທິພາບ ໃນການເຮັດວຽກ.

- ເວລາໄປນອນປ່າ (ແຄ່ມປັ້ງ), ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຣະມັດຣະວັງເຊັ່ນໃຊ້ຕານ່າງຢູ່ຣົດຜູ້ຄາຣາວານ ແລະ ເຕັນ, ແລະ ໃຫ້ນອນຢູ່ມັ່ງທີ່ກັນຍູງໄດ້.
- ໃຫ້ຣະວັງເປັນພິເສດຍາມໄປຕຶກເບັດ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ກະທຳຕາມຂັ້ນຕອນປ້ອງກັນຕົນເອງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຈາກການຖືກຍູງກັດ.

Further information – Public Health Units in NSW



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au