

클라미디아

Chlamydia

클라미디아란?

클라미디아는 남녀 누구나 걸릴 수 있는 성병입니다. 클라미디아는 세균성 질환입니다. 많은 사람들이 이 세균에 감염되어도 감염 증상이 없는 경우가 많으나, 그래도 여전히 세균은 전염시킬 수 있습니다. 클라미디아균은 요도 (소변 통로), 자궁경부 (자궁의 목), 직장, 항문, 인후, 눈을 침범할 수 있습니다. 클라미디아에 감염되면 합병증이 유발될 수도 있으나 예방이 가능합니다.

클라미디아의 전염경로는?

클라미디아는 감염자와의 성관계를 통해 전염되는 병입니다.

클라미디아에 감염될 위험률이 가장 높은 사람

- 성생활이 활발한 젊은 남녀
- 최근에 성관계 상대를 바꾼 사람
- 최근에 다른 성병에 감염되었던 사람.

클라미디아의 증상은?

클라미디아에 감염되면 2-14 일 이내에 증상이 나타날 수 있습니다. 그러나 수 개월 동안, 심지어는 수 년 동안, 자신이 클라미디아에 감염된 사실을 모르고 있는 사람들도 있습니다.

여성의 경우

클라미디아에 감염된 여성에게 나타날 수 있는 증상

- 아랫배가 생리통 같이 아픔
- 생리상의 변화 (즉, 월경에 변화가 있음)
- 소변을 볼 때 아픔
- 성관계 도중이나 후에 하혈함
- 질 분비물에 변화가 있음.

남성의 경우

클라미디아에 감염된 남성에게 나타날 수 있는 증상

- 음경에서 분비물이 나옴
- 소변을 볼 때 아픔
- 고환이 붓거나 아픔.

남녀 공통 증상

항문이 감염될 수 있으나 자각증상이 없는 경우가 일반적이며, 항문 통증이나 분비물이 증상으로 나타나는 경우가 간혹 있습니다.

클라미디아 진단방법은?

클라미디아 진단은 의원이나 성보건 진료소에서 할 수 있습니다. 의사가 요도나 자궁경부 또는 항문으로부터 분비물표본을 채취하거나 소변표본을 받은 후, 실험실로 보내 클라미디아 검사를 하게 됩니다.

클라미디아의 치료방법은?

클라미디아는 항생제로 쉽게 완치되는 병입니다. 의원 또는 성보건 진료소에 가서 검사받은 후 치료받는 것이 중요합니다. 증상이 재발될 경우엔 다시 의원이나 성보건 진료소에 가보도록 하십시오.

항생제는 복용을 시작한 후 증상이 사라지더라도 클라미디아균이 박멸되지 않았을 가능성이 있으므로 전체량을 끝까지 복용하는 것이 중요합니다. 그리고 치료를 시작한 후 적어도 7 일 동안은 여전히 전염성이 있으므로 성관계를 갖지 않도록 해야 합니다.

클라미디아 합병증이 있는가?

그렇습니다. 클라미디아를 적절히 치료하지 않을 경우엔 심각한 합병증이 생길 수 있습니다.

여성에게 생길 수 있는 합병증

- 골반염성 질환 (PID) (골반 내 생식기관에 염증이 생기는 질환)
- 골반 유착 및 만성 골반통
- (반흔조직에 의한) 난관 손상에 기인한 불임증
- 자궁외 임신 (수정란이 자궁 내에 착상하지 않고 난관에 착상하는 경우).

남성에게 생길 수 있는 합병증

- 재발성 요도염[urethritis]
- 부고환염[epididymitis] (정관염 수반).

남녀 공통 합병증

- 관절염
- 결막염[conjunctivitis] 및 포도막염[uveitis] (눈의 염증)

- 직장염[proctitis] (직장의 염증).

성관계 상대자도 치료를 받아야 하나?

그렇습니다. 클라미디아에 감염된 사람은 지난 6 개월 기간에 있었던 모든 성관계 상대자들에게 알려서 의원이나 가까운 성보건 진료소에 가서 검사 및 치료를 받으라고 해야 합니다.

클라미디아를 예방하는 방법은?

질성교나 항문성교 시에 콘돔을 사용하면 클라미디아 및 기타 성병들을 예방할 수 있습니다. 다수의 상대와 관계를 갖는 경우엔 특히 콘돔을 사용하는 것이 중요합니다.

더 자세한 정보 - 뉴 사우스 웨일즈 주 공중 보건과



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au