

Кламидија Chlamydia

Шта је кламидија?

Кламидија је инфекција која се преноси путем полног односа, а може се јавити и код жена и код мушкараца. Ову инфекцију изазива бактерија. Код великог броја заражених нема никаквих симптома инфекције, па ипак и ове особе могу да пренесу бактерију на неког другог. Кламидија може да захвати мокраћни канал, грилић материце, чмар и крајње дебело црево, грло и очи. Кламидија може да доведе до разних компликација, али ова инфекција се може спречити.

Како се преноси кламидија?

Ова инфекција се преноси путем полног односа са особом која је већ заражена.

Лица која су изложена нјавећем ризику да буду заражена кламидијом су:

- младићи и девојке који су сексуално активни;
- свако ко је недавно променио сексуалног партнера;
- свако ко је недавно имао неку другу полну инфекцију.

Како ћете знати да ли сте заражени кламидијом?

Симптоми се јављају 2 до 14 дана након инфекције. Међутим, особа може бити годинама заражена кламидијом, а да то и не зна.

Симптоми код жена

Ако је жена заражена кламидијом, код ње се могу јавити следећи знаци:

- грчеви или бол у доњем делу stomaka;
- промене при менструацији;
- бол приликом мокрења;
- крварење или болови при полном сношају;
- промене у вагиналном секрету.

Симптоми код мушкараца

Мушкарац заражен кламидијом може запазити следеће промене:

- секрет из пениса;
- бол приликом мокрења;
- отекле и болне тестисе.

Симптоми и код мушкараца и код жена

Може се јавити инфекција чмара и то потпуно непримећена. Инфекција понекад изазива бол око чмара или секрет.

Да ли постоји тест за кламидију?

Кламидију може дијагнозирати ваш лекар опште праксе или специјална клиника за сексуално здравље **sexual health clinic**. Лекар ће узети брис из мокраћног канала, грлића материце или чмара, или узорак мокраће. Брис или узорак се затим шаљу у лабораторију где се обавља тест на кламидију.

Како се лечи кламидија?

Кламидија се лако лечи антибиотицима. Важно је да се обратите своме лекару или клиници за сексуално здравље ради тестирања и лечења. Ако вам се симптоми понове одмах се обратите своме лекару или клиници за сексуално здравље.

Важно је да узмете читаву преписану дозу антибиотика, чак и ако симптоми нестану, пошто бактерија кламидије може још увек бити присутна. Важно је, такође, уздржавати се од полнох односа бар 7 дана од почетка третмана, пошто се недолечена инфекција још увек може пренети са једне особе на другу.

Да ли има компликација?

Да! Ако се кламидија не лечи како треба, може доћи до озбиљних компликација.

Компликације код жена :

- упалу пелвиса (**pelvic inflammatory disease, PID**).
- Компликације се јављају када дође до упале репродуктивних органа смештених у пелвису;
- појава прилепљеног пелвиса и настанак хроничних болова у пелвису;
- неплодност услед отицања јајовода (ожиљци на мемранама);
- ванматериична трудноћа (када се плод зачне у јајоводу уместо у материци).

Компликације код мушкараца :

- честе упале мокраћног канала **urethritis**;
- упалу канала тестиса **epididymitis**.

Компликације које се јављају и код жена и код мушкараца:

- артритис;
- конјунктивитис и увеитис (упала ока);
- проктитис (упала чмара)

Да ли је лечење потребно и полном партнериу?

Сvakако! Ако имате кламидију, треба да кажете свима са којима сте ималиполне односе у последњих шест месеци да се обрате лекару или клиници за сексуално здравље како би проверили да ли су заражени и добили одговарајуће лечење.

Како се кламидија може спречити?

Коришћење кондома при вагиналном и оралном полном односу може спречити преношење кламидије као и других полнох зараза. Употреба кондома је посебно важна за оне који имају више од једног полног партнера.

Више информација – Заводи за јавно здравље у Новом Јужном Велсу



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au