

ໂຮກຖ່າຍທ້ອງ

Cryptosporidiosis

ໂຮກຖ່າຍທ້ອງ Cryptosporidiosis ແມ່ນຫຍັງ?

- Cryptosporidiosis ແມ່ນໂຮກຖ່າຍທ້ອງຊຶ່ງເກີດຈາກແມ່ທ້ອງ Cryptosporidium, ຊຶ່ງແພ່ເຊື້ອພຍາດຢູ່ລຳໄສ້.
- ໄດ້ມີລາຍງານວ່າມີການຕິດເຊື້ອ Cryptosporidium ໃນຕົວຄົນ ແລະ ຢູ່ໃນຟາມຫຼາຍແຫ່ງ, ຢູ່ໃນຕົວສັດລ້ຽງ ແລະ ສັດພື້ນບ້ານ.
- ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ Cryptosporidium ຫຼາຍຊະນິດ, ແຕ່ວ່າມີຊະນິດດຽວ, Cryptosporidium parvum, ຊຶ່ງເຊື້ອວ່າເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອໃນຄົນ.
- Cryptosporidiosis ໄດ້ຖືກລາຍງານເຖິງກະຊວງສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຣັດ NSW ແຕ່ປີ 1996. ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນພຍາດນີ້ມີແນວໂນ້ມວ່າຈະສູງຂຶ້ນໃນເດືອນທີ່ອາກາດອຸ່ນຂຶ້ນ.

ພຍາດນີ້ແຜ່ຜາຍຢ່າງໃດ?

- ໂຕແມ່ທ້ອງ Cryptosporidium ມີຢູ່ໃນອາຈິມຂອງຄົນແລະສັດທີ່ມີເຊື້ອນີ້ ແລະ ແຜ່ຜາຍໂດຍເສັ້ນທາງ ອາຈິມ-ປາກ.
- ພຍາດນີ້ຈະແຜ່ຜາຍໄປໂດຍທີ່ແມ່ທ້ອງຖືກກິນເຂົ້າໄປ.
- ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ການແຜ່ຜາຍຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍ:
 - ການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງຄົນຕໍ່ຄົນ, ໂດຍສະເພາະໃນຄອບຄົວແລະລະຫວ່າງເດັກນ້ອຍ (ຕົວຢ່າງ, ໃນສູນດູແລເດັກ)
 - ຕົ້ມນ້ຳທີ່ມີເຊື້ອພຍາດນີ້
 - ລອຍນ້ຳຢູ່ໃນອ່າງທີ່ມີເຊື້ອພຍາດນີ້
 - ທາງອາຫານ (ບໍ່ຄ່ອຍມີ)
 - ຈັບບາຍສັດທີ່ມີເຊື້ອພຍາດນີ້
 - ການຮ່ວມເພດທີ່ມີການຕ້ອງຊຸນສານອາຈິມ
- ຍາມທີ່ຕິດໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດແມ່ນຍາມທີ່ຄົນຖ່າຍທ້ອງ, ແຕ່ວ່າອາດຈະຍັງມີແມ່ທ້ອງຖືກຂັບຖ່າຍອອກມາຢູ່ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ ຫຼັງຈາກອາການຖ່າຍທ້ອງຢຸດແລ້ວ.

ມີອາການຫຍັງແດ່?

ອາການທີ່ມັກເປັນຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງ cryptosporidiosis ແມ່ນຖ່າຍເປັນນ້ຳ, ເຈັບບົດໃນທ້ອງ, ຄົງຮ້ອນ, ບຸ້ນທ້ອງ ແລະ ຮາກ. ອາການເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳໜັກຕົວຫຼຸດລົງ ແລະ ຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ.

- ອາການເຈັບປ່ວຍຈະປາກົດຄັ້ງແຮກໃນລະຫວ່າງ 1-12 ມື້ (ສະເລ່ຍປະມານ ເຈັດມື້) ຫຼັງຈາກທີ່ຄົນຜູ້ນັ້ນຕິດເຊື້ອແລ້ວ.
- ໃນບາງກໍລະນີ ອາດຈະບໍ່ສະແດງອາການຫຍັງໝົດ. ຢ່າງໃດກໍດີ, ເຂົາເຈົ້າກໍອາດຈະຍັງສາມາດແຜ່ຜ່າຍພຍາດໄປໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຢູ່.
- ຄົນທີ່ມີສຸຂະພາບດີສ່ວນຫຼາຍຈະເຊົາພາຍໃນບໍ່ເກີນສອງອາທິດ.
- ຄົນທີ່ພູມຕ້ານທານບໍ່ແຂງແຮງ ອາດຈະມີອາການຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນແລະອາດເປັນຢູ່ຫຼາຍອາທິດ.

ມີການກວດຫາພຍາດຢ່າງໃດແລະປິ່ນປົວວິທີໃດ?

- ຖ້າທ່ານເປັນໂຮກຖ່າຍທ້ອງ, ວິທີດຽວທີ່ຈະບອກໄດ້ວ່າເປັນຍ້ອນ cryptosporidiosis ຫຼືບໍ່ແມ່ນໄປຫາໝໍ ແລະ ເອົາຕົວຢ່າງອາຈິມໄປກວດ.
- ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຄົນປ່ວຍຖ່າຍທ້ອງຕ້ອງໄດ້ດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຈາກສະພາວະຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ.
- ບໍ່ມີວິທີການປິ່ນປົວສະເພາະ ສຳລັບ cryptosporidiosis

ຈະປ້ອງກັນໄດ້ຢ່າງໃດ?

ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕິດພຍາດ cryptosporidiosis ເຮົາຕ້ອງ:

- ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດທົ່ວເຖິງດິສເມີ ດ້ວຍສະບູແລະນ້ຳກ້ອກຫຼັງຈາກໃຊ້ທ້ອງນ້ຳ, ຈັບບາຍສັດ, ປ່ຽນຜ້າອ້ອມ, ຫຼືເຮັດວຽກໃນສວນ, ແລະກ່ອນປຸງແຕ່ງອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ.
- ຢ່າດື່ມນ້ຳທີ່ບໍ່ທັນຜ່ານກັມມະວິທີ (ຕົວຢ່າງ, ນ້ຳຈາກຫ້ວຍ, ລຳທານ, ໜອງ ແລະ ເຂື່ອນ). ການດື່ມນ້ຳຈາກແຫຼ່ງນ້ຳເຫຼົ່ານີ້ ນຶ່ງນາທີ ຈະຂ້າພຍາດຮວມທັງ cryptosporidiosis ດ້ວຍ.

ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຈາກການແຜ່ຜ່າຍ ພຍາດ cryptosporidiosis:

- ໃຫ້ເອົາເດັກນ້ອຍທີ່ຖ່າຍທ້ອງໄວ້ເຮືອນ ບໍ່ໃຫ້ໄປໂຮງຮຽນ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ສູນດູແລເດັກ ຫຼື ກຸ່ມຫຼິ້ນ ຈົນກວ່າການຖ່າຍທ້ອງຈະເຊົາຫາຍຂາດ.
- ຜູ້ທີ່ຕ້ອງຈັບບາຍອາຫານ, ພະນັກງານດູແລເດັກ ແລະ ພະນັກງານດູແລສຸຂະພາບ ທີ່ຕິດເຊື້ອ cryptosporidiosis ບໍ່ຄວນໄປເຮັດການຈົນກວ່າການຖ່າຍທ້ອງຈະຢຸດລົງ.
- ຢ່າງນ້ອຍເປັນເວລານຶ່ງອາທິດ ຫຼັງຈາກການຖ່າຍທ້ອງຢຸດລົງ, ທ່ານບໍ່ຄວນຈະ: - ໃຊ້ສະອາບນ້ຳ ຫຼື ສະຖານທີ່ລ້ືນເລິງກ່ຽວກັບນ້ຳ - ໃຊ້ຜ້າປູບ່ອນແລະຜ້າເຊັດຕົວຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ.

ຮາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ - ຜແນກສາທາຣະນະສຸກແຫ່ງຣັດ NSW



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au