

ແພ່ນຂ້ອງມູລໂຮຄຕິດຕ່ວ

ໂຮຄຄຣີໂໂຕສປອຣິດໂອຊີສ (Cryptosporidiosis)

ໂຮຄຄຣີໂໂຕສປອຣິດໂອຊີສ
ເປັນໂຮຄທີ່ເກີດຈາກການທານອາຫາຣ
ທີ່ມີເຊື້ອປຣີສຕິໂຕສປອຣິເດີຍມ
ຊຶ່ງທຳໃຫ້ເກີດອາກາຣປວດບົດ
ແລະທ້ອງຮ່ວງ

ໂຮຄຄຣີໂໂຕສປອຣິດໂອຊີສ ຄືອະໄຮ?

- ໂຮຄຄຣີໂໂຕສປອຣິດໂອຊີສ ເປັນໂຮຄທີ່ທ້ອງຮ່ວງທີ່ເກີດຈາກປຣີສຕິເຊື້ອ ຄຣີໂຕສປອຣິເດີຍມ ຜຶ່ງແພ່ເຊື້ອໄປທີ່ລຳໄສ້
- ມີຮາຍງານການຕິດເຊື້ອຄຣີໂໂຕສປອຣິເດີຍມ ນີ້ໃນຄນແລະໃນສັດວົ່ວຕ່າງໆ ຕາມປຸ່ມສັດວົ່ວ
ສັດວົ່ວເລື່ອງແລະສັດວົ່ວພື້ນເມືອງ
- ແຕ່ຖື່ງແມ່ຄຣີໂໂຕສປອຣິເດີຍມຈະມີໜາຍເຊື້ອພັນຮູກຕາມ ແຕ່ເຊື່ອວ່າມີເພີຍເຊື້ອພັນຮູກຄຣີໂໂຕສປອຣິເດີຍມ
ພາວຽຸມແລະ ຄຣີໂຕສປອຣິເດີຍມ ໂອມິນິສ ເທົ່ານັ້ນທີ່ຕິດເຊື້ອໃນຄນໄດ້

ລັກຊະນະອາກາຣເປັນຍ່າງໄຮ?

- ອາກາຣຂອງໂຮຄຄຣີໂໂຕສປອຣິດໂອຊີສທີ່ພົບບ່ອຍຄືອ ດ້ວຍອຸຈາຣະເປັນໜ້າແລະປວດບົດ
ແລະຈາມີອາກາຣອື່ນໆໄດ້ແກ່ ເປັນໄໝ້ ຄລື່ນເຫັນ ອາເຈີນ ເປົ້ອອາຫາຣ
ແຕ່ບາງຄນທີ່ເປັນອາຈາໄມມີອາກາຣເຫຼຳນີ້ເລັກໄດ້
- ອາກາຣເຮັມແຮກຂອງໂຮຄນີ່ຈະປຣກງູນໃນຊ່ວງ 1–12 ວັນ (ໂດຍເລີ່ມ 7 ວັນ) ລັງຈາກທີ່ເຮັມຕິດເຊື້ອ
- ອາກາຣເຫຼຳນີ້ອາຈະເປັນໆຫຍາຍໆແລະອາຈະເປັນຫລາຍວັນຫຼືຫລາຍສັ້ນ
ຄນທີ່ມີກຸມືຕ້ານທານໂຮຄຕໍ່ອາຈາມີອາກາຣຮູນແຮງກວ່າ ແລະອາຈເປັນໜາຫລາຍເດືອນ

ໂຮຄນີ່ແພ່ເຊື້ອໄດ້ຍ່າງໄຮ?

ເຊື້ອຄຣີໂໂຕສປອຣິເດີຍມ ຈະອູ່ໃນອຸຈາຣະຂອງຄນຫຼືສັດວົ່ວທີ່ປ່ວຍເປັນໂຮຄນີ່
ການຕິດເຊື້ອຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີກິນອາຫາຣທີ່ມີປຣີຕິດນີ້ ການແພ່ເຊື້ອສ່ວນມາກສ່ວນທາງ

- ການຕິດຕ່ອຮ່ວງຄນສູ່ຄນ ໂດຍເພະຄນໃນຄຣອບຄຣັວແລະໃນກລຸ່ມເຕັກເລັກ (ເຊັ່ນ ຜູນຍົກເລີ່ມເຕັກເລັກ)
- ກາຣດິມໜ້າທີ່ປັນເປື້ອນ
- ກາຣວ່າຍໜ້າໃນສະຖິຕິທີ່ປັນເປື້ອນ

- การสัมผัสสัตว์หรืออุจจาระสัตว์ที่ติดเชื้อ
- อาหาร (พบหน้อยมาก)

ผู้ป่วยจะแพร์เชื้อมากที่สุดตอนที่มีอาการท้องร่วง แต่หลังจากหมดอาการแล้ว อาจจะใช้เวลาอีกหลายวันที่ปรสิตจะถูกขับถ่ายออกมาก

ใครที่มีความเสี่ยง?

ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อคริปโตสปอริเดียม ได้แก่

- ผู้ที่ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคคริปโตสปอริเดียม
- เด็กๆที่ไปศูนย์รับเลี้ยงเด็ก รวมทั้งเด็กที่ใช้ผ้าอ้อม
- บิดามารดาของเด็กที่ติดเชื้อ
- พนักงานที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
- นักว่ายน้ำที่กลืนน้ำในระหว่างว่ายน้ำ ถึงแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม
- ผู้ที่ดื่มน้ำที่ไม่ได้ผ่านกรองวิธี (เช่น จากแม่น้ำหรือทะเลสาบ)
- ผู้ที่เดินทางไปประเทศที่กำลังพัฒนา
- ผู้ที่ทำงานกับสัตว์
- ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

ผู้ที่ถูกดัดแปลงระบบภูมิคุ้มกันมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคที่ร้ายแรงกว่า จึงควรไปพบแพทย์หากมีอาการ

ป้องกันโรคนี้ได้อย่างไร?

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ติดเชื้อโรคคริปโตสปอริเดียม คุณควร

- ล้างมือให้สะอาดหมัดด้วยน้ำและสบู่สัก 10 วินาทีหลังจากใช้ห้องน้ำ สัมผัสสัตว์หรืออุจจาระสัตว์ เปลี่ยนผ้าอ้อม ทำความสะอาดและก่อนเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่ม
- อย่าดื่มน้ำที่ไม่ได้ผ่านกรองวิธี (เช่นจากทะเลสาบหรือลำธาร) น้ำต้มจะฆ่าเชื้อคริปโตสปอริเดียม
- หลีกเลี่ยงการกลืนน้ำเวลาว่ายน้ำ
- หลีกเลี่ยงการว่ายน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ (เช่น แม่น้ำ ห้วย เขื่อนและคลื่นในทะเล)
ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังฝนตกหนัก

เวลาเดินทางไปประเทศที่กำลังพัฒนา ควรหลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มที่อาจปนเปื้อน (เช่น ผักดิบ น้ำกอกหรือน้ำแข็งที่ทำจากน้ำกอก)

เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร์เชื้อโรคคริปโตสปอริเดียม ผู้ที่เป็นโรคคริปโตสปอริเดียมควร

- งดการลงว่ายน้ำอย่างน้อยสองสัปดาห์หลังจากหมดอาการท้องร่วง

- งดการใช้ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าปูที่นอนร่วมกับผู้อื่นอย่างน้อยสองสัปดาห์หลังจากหมดอาการท้องร่วง
- งดการหยิบจับอาหารอย่างน้อย 48 ชั่วโมงหลังจากหมดอาการท้องร่วง

เด็กเล็กๆที่มีอาการท้องร่วงควรพักอยู่บ้าน “ไม่ควรไปโรงเรียน โรงเรียนเด็กเล็ก ศูนย์เลี้ยงเด็ก หรือกลุ่มเด็กเล็ก จน 24 ชั่วโมงหลังจากหมดอาการท้องร่วงอย่างเด็ดขาด

โรคนี้วินิจฉัยได้อย่างไร?

โรคคริปโตสปอริดิโอซิส วินิจฉัยได้โดยการไปหาแพทย์และตรวจสอบตัวอย่างอุจจาระ

โรคนี้รักษาได้อย่างไร?

ไม่มีการรักษาเฉพาะ สำหรับโรคคริปโตสปอริดิโอซิส ควรดื่มน้ำมากๆเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะขาดน้ำ

การตอบรับของสารณสุขเป็นอย่างไร?

ห้องปฏิบัติการจำเป็นต้องแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในเขตให้ทราบเกี่ยวกับผู้ป่วยด้วยโรคคริปโตสปอริดิโอซิส ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข ค.ศ. 1991 หน่วยงานสาธารณสุขจะสอบสวนผู้ป่วยและทบทวน แหล่งของการติดเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม - หน่วยงานสาธารณสุขในรัฐนิวเซาธ์เวลส์



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au