

ជម្ងឺអុតក្តាម

Hand, Foot and Mouth Disease

តើជម្ងឺអុតក្តាមជាអ្វី?

ជាទូទៅ ជម្ងឺអុតក្តាម ជាជម្ងឺស្រាលមួយដែលបណ្តាលមកពីវីរុសម្យ៉ាងហោចមួយក្នុងចំណោមវីរុស (coxsackievirus) ឬអេន្តេរូវីរុស (enterovirus) ។ វាមិនមែនជាជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរ ហើយមិនទាក់ទងជាមួយជម្ងឺរបស់សត្វពាហនៈ ដែលហៅថា ជម្ងឺអុតក្តាមសត្វនោះទេ។ ជម្ងឺនេះកើតឡើងញឹកញាប់លើកូនក្មេងអាយុក្រោម ១០ ឆ្នាំ ប៉ុន្តែ ជម្ងឺនេះក៏អាចកើតនៅលើក្មេងអាយុច្រើនជាងនេះនិងមនុស្សពេញវ័យផងដែរ ។

តើវាអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

ការចំលងរបស់ coxsackievirus ឬ enterovirus អាចកើតឡើងដោយគ្មានរោគសញ្ញាសោះ ឬ មានសញ្ញា តិចតួចប៉ុណ្ណោះ ។ នៅពេលដែលមានរោគសញ្ញាកើតឡើង រោគសញ្ញាទាំងនោះ រួមមានពងលើស្បែក ដែល ចាប់ផ្តើមដោយចំណុចតូចក្រហម ហើយក្រោយមកក្លាយជាជំងឺប្លាស់ ។ ពងលើស្បែកនេះលេចឡើងនៅផ្នែកខាងក្នុងផ្តាច់, អញ្ចាញធ្មេញ និងនៅលើចំហៀងអណ្តាត ក៏ដូចជានៅលើដៃនិងជើងផងដែរ។ ចំពោះទារក ជួនកាលពងលើស្បែក អាចមើលឃើញនៅក្នុងកន្លែងស្លៀកកន្ទុយ ។ ជា ទូទៅពងលើស្បែកនឹងបាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេល ៧-១០ ថ្ងៃ ។ ជួនកាលក្មេងអាចមានក្តៅខ្លួនតិចតួច ឈឺចាប់ពងក, អស់ កំលាំង, ស្លេកស្លាំង និង អាចមិនហូបរយៈពេលមួយ ឬ ពីរថ្ងៃ ។ ជារឿយៗកំរិតដែលមេរោគ coxsackievirus អាចបណ្តាលឲ្យមានជម្ងឺផ្សេងៗទៀត ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ បេះដូង ខួរក្បាល ឬ ស្រោមខួរក្បាល (រលាកស្រោមខួរ) សួត ឬ ភ្នែក ។

តើជម្ងឺនេះមានលក្ខណៈទូទៅយ៉ាងដូចម្តេច?

ជម្ងឺអុតក្តាម ជាជម្ងឺមួយដែលកើតឡើងជាធម្មតានិងការរាតត្បាតអាចកើតឡើងចំពោះក្រុមកូនក្មេង, ជា ឧទាហរណ៍នៅក្នុងមណ្ឌលថែរក្សាកូនក្មេង ។

តើជម្ងឺនេះឆ្លងរាលដាលយ៉ាងដូចម្តេច?

ជាទូទៅ ជម្ងឺអុតក្តាមនេះឆ្លងរាលដាលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត តាមរយៈការប៉ះពាល់គ្នា។ វីរុសឆ្លងចូល ទៅក្នុងមាត់នៃជនណាម្នាក់ តាមរយៈដៃដែលប្រឡាក់លាមកដែលមានផ្ទុកមេរោគ។ ជម្ងឺនេះក៏ឆ្លងតាមរយៈ ទឹកមាត់និងទឹកចំហាយចេញពីប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើម និងតាមរយៈការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយទឹកដៃនៃ ពងលើស្បែក នោះ។ ជាទូទៅជម្ងឺនេះត្រូវការពេលវេលា ៣-៥ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកផ្ទុកមេរោគ មុនពេលពងលើស្បែក នៅលេចចេញឡើង ។ កាលណានៅមានទឹកដៃក្នុងពងលើស្បែកនោះ ពងលើស្បែកទាំងនោះនៅតែមានមេរោគ ដែលអាច ចំលងទៅអ្នកដទៃទៀតបាន។ វីរុសនៅតែអាចមានក្នុងលាមករហូតដល់ពេលច្រើនអាទិត្យ ។

តើគេព្យាបាលជម្ងឺនេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ជាធម្មតាគេព្យាបាលជម្ងឺនេះទេ ។ ថ្នាំ Paracetamol នឹងបន្ថយការក្តៅខ្លួននិងភាពមិនស្រួលខ្លួន។ មិនត្រូវឱ្យកុមារ លេបថ្នាំអាស៊ីតនេះទេ ។ បើសិនជាឈឺក្បាលខ្លាំង ឬ នៅតែក្តៅខ្លួន សូមទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យ។

តើគេបង្ការយ៉ាងដូចម្តេច?


- អនាម័យល្អគឺជាការការពារដ៏ប្រសើរបំផុត : លាងដៃដោយទឹកនិងសាប៊ូក្រោយចេញពីបង្គន់, មុនបរិភោគ, បន្ទាប់ពីជូតសំបោរ និងក្រោយពីផ្លាស់ប្តូរកន្ទួប ឬសំលៀកបំពាក់កខ្វក់ ។
- ជៀសវាងការប្រើចូលទ្បកទ្បាញនូវតែង, សំភារៈសំរាប់ហូបចុក, សំភារៈអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗ (ឧទាហរណ៍ កន្សែងពោះគោ, កន្សែងជូតមុខ និងច្រាស់ដុំសធូញ) និង សំលៀកបំពាក់ (ជាពិសេសស្បែកជើងនិងស្រោមជើង)។
- ត្រូវបោកគក់សំលៀកបំពាក់កខ្វក់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
- ត្រូវគ្របមាត់និងច្រមុះនៅពេលក្អក និង កណ្តាស់ ។ ជូតសំបោរនិងជូតមាត់ដោយក្រដាស អនាម័យ, បោះចោលក្រដាសអនាម័យដែលប្រើរួចហើយបន្ទាប់មកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នក ។

តើគេគ្រប់គ្រងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជម្ងឺនេះយ៉ាងដូចម្តេច?

កូនក្មេងដែលមានជម្ងឺអុតក្តាម មិនគួរចូលសាលា ឬ មណ្ឌលថែរក្សាក្មេង រហូតដល់ពេលដែលបែករបស់កុមារបានស្ងួតក្រៀម ។

គប្បីរាយការណ៍អំពីជម្ងឺនេះ ទៅឱ្យនាយកមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាក្មេង ឬ នាយកសាលារៀនបានដឹង។

ព័ត៌មានបន្ថែម - ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ (Public Health) នៅក្នុងរដ្ឋ NSW



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au