

โรคมือ เท้า และ ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease)

โรคมือ เท้า และ ปาก คืออะไร?

โรคมือ เท้า และ ปาก โดยทั่วไปเป็นอาการป่วยที่ไม่ร้ายแรงเท่าใดนัก โรคนี้เกิดจากไวรัสที่เรียกว่า คีอกซ์แซคคิ ไวรัส (coxsackievirus) และ เอ็นติโรไวรัส (enterovirus) นี่ไม่ใช้อาการป่วยที่ร้ายแรง และไม่เกี่ยวกับโรคเท้า และปากที่เกิดขึ้นกับสัตว์ โรคนี้จะเกิดขึ้นกับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจเป็นกับเด็กที่อายุแก่กว่านี้ หรือกับผู้ใหญ่ก็ได้

โรคนี้จะระบุกระเทือนท่านอย่างไร?

การติดเชื้อคีอกซ์แซคคิ ไวรัส หรือ เอ็นติโรไวรัส อาจไม่ก่อให้เกิดอาการอย่างใดเลย หรืออาจแสดงอาการเพียงเล็กน้อย ถ้าอาการปรากฏขึ้น อาการนั้นจะรวมถึงเม็ดพุพองซึ่งจะเริ่มด้วยตุ่มสีแดงเล็กๆ แต่ต่อมาจะกลายเป็นแผล เม็ดพุพองนี้จะเกิดขึ้นในกระเพุกแก้ม เหงือก ข้าวขา ลิ้น และจะเกิดขึ้นที่มือและเท้าด้วย ในทางรกร เม็ดพุพองนี้อาจเกิดขึ้นบนบริเวณที่สัมผัสถกนผ้าอ้อม เม็ดพุพองนี้จะเป็นอยู่ระหว่างเจ็ดถึงสิบวัน เด็กอาจเป็นไข้รุนแรง เจ็บคอ อ่อนเพลีย ซึม และอาจไม่กินอาหารเป็นเวลาวันสองวัน นานๆ ครั้งที่ไวรัสคีอกซ์แซคคิ ไวรัสทำให้เกิดอาการป่วยอย่างอื่นๆ ซึ่งกระแทกหัวใจ สมอง หรือเยื่อหุ้มสมอง (โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ) ปอด หรือ ตา

โรคนี้สามัญแค่ไหน?

โรคมือ เท้า และ ปาก เป็นโรคสามัญ และการระบาดอาจเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีเด็กเป็นจำนวนมาก เช่น ที่ศูนย์ดูแลเด็ก

การแพร่เชื้อเกิดขึ้นได้อย่างไร?

โรคมือ เท้า และ ปาก นี้โดยปกติแพร่จากการสัมผัสระหว่างคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง ไวรัสจะแพร่จากอุจจาระของคนที่ติดเชื้อไปสู่ปากของอีกคนหนึ่งผ่านทางมือที่มีเชื้อไวรัสนี้ติดอยู่ นอกจากนี้ ยังแพร่ได้ผ่านทางสารคัดหลั่งจากปากหรือจากระบบการหายใจ และจากการสัมผัสถโดยตรงกับสารเหลวในเม็ดพุพอง โดยปกติ หลังจากที่ติดเชื้อนี้แล้วสามารถถึงหัวัวนเม็ดพุพองจะปรากฏ ตราชได้ที่เม็ดพุพองยังมีสารเหลวอยู่ในเม็ด ตราชนั้นการติดเชื้อจะยังคงมีอยู่ ไวรัสนี้อาจคงอยู่ในอุจจาระได้เป็นเวลาหลายสัปดาห์

จะรักษาโรคนี้ได้อย่างไร?

โดยปกติไม่จำเป็นต้องรักษา ยาพาราเซตามอลจะช่วยบรรเทาอาการไข้และอาการไม่สบายเนื้อตัวอื่นๆ อย่าให้ยาแอสไพรินแก่เด็ก ถ้าอาการปวดศีรษะรุนแรง หรือไม่ยอมหาย โปรดปรึกษาแพทย์

จะป้องกันโรคนี้ได้อย่างไร?

- การรักษาความสะอาดที่ดีเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดหมัดจดหลังจากใช้ห้องสุขาแล้ว ก่อนกินอาหาร หลังจากเชื้ิดจมูก และหลังจากเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือเลือดผ้าที่สกปรก
- หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งต่างๆ ร่วมกับคนอื่น เช่น ถ้วย อุปกรณ์การกิน ของใช้ส่วนตัว (เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าขนหนูสำหรับล้างหน้า และ แปรงสีฟัน) และเลือดผ้า (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองเท้าและถุงเท้า)
- ซักฟอกเสื้อผ้าสกปรกให้สะอาดหมัดจดจริงๆ
- ต้องปิดปากและจมูกเมื่อไอและจาม ใช้กระดาษทิชชูเช็ดจมูกและปาก กำจัดกระดาษทิชชูนั้น แล้วล้างมือของท่านให้สะอาด

จะควบคุมการแพร่ของโรคนี้ได้อย่างไร?

อย่าให้เด็กที่เป็นโรคมือ เท้า และ ปากไปโรงเรียน หรือไปสถานศูนย์แลเด็ก จนกว่าเม็ดพุพองจะแห้งสนิท

ควรแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานศูนย์แลเด็กหรือครูใหญ่ของโรงเรียนทราบว่าบุตรของท่านเป็นโรคนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม - หน่วยงานสาธารณสุขในรัฐนิวเซาธ์เวลส์



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au