

## ເຊື້ອ Staphylococcus Aureus (MRSA) ທີ່ດີ້ຢາ Methicillin ແມ່ນຫຍັງ? What Is Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA)?

Staphylococcus aureus (ຫຼື staph) ແມ່ນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ພົບຢູ່ເທິງຜິວໜັງແລະໃນດັງຂອງຄົນ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ staph ຈະບໍ່ເປັນພິດເປັນພິດຫຍັງ, ແຕ່ວ່າບາງຄັ້ງມັນກໍອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອແລະເກີດເຈັບເປັນຮ້າຍແຮງໄດ້.

ບາງພັນຂອງ staph ໄດ້ເກີດດີ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ methicillin ແລະ ຢາຕ້ານເຊື້ອຊົນດອນອື່ນໆ ຊຶ່ງໃຊ້ປິ່ນປົວໂຮກນີ້ ກັນມາແຕ່ກ່ອນ. ການຕິດເຊື້ອທີ່ເກີດຈາກ Staphylococcus aureus (MRSA) ຊຶ່ງດີ້ຢາ methicillin ນັ້ນຍາກຕໍ່ການປິ່ນປົວ, ເພາະວ່າຢາຕ້ານເຊື້ອເກືອບທຸກຊົນດອນບໍ່ສາມາດຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຊົນດອນນີ້ໄດ້.

### ທ່ານຕິດເຊື້ອ MRSA ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ທ່ານສາມາດຕິດເຊື້ອ MRSA ຈາກຊຸມຊົນ ຫຼືວ່າຈາກໂຮງໝໍ ຫຼື ສະຖານດູແລສຸຂະພາບແບບອື່ນໆ.

MRSA ແລະ staph ຊົນດອນອື່ນໆສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອໄດ້ໂດຍເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຜ່ານຜິວໜັງທີ່ມີຮອຍເປີດ ຫຼື ເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນເລືອດ. ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບເຊັ່ນໂຮກເປົາຫວານຫຼືທີ່ພູມຕ້ານທານຕ່ຳ - ຫຼືຜູ້ທີ່ມີຜິວໜັງມີຮອຍເປີດຍ້ອນບາດແຜ, ຍ້ອນການຜ່າຕັດເມື່ອໜຶ່ງນີ້, ຫຼືຜູ້ທີ່ເປັນໂຮກຜິວໜັງ - ຄົນເຫຼົ່ານີ້ ມີເປົ້າໂຮກຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນ ວ່າຈະຕິດເຊື້ອ staph ນີ້.

MRSA ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

- ຜິວໜັງຕິດເຊື້ອເຊັ່ນເຊື້ອ boils and impetigo (ຕຸ່ມໃສເປັນຈຸ່ມ);
- ຕິດເຊື້ອໃຕ້ຜິວໜັງ (cellulitis);
- ພຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນເຊັ່ນການຕິດເຊື້ອຂອງກະດູກ, ເລືອດ, ປອດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນຂອງຮ່າງກາຍ.

### ຈະຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າທ່ານໄດ້ ຕິດເຊື້ອ MRSA ແລ້ວ?

ທ່ານໝໍຈະຕ້ອຍເອົາຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆຫຼືຕົວຢ່າງຈາກຕຸ່ມໃສພອງ, ບາດແຜ, ຫຼືຈາກບ່ອນຕິດເຊື້ອອື່ນໆ. ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກສົ່ງໄປທ້ອງລົດລອງເພື່ອກວດຫາເຊື້ອ.

## ຈະປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອ MRSA ໄດ້ຢ່າງໃດ?

MRSA ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ດ້ວຍຢາຕ້ານເຊື້ອຊົນດພິເສດ. ການປິ່ນປົວແບບອື່ນໆກໍມີເຊັ່ນ ການລ້າງແຜ, ແລະ ສັນຍະກັມ, ແລ້ວແຕ່ຊົນດຂອງການຕິດເຊື້ອ. ທ່ານໝໍຂອງທ່ານຈະແນະນຳເຖິງວິທີການປິ່ນປົວທີ່ດີທີ່ສຸດຕໍ່ຊົນດຂອງການຕິດເຊື້ອ.

## MRSA ແຜ່ຜາຍໄດ້ຢ່າງໃດ?

MRSA ສາມາດແຜ່ຜາຍໄດ້ໂດຍ:

- ການບາຍຫຼືບົບພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຕິດເຊື້ອ, ເຊັ່ນ ຕຸ່ມໃສຫຼືແຜ;
- ໃຊ້ຜ້າເຊັດໂຕເປື້ອນ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫຼີຜ້າປູປ່ອນຊຶ່ງມີຄົນຕິດເຊື້ອ MRSA ໃຊ້ມາກ່ອນ;
- ໃຊ້ອຸປະກອນສຳລັບແຕ່ງແລະຕັດຊິ້ນຕິດເຊື້ອ MRSA ໃຊ້ມາກ່ອນ;
- ລ້າງມືບໍ່ສະອາດດີ.

## ທ່ານຈະປ້ອງກັນການແຜ່ຜາຍເຊື້ອ MRSA ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ໃຫ້ລ້າງມື.

ການລ້າງມືເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ຜາຍຂອງເຊື້ອ MRSA.

ໃຫ້ລ້າງມື:

- ກ່ອນແລະຫຼັງຈາກບາຍຫຼືແຕ່ງແຜປ່ອນທີ່ຕິດເຊື້ອ;
- ຫຼັງຈາກເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ;
- ຫຼັງຈາກສັ່ງຂີ້ມູກ;
- ກ່ອນຈັບບາຍຫຼືກິນອາຫານ;
- ກ່ອນຈັບບາຍເດັກເກີດໃໝ່;
- ຫຼັງຈາກບາຍຫຼືຈັບເຄື່ອງນຸ່ງຫຼີຜ້າປູປ່ອນທີ່ບໍ່ທັນຂັກ.

## ຂ້ອຍຄວນລ້າງມືຢ່າງໃດ?

ໃຫ້ລ້າງທຸກພາກສ່ວນຂອງມືໃຫ້ສະອາດດີ ໂດຍໃຊ້ສະບູ ແລະ ນ້ຳກ້ອກ. ໃຫ້ໄລ່ໃຫ້ສະອາດແລະເຊັດມືໃຫ້ແຫ້ງຫຼັງຈາກລ້າງມືແລ້ວ.

## ໃຫ້ປິດຕຸ່ມໃສແລະຜົວໜັງທີ່ຕິດເຊື້ອອື່ນໆ


ໃຫ້ປິດຕຸ່ມໃສແລະຜົວໜັງທີ່ຕິດເຊື້ອອື່ນໆດ້ວຍຜ້າພັນແຜກັນນ້ຳ ໃນເວລາກາງເວັນ. ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນ impetigo (ຕຸ່ມໃສນ້ອຍໆຫຼືຕຸ່ມຫົວແປສີເຫຼືອງຄ້າຍນ້ຳເຜິ້ງ ຢູ່ຕາມຜົວໜັງ, ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ Staphylococcus ຫຼື Streptococcus) ບໍ່ຄວນໄປໂຮງຮຽນຫຼືໄປສູນດູແລເດັກຈົນກວ່າຫຼັງຈາກໄດ້ປິດໂຮງນີ້ໃຫ້ຄົບມື້ນຶ່ງເສັຍກ່ອນ.

ຢ່າໃຊ້ສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານີ້ຮ່ວມກັນ:

- ຜ້າເຊັດໂຕ, ເຄື່ອງນຸ່ງ ຫຼື ຜ້າບູບ່ອນເບື້ອນ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ຕຽງຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ, ໃຫ້ພັ້ນຕຸ່ມ ຫຼືແຜ ໄວ້ຍາມກາງຄືນ;
- ອຸປະກອນແຕ່ງແລະຕັດ ເຊັ່ນມີດຕັດເລັບ, ແໜບ, ມີດແຖ ແລະ ແປງຄູແຂ້ວ.

ໃຫ້ຊັກຜ້າເຊັດໂຕ, ເຄື່ອງນຸ່ງ, ຜ້າບູບ່ອນ ແລະ ສິ່ງຂອງຢ່າງອື່ນທີ່ອາດເປື້ອນໜອງຫຼື MRSA ໂດຍ ໃຊ້ຈັກຊັກເຄື່ອງ. ບໍ່ໄດ້ມີການແນະນຳວ່າຈຳເປັນຕ້ອງຊັກດ້ວຍນ້ຳທີ່ມີອຸນຫະພູມຮ້ອນເປັນພິເສດແຕ່ ຢ່າງໃດ. ໃຫ້ຕາກເຄື່ອງນຸ່ງແລະຜ້າບູບ່ອນພາຍໃຕ້ແສງແດດໂດຍຕົງ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ເພາະວ່າ ແສງແດດຈະຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໄດ້. ເຄື່ອງມືສຳລັບຕັກກິນ ແລະ ຖ້ວຍຊາມສາມາດລ້າງໄດ້ຕາມ ແບບທັມມະດາ.

ຮາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ - ຜແນກສາທາຣະນະສຸກແຫ່ງຣັດ NSW



**1300 066 055**

[www.health.nsw.gov.au](http://www.health.nsw.gov.au)