

ជម្ងឺរលាកខួរក្បាលដោយមេរោគមីនេរី វ៉ាលី (Murray Valley) Murray Valley Encephalitis

តើជម្ងឺរលាកខួរក្បាលដោយមេរោគ Murray Valley ជាអ្វី ?

- ជម្ងឺរលាកខួរក្បាលដោយ Murray Valley (MVE) ជាជម្ងឺបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតដោយសារសត្វមូសខាំហើយបង្កឡើងដោយវីរុសរលាកខួរក្បាលឈ្មោះ Murray Valley ។
- គេស្គាល់ជំងឺនេះផងដែរថាជា ជម្ងឺរលាកខួរក្បាលអូស្ត្រាលី ។

តើជម្ងឺនេះកើតឡើងនៅកន្លែងណា ?

- ជាទូទៅជម្ងឺ MVE កើតឡើងនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃភាគពាយ័ព្យប្រទេសអូស្ត្រាលី ។ ជំងឺនេះកំរើតឡើងនៅភាគខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីណាស់ ។
- រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន (ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០១) គេពុំឃើញមានរបាយការណ៍ អំពីករណីនៃជំងឺនេះចំពោះមនុស្សលោកឡើយ នៅតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី ដោយរួមទាំងរដ្ឋ NSW និងរដ្ឋវិកតូរីយ៉ាផង ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៧៤ មក។
- ការរាតត្បាតក្នុងអតីតកាលបង្ហាញពីការឆ្លងរបស់វីរុសទៅមនុស្សដែលរស់នៅភាគខាងលិចនៃរដ្ឋNSW ។

តើជម្ងឺនេះរាលដាលយ៉ាងដូចម្តេច ?

- វីរុស MVE ឆ្លងតាមរយៈមូសខាំដែលមានផ្ទុកវីរុសនេះ
- មិនមែនគ្រប់មូសទាំងអស់សុទ្ធតែផ្ទុកវីរុសនេះទេ
- ពពួកមូសដែលច្រើនផ្ទុកវីរុសជាងគេបំផុតគឺហ្វូងមូស Culex annulirostris ។ មានមនុស្សតែម្នាក់គត់ក្នុងចំណោមមនុស្សប្រហែលជា ១០០០ នាក់ ដែលនឹងកើតជម្ងឺនេះ ក្រោយពីបានឆ្លងរោគនេះតាមរយៈមូសខាំ។
- វីរុសនេះមាននៅក្នុងខ្លួនបក្សីទឹក ។ មូសឆ្លងមេរោគនេះដោយសារវាខាំបក្សី ឬ សត្វពាហនៈផ្សេងទៀតដែលមានផ្ទុកវីរុសនោះដែរ ។ ការឆ្លងរាលដាលចូលទៅផ្នែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី ត្រូវបានគេគិតថាកើតឡើងដោយសារបំលាស់ទីតាំងរបស់បក្សីទឹក ដែលជាទូទៅកើតមានឡើងតាមស្ថានភាពសំណើមនៅក្នុងតំបន់ដីគោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ។

តើនរណាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងគេ?

ជម្ងឺនេះបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតប្រហែល ២០% នៃអ្នកដែលបានឈឺ ហើយច្រើនជាង ២៥% ទៀតអាចរីងខ្លួនទៅរកផលវិបាកស្មុគស្មាញផ្នែកសតិបញ្ញា និង/ឬ ផលវិបាកស្មុគស្មាញនៃសរសៃប្រសាទ។ ប្រហែល ៤០% នៃករណីទាំងនោះ នឹងជាសះស្បើយទាំងស្រុង ។

តើរោគសញ្ញាមានអ្វីខ្លះ ?

- ជម្ងឺនេះនឹងស្តែងឡើងក្នុងរវាង ៥-១៥ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមូសដែលមានផ្ទុកមេរោគខាំ ។
- ភាគច្រើនបំផុតនៃមនុស្សដែលបានឆ្លង MVE នឹងគ្មានរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ ក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាអាចមានរោគសញ្ញា ៖
 - ឈឺក្បាលខ្លាំង
 - រីងកញ្ជឹង
 - ក្តៅខ្លួន
 - ញ័រដៃជើង
 - ប្រកាច់ (ជាពិសេសចំពោះក្មេងតូចៗ)
 - រង្វែងរង្វាន់
 - ក្អក
 - ចង្អោរ
 - រាក
 - វិលមុខរឹងធ្មេញ
 - អស់កម្លាំងឡេះឡោះ, មួម៉ៅ, ងងុយជេក
 - សន្លប់ (ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ)
- មនុស្សដែលធ្លាប់មានរោគសញ្ញាទាំងនេះគួរស្វែងរកការព្យាបាល។


ការបង្ការ

គ្មានការព្យាបាល ឬវ៉ាក់សាំងជាក់លាក់ សំរាប់ MVE ទេ។ ការការពារតែមួយគត់ដើម្បីជៀសវាងជម្ងឺនេះគឺកុំឱ្យ មូសខាំ ។ ការការពារនេះមានសារសំខាន់ជាពិសេស ចំពោះអ្នកដំណើរនិងអ្នកទេសចរទៅកាន់តំបន់ដែល អាចមាន MVE ។

ការពារខ្លួនអ្នកផ្ទាល់កុំឱ្យមូសខាំ :

ការការពារមូសក្នុងរដូវកាលនៃការយាមរដូវ MVE មានសារសំខាន់ណាស់ ៖

- ជៀសវាងចេញទៅក្រៅនៅពេលដែលមូសមានសកម្មភាពខ្លាំង ជាពិសេសនៅពេលព្រឹកព្រលឹមនិង ចន្លោះពេលមុនថ្ងៃលិចទៅពាក់កណ្តាលល្ងាច ។
- ប្រើសំលៀកបំពាក់រលុងហើយមានពណ៌ស្រាលព្រឿងៗ ព្រមទាំងមានដៃវែងជើងវែងនិងស្រោមជើង។ មូសអាចខាំតាមរយៈការស្លៀកពាក់រឹបតឹង។
- ប្រើម្រាមបណ្តាញសត្វល្អិតនៅពេលទៅក្រៅផ្ទះនិងប្រើប្រាស់ម្រាមបណ្តាញលាបនោះឡើងវិញនៅពេល សមស្រប។ ម្រាមបណ្តាញលាបមានប្រសិទ្ធភាពជាង ហើយស្ថិតនៅបានយូរជាងម្រាមបណ្តាញ។
- ត្រូវធ្វើឱ្យប្រាកដថាសំណាញ់ការពារមូសត្រូវមានជាក់គ្រប់ទ្វារទាំងអស់និងមានសភាពល្អ ។ ប្រសិនបើមានការ បោះជំរំនៅខាងក្រៅត្រូវដេកក្នុងមុង ឬ ក្នុងតង់ដែលមូសមិនអាចចូលបាន។
- មុនពេលចូលដេកត្រូវបាញ់មូស កំចាត់មូស ដើម្បីសំលាប់មូសដែលមាននៅក្នុងបន្ទប់។



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au