

បណ្តាញមានអំពីជំងឺឆ្លង

ជំងឺក្អកក្អង

ជំងឺក្អកក្អងយ៉ាងមនុស្សគ្រប់អាយុទាំងអស់ ប៉ុន្តែជំងឺនេះអាចមានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះ ទារក។ ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនៅអាយុពីរខែ បួនខែ និងប្រាំមួយខែ អាចបង្ការជំងឺនេះ បាន។ ការចាក់ថ្នាំបង្ការគឺជាការចាំបាច់សំរាប់ កុមារអាយុបួនឆ្នាំនិងក្មេងជំទង់ ព្រមទាំង មនុស្សពេញវ័យដែលរស់នៅឬធ្វើការជាមួយ កុមារតូចៗ។

តើក្អកក្អងគឺជាជំងឺអ្វី?

ក្អកក្អងគឺជាជំងឺមួយបណ្តាលដោយការឆ្លងបាក់តេរី *Bordetella pertussis* ទៅក្នុងបំពង់ក។

តើជំងឺនេះមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ?

- ជាធម្មតា ជំងឺក្អកក្អងចាប់ផ្តើមដូចជាកើតផ្តាសាយយ៉ាងដូច្នោះដែរ ដោយមានការហៀរសំបោរ អស់កម្លាំង និងជួនកាល គ្រុនក្តៅមិនសូវខ្លាំងឡើយ។
- បន្ទាប់មកអ្នកជំងឺកើតមានក្អក ជាធម្មតាមានពេលក្អកជាប់គ្នា និងមានការដង្ហក់រកខ្យល់ជាខ្លាំងមួយនៅគ្រាព្រាយពីនោះ។ ជួនកាលទៅអ្នកខ្លះអាចក្អកនៅព្រាយពីក្អកហើយ។
- ជំងឺក្អកក្អងអាចមានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះកុមារតូចៗ។ កុមារទាំងនេះប្រហែលជាមានមុខឡើងស្លេកស្លាំង ឬឈប់ ដកដង្ហើមក្នុងអំឡុងពេលក្អកខ្លាំង ហើយអាចត្រូវធ្វើដំណើរទៅមន្ទីរពេទ្យ។
- កុមារធំៗនិងមនុស្សពេញវ័យអាចមានជំងឺមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរដូចកុមារតូចៗឡើយ។ អ្នកទាំងនេះមានត្រាក្អកជាប់គ្នាដែលបន្ត ពេលជាច្រើនអាទិត្យ ទោះជាមានការព្យាបាលក៏ដោយ។

តើជំងឺនេះឆ្លងតាមរបៀបណា?

ជំងឺក្អកក្អងឆ្លងទៅកាន់អ្នកដទៃតាមរយៈចំហាយទឹកមាត់ដែលក្អកចេញ ឬចំហាយសំបោរចេញពីការកណ្តស់។ បើមិនព្យាបាលទេ អ្នកកើតជំងឺក្អកក្អងអាចចម្លងមេរោគនេះទៅកាន់អ្នកដទៃរយៈពេលរហូតដល់ទៅបីអាទិត្យ ក្រោយពីក្អកបានកើតមានឡើង។

ជាធម្មតា រយៈពេលចាប់ពីពេលប៉ះពាល់មេរោគរហូតដល់ពេលកើតជំងឺគឺប្រាំពីរទៅដប់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែអាចមានរយៈពេលដល់ទៅបី អាទិត្យទៀតផង។

តើអ្នកណាខ្លះដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺនេះ?

- ជនរាល់រូបអាចកើតជំងឺក្អកក្អង។
- អ្នកដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងអ្នកកើតជំងឺក្អកក្អង ទំនងជាឆ្លងជំងឺនេះ។
- ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងជំងឺនេះ ប៉ុន្តែការកើតមានជំងឺនេះសាជាថ្មីអាចកើតមានឡើង។

តើវិធីបង្ការជំងឺនេះធ្វើឡើងដោយរបៀបណា?

ឲ្យកូនលោកចាក់ថ្នាំបង្ការរោគទាន់ពេល

- ថ្នាំបង្ការរោគមិនផ្តល់ការការពារមួយជីវិតទល់នឹងជំងឺក្អកក្អងទេ ហើយជួនកាលការការពារក៏មិនបានពេញលេញដែរ។
- កុមារត្រូវចាក់ថ្នាំនៅពេលមានអាយុពីរខែ បួនខែ និងប្រាំមួយខែ។
- ការចាក់ថ្នាំបន្ថែមគឺជាការចាំបាច់នៅពេលកុមារមានអាយុបួនឆ្នាំ និងម្តងទៀតនៅពេលមានអាយុ 15 ឆ្នាំ។
- វេជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលជំងឺទូទៅនិងសាលាក្រុងខ្លះផ្តល់ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនេះ។

កុំឲ្យទារកលោកអ្នកទៅជិតអ្នកដែលក្អក

- ទារកត្រូវការថ្នាំបង្ការរោគពីរបីលើកមុនពេលទារកទាំងនោះអាចការពារទល់នឹងជំងឺក្អកក្អងបាន។ ដោយសារមូលហេតុនេះហើយ ជាការសំខាន់ក្នុងការកុំឲ្យអ្នកមានជំងឺក្អកក្អងទៅជិតទារកលោកអ្នកឡើយ ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងនោះចម្លងជំងឺក្អកក្អង ឬមេរោគផ្សេងទៀតទៅកាន់ទារកលោកអ្នក។

ចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ បើលោកអ្នកគឺជាជនពេញវ័យដែលមានការប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធនឹងកុមារតូចៗ

មានថ្នាំបង្ការរោគសំរាប់មនុស្សពេញវ័យ។ ថ្នាំនេះគួរចាក់ឲ្យ៖

- ទាំងមាតានិងទាំងបិតានៅពេលគ្រោងមានផ្ទៃពោះ ឬក្រោយពេលទារកប្រសូតហើយភ្លាម
- ជនពេញវ័យដែលធ្វើការជាមួយកុមារក្មេងៗ ជាពិសេសនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ បុគ្គលិកថែទាំសុខភាព និងបុគ្គលិកថែទាំកុមារ។

បើលោកអ្នកប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកកើតជំងឺក្អកក្អង៖

- សូមប្រុងប្រយ័ត្នអំពីរោគសញ្ញាទាំងឡាយ។ បើកើតមានរោគសញ្ញា សូមទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នក យកប័ណ្ណព័ត៌មាននេះទៅជាមួយលោកអ្នក ហើយប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតថាលោកអ្នកបានប៉ះពាល់អ្នកកើតជំងឺក្អកក្អង។
- អ្នកប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធខ្លះដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង(ឧទាហរណ៍៖ កុមារអាយុតិចជាងមួយឆ្នាំ កុមារមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគពេញលេញ និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជិតគ្រប់ខែ) និងអ្នកដទៃទៀតដែលរស់នៅឬធ្វើការជាមួយអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងអាចត្រូវប្រើថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកដើម្បីបង្ការជំងឺនេះ។

បើលោកអ្នកកើតជំងឺក្អកក្អង៖

- សូមទទួលការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលនៅក្នុងពេលកើតជំងឺនេះ ប្រៀសវាងអ្នកដទៃនិងកុំទៅជិតកុមារក្មេងៗ ឧទាហរណ៍៖ នៅតាមមណ្ឌលថែទាំកុមារ មគ្គុយសាលា និងសាលារៀន។

តើការវិនិច្ឆ័យរោគធ្វើទៅតាមរបៀបណា?

បើវេជ្ជបណ្ឌិតយល់ថា អ្នកណាមួយកើតជំងឺក្អកក្អង វេជ្ជបណ្ឌិតនោះនឹងធ្វើតេស្តសំណាកសារធាតុពីទីជំងឺនៃរន្ធប្រថមុះ ឬធ្វើតេស្តឈាម ដើម្បីជួយបញ្ជាក់ថាតើអ្នកនោះកើតជំងឺនេះដែរឬទេ។

តើវិធីព្យាបាលជំងឺនេះធ្វើឡើងដោយរបៀបណា?

ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកពិសេស – ជាធម្មតាគឺប្រើថ្នាំ azithromycin, erythromycin ឬ clarithromycin ដើម្បីព្យាបាលជំងឺក្អកក្អង។ ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកទាំងនេះអាចបង្ការការឆ្លងរាលដាលមេរោគទៅកាន់អ្នកដទៃ។


ជាញឹកញយ ការក្អកក្អងមានជាច្រើនអាទិភ័យទៅទៀត ទោះជាមានការព្យាបាលហើយក៏ដោយ។

តើផ្នែកសុខភាពសាធារណៈមានវិធានការឆ្លើយតបអ្វីខ្លះ?

វេជ្ជបណ្ឌិតនិងមន្ទីរពិសោធន៍ត្រូវរាយការណ៍ដោយលាក់ការសម្ងាត់នូវករណីដែលជំងឺក្អកមាន់ទៅកាន់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ (Public Health Unit) ក្នុងតំបន់។ បុគ្គលិកផ្នែកសុខភាពសាធារណៈអាចផ្តល់ឱវាទអំពីវិធីប្រសើររបស់ផ្នែកក្នុងការបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលតទៅទៀត។

កុមារដែលកើតជំងឺនេះ មិនត្រូវទៅមត្តេយ្យសាលានិងសាលារៀនឡើយ។ អ្នកប៉ះពាល់មេរោគដែលគ្មានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនេះ អាចទទួលការហាមឃាត់មិនឲ្យទៅមណ្ឌលថែទាំកុមារ លុះត្រាតែអ្នកទាំងនោះប្រើថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកពិសេស។

ព័ត៌មានបន្ថែម - ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ (Public Health) នៅក្នុងរដ្ឋ NSW



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au