

ເຈ້ຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່

ໂຮກໄອໄກ່ (ໄອຫອບ)

ໂຮກໄອໄກ່ສາມາດເປັນໄດ້ກັບຄົນທຸກວັຍ, ແຕ່ວ່າມັນອາດຮ້າຍແຮງໄດ້ຖ້າເປັນ ກັບ ແອນ້ອຍ. ໂຮກນີ້ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ໂດຍການສັກຢາ ເມື່ອອາຍຸໄດ້ ສອງເດືອນ, ສີ່ເດືອນແລະຫົກເດືອນ. ຕ້ອງໄດ້ສັກຕື່ມ ອີກເມື່ອອາຍຸໄດ້ ສີ່ປີ ແລະ ເມື່ອຍ່າງເຂົ້າ ສູ່ວັຍລຸ້ນ, ຫຼືສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນ ຊຶ່ງມີ ເດັກນ້ອຍຫຼື ສຳລັບຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກັບ ເດັກນ້ອຍ.

ໂຮກໄອໄກ່ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຮກໄອໄກ່ (ຫຼື ໄອຫອບ) ແມ່ນພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ເອີ້ນວ່າ *Bordetella pertussis* ໃນຮູຄໍ.

ໂຮກນີ້ມີອາການຫຍັງແດ່?

- ໂຮກໄອໄກ່ຕາມປົກກະຕິຈະເລີ່ມອາການຄ້າຍກັບວ່າເປັນຫວັດ, ມີຂໍ້ມູນກ້ອຍ, ອ່ອນເພັຍ ແລະ ບາງເທື່ອກໍມີໄຂ້ປານກາງ:
- ຈາກນັ້ນກໍຈະເລີ່ມໄອ, ສ່ວນຫຼາຍຈະໄອເປັນຊຸດ, ຕິດຕາມດ້ວຍການຫາຍໃຈເລິກ (ຫຼື "ຫອບ"). ບາງເທື່ອ ຜູ້ເປັນອາດຈະຮາກຫຼັງຈາກໄອ.
- ໂຮກໄອໄກ່ອາດຮ້າຍແຮງຫຼາຍສຳລັບເດັກອາຍຸນ້ອຍ. ເຂົາເຈົ້າອາດປ່ຽນເປັນສີແຫຼ້ ຫຼື ຢຸດຫາຍໃຈໃນລະຫວ່າງທີ່ໄອຂຶ້ນ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ໄປໂຮງໝໍ.
- ເດັກທີ່ອາຍຸໃຫຍ່ແລ້ວແລະຜູ້ໃຫຍ່ອາດບໍ່ມີອາການຮ້າຍແຮງປານໃດ, ພວກນີ້ຈະໄອເປັນຊຸດແລະ ໄອຢູ່ເປັນເວລາ ຫຼາຍ ອາທິດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວກໍຕາມ.

ໂຮກນີ້ແຜ່ຜາຍຢ່າງໃດ?

ໂຮກໄອໂກ່ແຜ່ຜາຍໄປຫາຄົນອື່ນໂດຍທາງຝ່ອຍນໍ້າຈາກການໄອຫຼືຈາມ. ຖ້າບໍ່ປິ່ນປົວ, ຄົນທີ່ເປັນໂຮກໄອໂກ່ອາດ ແຜ່ຜາຍໂຮກ ໃຫ້ ຄົນອື່ນໄດ້ຈົນຮອດສາມອາທິດຫຼັງຈາກທີ່ເລີ້ມໄອ.

ຊ່ວງລະຍະເວລາລະຫວ່າງເລີ້ມໄດ້ຮັບເຊື້ອໂຮກຈົນເຖິງຕອນເລີ້ມເຈັບປ່ວຍນັ້ນ ຕາມປົກກະຕິຈະແມ່ນເຈັດຫາສິບມື້, ແຕ່ວ່າບາງທີກໍອາດຮອດສາມອາທິດ.

ແມ່ນໃຜແດ່ທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດໂຮກນີ້?

- ທຸກໆຄົນອາດເປັນໂຮກໄອໂກ່ໄດ້.
- ຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນດຽວກັນກັບຜູ້ທີ່ເປັນໂຮກໄອໂກ່ມີແນວໂນ້ມວ່າຈະຕິດໂຮກນີ້ໄດ້.
- ການສັກຢາປ້ອງກັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເປີເຊັນໃນການຕິດເຊື້ອນີ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແຕ່ວ່າທ່ານອາດຕິດເຊື້ອໄດ້ໃໝ່ອີກ ໃນ ເວລາຕໍ່ມາ.

ຈະປ້ອງກັນໂຮກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ພາລູກໄປສັກຢາໃຫ້ທັນກັບເວລາ

- ຢາວັກຊີນນີ້ຈະປ້ອງກັນໂຮກໄອໂກ່ໄດ້ຕອດຊີວິດ, ແລະບາງເທື່ອກໍປ້ອງກັນໄດ້ຄົບຖ້ວນ.
- ເດັກນ້ອຍຕ້ອງໄດ້ສັກຢາເມື່ອອາຍຸໄດ້ສອງເດືອນ, ສີ່ເດືອນ ແລະ ຫົກເດືອນ.
- ຕ້ອງໄດ້ສັກຢາເພີ່ມອີກເມື່ອອາຍຸໄດ້ ສີ່ປີ ແລະ ອີກເທື່ອນຶ່ງເມື່ອອາຍຸໄດ້ 15 ປີ.
- ທ່ານສາມາດພາລູກໄປສັກຢາໄດ້ກັບທ່ານໝໍແລະຕາມເທສບານທ້ອງຖິ່ນບາງແຫ່ງ.

ເອົາລູກອອກຫ່າງຈາກຄົນໄອ

- ແອນ້ອຍຕ້ອງໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນ ສອງຫຼື ສາມເທື່ອກ່ອນຢາຈະປ້ອງກັນໄດ້. ດ້ວຍເຫດນີ້, ຈຶ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ຫຼາຍ ທີ່ຕ້ອງເອົາລູກ ອອກຫ່າງຈາກຄົນທີ່ມີພະຍາດໄອເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແຜ່ຜາຍໂຮກໄອໂກ່ຫຼືພະຍາດຢ່າງອື່ນມາ ຕິດຕໍ່ໃສ່ລູກຂອງທ່ານ.

ຈຶ່ງໄປສັກຢາປ້ອງກັນຖ້າທ່ານແມ່ນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃກ້ຊິດກັບເດັກນ້ອຍ

ມີຢາວັກຊີນສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່. ຂໍແນະນຳດັ່ງນີ້:

- ໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນທັງໝົດແລະແມ່ເມື່ອວາງແຜນເອົາລູກ, ຫຼືໃນທັນທີທີ່ເດັກນ້ອຍເກີດ
- ໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍສັກຢາວັກຊີນ, ໂດຍສະເພາະພະນັກງານດູແລສຸຂພາບ ແລະສູນຝາກເດັກ.

ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ຢູ່ໃກ້ຊິດກັບຄົນທີ່ເປັນໂຮກໄອໄກ່:

- ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງອາການ. ຖ້າອາການປາກົດຂຶ້ນ, ໃຫ້ໄປຫາໝໍປະຈຳຄອບຄົວຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຖືເຈ້ຍຂໍ້ມູນໃບນີ້ໄປນຳ ແລະບອກ ໃຫ້ເພິ່ນຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄົນທີ່ເປັນໂຮກໄອໄກ່.
- ຜູ້ໃກ້ຊິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ (ເຊັ່ນເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່ກວ່ານຶ່ງປີ, ເດັກທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສັກຢາຄົບຊຸດ, ແລະແມ່ຍິງທີ່ທ້ອງແກ່ໃກ້ຄອດ) ແລະຄົນອື່ນໆທີ່ຢູ່ຮ່ວມຫຼືເຮັດວຽກກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ອາດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ກິນຢາປະຕິຊີວະນະ (antibiotics) ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ ຈາກການຕິດເຊື້ອ.

ຖ້າທ່ານເປັນໂຮກໄອໄກ່:

- ໃຫ້ໄປປິ່ນປົວແຕ່ຕົ້ນໆໃນລະຫວ່າງຕິດເຊື້ອ, ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນພົບປະກັບຄົນອື່ນ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກເດັກນ້ອຍ, ຕົວຢ່າງ ທີ່ສູນດູແລເດັກ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ໂຮງຮຽນ.

ຈະກວດຫາໂຮກນີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ?

ຖ້າທ່ານໝໍຄິດວ່າຄົນຜູ້ນຶ່ງເປັນໂຮກໄອໄກ່, ເພິ່ນອາດຈະຕ້ອຍເອົາຕົວຢ່າງດ້ານໃນຂອງຮູດັງ, ຫຼືທຳການກວດເລືອດເພື່ອຢັ້ງຢືນ ການກວດຫາພະຍາດ.

ຈະປິ່ນປົວໂຮກນີ້ຢ່າງໃດ?

ຢາປະຕິຊີວະນະຊນິດພິເສດ - ຕາມປົກກະຕິຈະໃຊ້ຢາຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງຊຶ່ງມີ azithromycin, erythromycin ຫຼື clarithromycin ເພື່ອທຳການປິ່ນປົວໂຮກໄອໄກ່.


ຢາປະຕິຊີວະນະເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປ້ອງກັນການແຜ່ຜ່າຍແມ່ພະຍາດໃຫ້ຄົນອື່ນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະ ປິ່ນປົວແລ້ວກໍຕາມ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ກໍຍັງໄອຢູ່ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ.

ຜແນກສາທາຣະນະສຸກມີທ່າທິຢ່າງໃດຕໍ່ໂຮກນີ້?

ທ່ານໝໍແລະທ້ອງທົດລອງຕ້ອງລາຍງານກໍຣະນີຂອງໂຮກໄອໄກ່ແບບເກັບເປັນຄວາມລັບຂອງແຕ່ລະກໍຣະນີ ໃຫ້ຜແນກ ສາທາຣະນະ ສຸກຊາບ. ພະນັກງານຂອງຜແນກສາທາຣະນະສຸກສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳ ເຖິງວິທີທີ່ດີສຸດເພື່ອຢຸດຢັ້ງການແຜ່ຜ່າຍເຊື້ອໂຮກ.

ເດັກນ້ອຍທີ່ຕິດເຊື້ອໂຮກນີ້ ຈະຖືກຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ໄປໂຮງຮຽນອະນຸບານຫຼືໂຮງຮຽນ. ຜູ້ພົວພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາ ປ້ອງກັນອາດຖືກສັ່ງໃຫ້ ຫຼີກເວັ້ນສູນດູແລເດັກນອກຈາກວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ກິນຢາປະຕິຊີວະນະຊນິດພິເສດ.



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au