

ជំងឺ Psittacosis

Psittacosis

តើជំងឺ Psittacosis ជាអ្វី?

- ជំងឺ Psittacosis ជាជំងឺមួយមិនសូវសំបូរប៉ុន្មានទេ ច្រើនតែឆ្លងពីសត្វបក្សីមកមនុស្ស។ ជំងឺនេះបង្កដោយបាក់តេរីមួយប្រភេទ ឈ្មោះថា Chlamydia psittaci ។

តើជំងឺនេះឆ្លងយ៉ាងដូចម្តេច?

- ជាទូទៅការចំលងរោគច្រើនកើតមាននៅពេលមនុស្សជិកជង្ហើមចូលនូវមេរោគបាក់តេរីនេះ ច្រើនតែមកពីកំទេច លាមកសត្វរបស់បក្សីដែលមានជំងឺ ។ មនុស្សក៏អាចឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់រាងមាត់និងចំពុះ (ចើប) ជាមួយបក្សី ឬ តាមរយៈការចាប់កាន់ស្លាប ឬជាលិកាបក្សីដែលមានមេរោគ នេះ។ ជំងឺ Psittacosis មិនត្រូវបានគេបង្ហាញថាអាចចំលងពីមនុស្សទៅមនុស្សបានទេ។
- រាល់បក្សីទាំងអស់ងាយឆ្លងជំងឺនេះណាស់ ប៉ុន្តែបក្សីចិញ្ចឹម (ឧទាហរណ៍ សេក, សេកតូចៗ (parakeets), cockatiels) និងបក្សីផ្សេងៗទៀត (ទា និង មាន់បារាំង) ជាទីបំផុត គឺជាអ្នកចំលងមេរោគទៅមនុស្សញឹកញាប់។
- អ្នកដែលប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ psittacosis នេះជាងគេបំផុត គឺអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនិងបក្សីតាមរយៈការងារ ឬ ការលេងកំសាន្ត។ ឧទាហរណ៍ ម្ចាស់បក្សី, និយោជិត ក្នុងហាងលក់សត្វចិញ្ចឹម, ពេទ្យសត្វ ឬ អ្នកដែលធ្វើសាច់បក្សី ។

តើរោគសញ្ញានៃជំងឺ Psittacosis មានអ្វីខ្លះ?

- រយៈពេលរងការប៉ះពាល់របស់មនុស្សជាមួយបាក់តេរី និង ការវិវឌ្ឍរោគសញ្ញាប្រែប្រួលប្រមាណពី ៤ ទៅ ១៥ ថ្ងៃ ។
- បុគ្គលមានជំងឺ Psittacosis ច្រើនកើតជំងឺដូចផ្តាសាយ (flu-like illness) ដោយមានការឡើងកំដៅខ្ពស់ៗ, រងាកញ្ជាក់, ឈឺក្បាល ខ្សោយកំលាំង និង ឈឺចាប់សាច់ដុំ។ ពួកគេថែមទាំងក្អកក្អង ឈឺដើមទ្រូង និង ពិបាកដកដង្ហើម (feel breathless) ផងដែរ។ ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ ជំងឺហើមសួតនឹងកើតឡើង។

តើគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និង ព្យាបាលជំងឺ Psittacosis យ៉ាងដូចម្តេច?

- ប្រសិនបើវេជ្ជបណ្ឌិតគិតថាមនុស្សណាម្នាក់មានជំងឺ psittacosis នេះ គេអាចធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីបញ្ជាក់ពីរោគវិនិច្ឆ័យ។ ការថតមើលទ្រូងដោយកាំរស្មីអ៊ិច ជាញឹកញាប់បង្ហាញឲ្យឃើញថាជាជំងឺហើមសួត។

- ជម្ងឺ Psittacosis ត្រូវព្យាបាលដោយថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិច ការព្យាបាលដោយថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិចនេះត្រូវបន្តជាប់រហូត សំរាប់រយៈពេល ២ សប្តាហ៍ ។
- ជាការសំខាន់ណាស់ដែលគេត្រូវព្យាយាមកំណត់ថាតើការចំលងរោគចេញមកពីណា ។ មនុស្សដទៃទៀតដែលប្រហែលជាបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយបក្សីមានជម្ងឺ គួរតែត្រូវគេពន្យល់ណែនាំឲ្យដឹងពីរោគសញ្ញានៃជម្ងឺនេះ។ គេគួរព្យាបាលបក្សី និង ធ្វើការសំអាតបរិស្ថានរបស់វាដោយប្រើថ្នាំសំលាប់មេរោគដើម្បីបង្ការមិនឲ្យមានការចំលងរោគដល់មនុស្ស ឬ បក្សីដទៃទៀត។


តើខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យដឹងថាបក្សីមានជម្ងឺឬអត់?

- ចំពោះបក្សីរោគសញ្ញានៃជម្ងឺអាចប្រែប្រួលពីការគ្មានអ្វីសោះទៅជាជម្ងឺមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត។ បក្សីឈឺអាចមានរោគសញ្ញាផ្សេងៗដូចជា រាករូស, ខ្សោយកំលាំង, ជ្រុះរោម, មិនស៊ីអាហារ និង ហៀរទឹកភ្នែក ឬ សំបោរ។ ប្រសិនបើមានការសង្ស័យ គេអាចឲ្យបសុពេទ្យធ្វើការពិនិត្យបក្សីរបស់អ្នក។ បក្សីមានជម្ងឺចាំបាច់ត្រូវទទួលបានការព្យាបាលដោយថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិច ហើយត្រូវដាក់ឲ្យបក្សីនៅដាច់តែឯង ហើយក៏ត្រូវកំចាត់មេរោគនៅក្នុងទ្រុងបក្សីឲ្យបានស្អាតដែរ។
- ដោយសារតែវាជាការពិបាកក្នុងការដឹងថា តើបក្សីមួយក្បាលមានឬគ្មានជម្ងឺនោះ លោកអ្នកត្រូវអនុវត្តអនាម័យល្អតឹងតែង រួមមានការលាងដៃនៅពេលប៉ះពាល់ឬស្លាបអង្កែលបក្សីចិញ្ចឹម។ ជៀសវាងការថើប (មាត់ទល់នឹងជំពុះ) ជាមួយបក្សីចិញ្ចឹមលេង។
- សត្វបក្សីគួរតែត្រូវគេទុកឲ្យនៅក្នុងទ្រុងស្អាតល្អ, មានទំហំទូលាយទ្រាប់ពីក្រោមដោយក្រដាសកាសែតដែលគេអាចប្តូរចេញបានញឹកញាប់។ មិនត្រូវទុកឲ្យលាមកបក្សីកើនឡើង ហើយឡើងក្រៀមស្អាតនោះទេ ហើយមិនត្រូវទុកឲ្យផ្លូវនៃលាមកនេះរសាត់តាមខ្យល់ឡើយ។ សូមបាញ់ទឹកបន្លិចលាមកបក្សីឬទ្រុងបក្សីជាមុន មុននឹងធ្វើការសំអាត។
- គេគួរតែទទួលយកបក្សីទាំងឡាយណាដែលចេញមកពីកន្លែងផែរក្សាបក្សី (aviary) ឬហាងលក់សត្វចិញ្ចឹមដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវ។

ព័ត៌មានបន្ថែម- Public Health Units in NSW

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងវេជ្ជបណ្ឌិត មន្ទីរសុខភាពសាធារណៈតាមតំបន់ ឬមណ្ឌលសុខភាពក្នុងសហគមន៍របស់លោកអ្នក។ សូមមើលនៅត្រង់កន្លែង 'NSW Government' នៅផ្នែកខាងមុខនៃសៀវភៅ White Pages។

ព័ត៌មានបន្ថែម - ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ (Public Health) នៅក្នុងរដ្ឋ NSW



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au