

ໂຮກ Psittacosis

Psittacosis

Psittacosis ແມ່ນຫຍັງ?

- Psittacosis ແມ່ນພຍາດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເປັນກັນ ຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິຈະຖ່າຍທອດຈາກນົກໄປຫາຄົນ. ໂຮກນີ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນແບັກທີເຣັຍຊີວິດນຶ່ງເອີ້ນວ່າ *Chlamydia psittaci*.

ເຊື້ອໂຮກແຜ່ຜ່າຍໄດ້ຢ່າງໃດ?

- ການຕິດເຊື້ອສ່ວນໃຫຍ່ຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອຄົນຫາຍໃຈເອົາແບັກທີເຣັຍເຂົ້າໄປ, ຕາມປົກກະຕິແມ່ນຈາກຂີ້ນົກແຫ້ງຂອງນົກທີ່ມີເຊື້ອ. ຄົນກໍສາມາດຕິດເຊື້ອໄດ້ໂດຍການຕິດຕໍ່ຈາກປາກຄົນຫາປາກນົກ (ຈູບນົກ) ຫຼື ໂດຍການຈັບບາຍຂົນນົກຫຼືເຍື່ອຜິວໜັງຂອງນົກທີ່ມີເຊື້ອ. ບໍ່ໄດ້ມີການຢືນຢັນວ່າໂຮກ psittacosis ແຜ່ຜ່າຍຈາກຄົນຫາຄົນ.
- ນົກທຸກຕົວອ່ອນໄຫວຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ, ແຕ່ວ່ານົກລ້ຽງ (ຕົວຢ່າງ ນົກແກ້ວ, ນົກແກ້ວຫາງຍາວ ແລະນົກແກ້ວຂາວ); ແລະສັດປີກ (ໄກ່ງວງແລະເປັດ) ແມ່ນເປັນສາເຫດໃນການຖ່າຍທອດເຊື້ອໃຫ້ແກ່ຄົນເລື້ອຍທີ່ສຸດ.
- ຄົນທີ່ສ່ຽງທີ່ສຸດຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໂຮກ psittacosis ແມ່ນຜູ້ທີ່ໃກ້ຊິດກັບນົກຍ້ອນວຽກ ຫຼື ງານອະດີເຣກ. ຕົວຢ່າງ: ເຈົ້າຂອງນົກ, ພະນັກງານຮ້ານຂາຍສັດລ້ຽງ, ສັດວະແພດ, ຫຼືຄົນທີ່ຜລິດສັດປີກຕ່າງໆ.

ອາການຂອງ Psittacosis ມີຫຍັງແດ່?

- ລະຍະເວລາທີ່ຄົນເລີ່ມຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣັຍແລະຕອນເລີ່ມອອກອາການຈະຢູ່ໃນລະຫວ່າງ ສິ່ງຫາ 15 ມື້.
- ຄົນທີ່ມີເຊື້ອ psittacosis ສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີອາການຄ້າຍໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ຊຶ່ງໃນທັນທີຈະຄົງຮ້ອນ, ໜາວສັ່ນ, ເຈັບຫົວ, ອ່ອນເພັຍ ແລະ ປວດຕາມກ້າມເນື້ອ. ຄົນເຈັບອາດຈະມີອາການໄອແຫ້ງນໍ້າ, ເຈັບເອິກ ແລະ ຫາຍໃຈບໍ່ອອກ. ໃນກໍລະນີນີ້ເປັນແຮງ, ຈະເປັນໂຮກປອດບວມດ້ວຍ.


ຈະກວດຫາເຊື້ອ Psittacosis ໄດ້ຢ່າງໃດແລະປິ່ນປົວວິທີໃດ?

- ຖ້າທ່ານໝໍຄິດວ່າຄົນຜູ້ນຶ່ງເປັນໂຮກ psittacosis, ເພິ່ນຈະເອົາເລືອດໄປກວດເພື່ອຢັ້ງຢືນການວິນິດສັຍໂຮກ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການເອົາສເຣຍໜ້າເອົາຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີປອດບວມ.
- ການປົວ ໂຮກ psittacosis ແມ່ນໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ. ຢານີ້ຕ້ອງກິນຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາສອງອາທິດ.
- ເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງພາຍາມໃຫ້ຮູ້ວ່າການຕິດເຊື້ອເກີດມາຈາກໃສ. ຄວນບອກໃຫ້ຄົນອື່ນໆທີ່ອາດໄດ້ໃກ້ຊິດກັບນົກທີ່ມີເຊື້ອ ຮູ້ເຖິງອາການຂອງເຊື້ອໂຮກ. ຕ້ອງໄດ້ປິ່ນປົວນົກທີ່ມີເຊື້ອແລະສິ່ງແວດລ້ອມຂອງມັນກໍຕ້ອງໄດ້ທຳຄວາມສະອາດດ້ວຍຢາຂ້າເຊື້ອໂຮກເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການແຜ່ຜາຍໄປເຖິງຄົນອື່ນໆຫຼືນົກຕົວອື່ນໆ.

ເຮັດຢ່າງໃດຂ້ອຍຈຶ່ງຈະຮູ້ວ່ານົກຕິດເຊື້ອແລ້ວ?

- ໃນກໍລະນີຂອງນົກ, ອາການຂອງການຕິດເຊື້ອອາດຈະແມ່ນຕັ້ງແຕ່ບໍ່ສໍາການຫຍັງທັງໝົດຈົນໄປເຖິງຂັ້ນຕາຍ. ນົກທີ່ເຈັບອາດມີອາການຕ່າງໆເຊັ່ນ ຖ່າຍທ້ອງ, ອ່ອນເພັຍ, ຂົນຂັນ, ບໍ່ກິນອາຫານ ແລະ ນ້ຳຕາແລະຂີ້ມູກໄຫຼ. ຖ້າສົງສັຍ, ຄວນເອົານົກໄປໃຫ້ສັດວະແພດກວດເບິ່ງ. ນົກທີ່ຕິດເຊື້ອຕ້ອງໄດ້ແຍກໄວ້ຕ່າງຫາກ, ໃຫ້ປົວດ້ວຍຢາຕ້ານເຊື້ອ ແລະ ທຳການຂ້າເຊື້ອທີ່ກົງຂອງມັນ.
- ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນການຍາກທີ່ຈະບອກໄດ້ວ່ານົກຕິດເຊື້ອຫຼືບໍ່, ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັກສາຄວາມສະອາດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ຮວມທັງການລ້າງມື ເມື່ອຈັບບາຍນົກລ້ຽງ. ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນຈາກການຈູບນົກລ້ຽງ (ຈາກປາກຄົນຫາປາກນົກ).
- ຄວນຈະຂັງນົກໄວ້ໃນກົງອັນກວ້າງຂວາງ ທີ່ສະອາດ ຊຶ່ງບູດ້ວຍໜັງສືພິມ ແລະ ປຸງເລື້ອຍໆ. ບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ຂີ້ນົກກອງກັນຂຶ້ນ, ບໍ່ໃຫ້ຂີ້ມັນແຫ້ງ ເພາະຜຸ່ນຂີ້ແຫ້ງຂອງມັນຈະປົວໄປໃນອາກາດ. ໃຫ້ເຮັດໃຫ້ຂີ້ນົກແລະຄອກນົກຊຸ່ມເສັຍກ່ອນ ຈຶ່ງທຳຄວາມສະອາດ.
- ຄວນຈະຂີ້ນົກຈາກຮ້ານຂາຍສັດຫຼືສະຖານທີ່ລ້ຽງນົກທີ່ມີໃບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ.

ຮາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ - ຜແນກສາທາຣະນະສຸກແຫ່ງຣັດ NSW



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au