

Bệnh sốt của loài chim

Psittacosis

Bệnh sốt Psittacosis là gì?

- Bệnh sốt Psittacosis là một chứng bệnh ít khi xảy ra, thường là do chim truyền sang cho người. Chứng sốt này do vi trùng Chlamydia psittaci gây ra.

Bệnh lan truyền cách nào?

- Thông thường bệnh xảy ra khi một người hít phải vi trùng từ phân đã khô của một con chim bị bệnh. Người ta cũng có thể bị nhiễm bệnh khi hôn mỏ chim hoặc khi vuốt ve lông hoặc đụng chạm vào da hay phân của một con chim đang có bệnh. Chưa có bằng chứng nào cho thấy bệnh này có thể truyền từ người này sang người khác cả.
- Mọi giống chim đều có thể mắc chứng sốt Psittacosis, nhưng những giống chim nuôi trong nhà (thí dụ như các loài két, nhòng); và gia cầm (gà, vịt) thường dễ truyền bệnh sang con người nhất.
- Đa số những người dễ bị bệnh sốt psittacosis là những người thường gần gũi với các giống chim trong công việc hoặc qua việc nuôi chơi ở nhà, thí dụ: những người nuôi chim kiểng, nhân viên làm việc tại những nơi bán gia súc, bác sĩ thú y, hoặc những người làm việc tại các trại chăn nuôi gà, vịt.

Triệu chứng

- Thời gian từ lúc cơ thể bị nhiễm trùng cho đến khi triệu chứng xuất hiện thay đổi trong khoảng từ 4-15 ngày.
- Những người bị chứng sốt psittacosis thường có triệu chứng như bị cúm, lên cơn sốt đột ngột, ớn lạnh, nhức đầu, mệt mỏi, cơ thể yếu ớt, đau nhức bắp thịt. Người bệnh cũng có thể bị ho khan, tức ngực và thấy khó thở (thở không ra hơi). Trường hợp bị nặng có thể chuyển sang viêm phổi.

Phương pháp chẩn bệnh và chữa trị


- Nếu nghi ngờ bệnh nhân bị chứng sốt psittacosis, bác sĩ có thể cho thử máu để xác định bệnh trạng. Chụp quang tuyến X sẽ biết được bệnh nhân có bị viêm phổi không.
- Bệnh sốt psittacosis có thể trị bằng thuốc kháng sinh (antibiotics). Bệnh nhân cần phải uống thuốc hai tuần.
- Điều quan trọng là cần tìm xem bệnh phát xuất từ đâu. Những người khác có thể đã bị nhiễm trùng do chim truyền sang rồi và cần được thông báo về bệnh trạng và triệu chứng của bệnh. Con vật bị bệnh cần được chữa trị và chở nuôi chim cần được tẩy rửa bằng thuốc sát trùng để tránh cho bệnh truyền sang người khác hoặc những loài gia cầm khác.

Làm sao biết được con vật đã bị bệnh

- Ở loài chim hay gà, vịt, các triệu chứng bị nhiễm bệnh có thể là không có triệu chứng gì hoặc con vật bị chết. Con vật bị bệnh có thể có các triệu chứng như tiêu chảy, yếu ớt, lông xù, không ăn uống gì, bị xổ mũi hoặc chảy nước mắt. Nếu thấy nghi ngờ, quý vị nên đưa con vật đến bác sĩ thú y nhờ khám. Con chim bị bệnh cần được tách riêng, trị bằng thuốc kháng sinh, và lồng cần được tẩy rửa bằng thuốc sát trùng.
- Vì khó biết được chim có bị bệnh hay không, quý vị cần giữ vệ sinh tối đa, kề cả việc rửa tay sau khi cho chim ăn, hay đụng vào người chúng. Tránh dùng kẽ miệng sát vào mỏ chim.

- Chim cần được nhốt trong lồng sạch sẽ, rộng rãi, dưới đáy lồng có lót giấy báo để dễ thay thường xuyên. Không nên để cho phân của chúng chất thành đống, khô và dễ biến thành bụi. Trước khi dọn phân chim hay tẩy rửa lồng, nên tưới nước trước để tránh phải hít vào các bụi phân khô.
- Chỉ nên mua chim ở những tiệm bán gia súc (pet store) có giấy phép hành nghề.

Muốn biết thêm thông tin - Ban Y Tế Công Cộng Tiểu Bang NSW



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au