

ជំងឺឆ្កែឆ្កួត និង ជំងឺបង្កដោយលីសស្វិរីស (Bat Lyssavirus) ដែលយាយីសត្វប្រដៀវ

Rabies and Bat Lyssavirus Infection

តើ Lyssavirus ជាអ្វី?

Lyssavirus គឺជាប្រភេទវីរុសមួយក្រុមដែលក្នុងនោះមានមេរោគជំងឺឆ្កែឆ្កួត និងលីសស្វិរីសដែលយាយីសត្វប្រដៀវ (bat lyssavirus) ។ ជំងឺឆ្កែឆ្កួត គឺជាជំងឺមួយដែលបណ្តាលឱ្យមនុស្សស្លាប់ (សត្វចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះ) ដែលខាំនិងខ្លាំ។ នៅក្នុងខណៈពេលដែលជំងឺនេះកើតមាននៅទីកន្លែងជាច្រើនលើពិភពលោកនេះ ជំងឺនេះមិនកើតមានក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះទេ។ ការឆ្លងមេរោគជំងឺឆ្កែឆ្កួត អាចធ្វើឱ្យថ្លង់និកសត្វដែលឆ្លងមេរោគនេះទៅជាឈឺនិងងាប់បាន ហើយចំពោះមនុស្សវិញ កាលណាឆ្លងមេរោគនេះហើយ ច្រើនតែស្លាប់។

Bat lyssavirus ជាវីរុសមួយប្រភេទដែលជាប់សន្តានទៅនឹងមេរោគឆ្កែឆ្កួត ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈខុសពីមេរោគនេះ។ នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី មេរោគនេះមាននៅក្នុងខ្លួនសត្វប្រដៀវ។ មេរោគនេះកំរិតមកមនុស្សលោកណាស់ ។ ការឆ្លងមកមនុស្សនៃមេរោគ bat lyssavirus មានតែ ២ ករណីប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវគេកត់ត្រាទុកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ហើយអ្នកទាំងពីររស់នៅក្នុងរដ្ឋ Queensland នៅពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ ។ ពួកគេបានស្លាប់ទាំង២នាក់។

តើជំងឺនេះមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ?

គេគិតថា ជំងឺឆ្កែឆ្កួត និង bat lyssavirus បង្កឱ្យមានរោគសញ្ញាប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ រោគសញ្ញាទាំងនេះរួមមាន ឈឺក្បាល, គ្រុនក្តៅ, អស់កំលាំងល្អិតល្អៃ, ចំលាស់ប្តូរផ្នែកសរសៃប្រសាទនៅជុំវិញកន្លែងខាំឬខ្លាំនោះ, ភាពរំជើបរំជួលអារម្មណ៍, មិនចូលចិត្តខ្យល់អាកាសប្តូរទឹក, ខ្សោយកំលាំង, រងឺរវាយ, ប្រកាច់ និង សន្លប់។ ការស្លាប់ច្រើនកើតមានប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីការចាប់ផ្តើមលេចចេញរោគសញ្ញា។

តើជំងឺទាំងនេះឆ្លងយ៉ាងដូចម្តេច?

ការចំលងមេរោគជំងឺឆ្កែឆ្កួត និង bat lyssavirus ពីថ្លង់និកសត្វដែលមានរោគ ទៅមនុស្ស ឬទៅថ្លង់និកសត្វដទៃទៀតកើតឡើងតាមរយៈការខាំ ឬ ការខ្លាំ។ ការខាំឬខ្លាំ អាចចាក់បញ្ចូលមេរោគដែលមាននៅក្នុងទឹកមាត់របស់សត្វទៅក្នុងរាងកាយមនុស្សដែលសត្វនោះខាំ ឬ ខ្លាំ។

នៅឯប្រទេស ថ្លង់និកសត្វដែលមានផ្ទុកមេរោគនៃជំងឺឆ្កែឆ្កួត រួមមានប្រដៀវ, ឆ្កែ, ឆ្កា, raccoons, skunks, ស្វា និងថ្លង់និកសត្វដទៃទៀត ដែលអាចខាំនិងខ្លាំ។ ថ្លង់និកសត្វអូស្ត្រាលីមិនមានផ្ទុកមេរោគជំងឺឆ្កែឆ្កួតទេ។ នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមានតែសត្វប្រដៀវទេ ទាំងពួកប្រដៀវហើរធំៗ (ឬប្រដៀវស៊ីផ្លែឈើ) និងពួកប្រដៀវស៊ីសត្វល្អិត (មានមាឌតូចជាង) ប៉ុណ្ណោះដែលគេបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគ bat lyssavirus ។

តើនរណាប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងគេ?

ចំពោះមេរោគជំងឺឆ្កែឆ្កួត បុគ្គលមកពីបរទេសដែលមានការប៉ះពាល់ជាមួយថនិកសត្វព្រៃ ដែលចេះខាំ និងខ្ចាំ និងពពួកថនិកសត្វស្រុកដែលមិនទាន់បានទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការមេរោគជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅឡើយ សុទ្ធសឹងជាបុគ្គលប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគនេះ។ មេរោគជំងឺឆ្កែឆ្កួតបានឆ្លងទៅប្រជាជនជាច្រើននៅឯបរទេស ហើយក៏បានឆ្លងទៅជនជាតិអូស្ត្រាលីខ្លះដែលធ្វើដំណើរទៅរស់នៅបរទេសដែរ។

តំបន់មិនមានមេរោគជំងឺឆ្កែឆ្កួត ក្នុងឆ្នាំ២០០០ រួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលី នូវែលហ្សេឡង់ ហ្វីលីពីន ជប៉ុន ហាវៃ តៃវ៉ាន់ អូស៊ីណេម៉ា (Oceania) ផ្នែកខ្លះនៃទ្វីបអឺរ៉ុប ផ្នែកខ្លះនៃប្រជុំកោះការ៉ាអ៊ីប (West Indies) និងកោះនានានៅមហាសមុទ្រអត្លង់ទិក ។

នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី មនុស្សទាំងឡាយដែលប៉ះពាល់ប្រយៀងប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគ bat lyssavirus។

តើគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលជំងឺនេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអាចមានការលំបាកហើយការបញ្ជាក់រោគវិនិច្ឆ័យនេះ តម្រូវឲ្យមានការធ្វើតេស្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ ដើម្បីរកវត្តមាននៃមេរោគនេះ នៅក្នុងស្បែក, ឈាម, ទឹកខ្លួនឆ្អឹងខ្លង និងជាលិកាសរសៃប្រសាទប្រជាលិកាដទៃទៀត។ នៅពេលជម្ងឺនេះចាប់កើតយាបហើយនោះ គេពុំមានការព្យាបាលជម្ងឺនេះទេ។

តើគេអាចបង្ការជម្ងឺនេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ប្រសិនបើវាមិនមែនជាការងារអ្នកទេ ហើយអ្នកមិនបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល និង ប្រើឧបករណ៍ការពារព្រៃបានសមស្របទេនោះ ចូរកុំប៉ុនប៉ងប៉ះប្រទាក់ថនិកសត្វព្រៃឲ្យសោះ។ ជំងឺបង្កដោយ Bat lyssavirus និងជំងឺឆ្កែឆ្កួតគ្រាន់តែជាជំងឺ ២ ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមជំងឺជាច្រើនដែលសត្វអាចចំលងមកមនុស្សបាន។

ការលាងសំអាតរបួសបង្កដោយសត្វព្រៃបានស្អាតល្អ និងការលាបទឹកថ្នាំស្ងួតស្រទាប់ប្រឆាំងមេរោគ ដូចជា povidone-iodine ជាដើមនឹងជួយបង្ការពីការឆ្លងរោគ។

វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគជំងឺឆ្កែឆ្កួត អាចជួយបង្ការការចម្លងទាំងមេរោគជំងឺឆ្កែឆ្កួត ផងនិង bat lyssavirus ផង។ បុគ្គលទាំងឡាយដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយសត្វព្រៃនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ឧទាហរណ៍ អ្នកថែប្រយៀង, ភ្នាក់ងារការពារសត្វព្រៃ និងបសុពេទ្យប្រមូលដែលធ្វើដំណើរទៅបរទេសដែលមានគំរោងប៉ះថនិកសត្វចេះខាំ និងខ្ចាំដែលមិនទាន់បានទទួលវ៉ាក់សាំងនោះ គួរឲ្យគ្រូពេទ្យប្រចាំតំបន់របស់ខ្លួនចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់ចំនួនកំរិត។ គេនឹងគិតប្រាក់ចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ។

បើទោះជាអ្នកមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពីមុនមកក៏ដោយ ក៏ការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់ចំនួនកំរិត ប្រឆាំងមេរោគជំងឺឆ្កែឆ្កួត ក្រោយពេលមានការប៉ះពាល់ រួមជាមួយការចាក់វ៉ាក់សាំងម្តងទៀតហៅថា rabies immunoglobulin អាចការពារអ្នកពីការឆ្លងរោគបាន ប្រសិនបើគេចាក់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការខាំឬការខ្ចាំនោះ។


- ប្រសិនបើអ្នកត្រូវប្រយៀង ឬថនិកសត្វព្រៃណាមួយនៅអូស្ត្រាលី (ឬដោយសត្វមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងដទៃទៀត) ខាំឬខ្ចាំ នៅឯបរទេស:

- ចូរលាងសំអាតរបួសនោះជាមួយសាប៊ូនិងទឹកភ្លាមៗឲ្យបានស្អាត
- លាបទឹកថ្នាំស្ងួតប្រឆាំងមេរោគ
- ទៅឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យភ្លាមៗតាមដែលអាចធ្វើបាន ដើម្បីថែរក្សារបួសនោះនិងដើម្បីឲ្យដឹងថា តើខ្លួនប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគឬទេ

ប្រសិនបើអ្នកប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគ អ្នកនឹងចាំបាច់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្កែឆ្កួត និង rabies immunoglobulin ឲ្យបានគ្រប់ចំនួនកំរិត។ នៅក្នុងរដ្ឋ NSW មានការផ្តល់ជូនវ៉ាក់សាំងបង្ការក្រោយពេលមានការប៉ះពាល់ ដោយឥតគិតថ្លៃ សំរាប់វេជ្ជបណ្ឌិតតាមរយៈអង្គការសុខភាពសាធារណៈនានា។

ក្រោយពីការខាំឬខ្លាំ ដោយថនិកសត្វមានជម្ងឺរួមមក អ្នកនឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងការពារម្តងទៀត បើទោះជាពីមុនមកអ្នក ធ្លាប់បានចាក់ម្តងហើយក្តី។ យ៉ាងណាមិញ អ្នកត្រូវការត្រឹមតែវ៉ាក់សាំងបន្ថែមម្តងទៀតប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកបានប្រទះឃើញប្រដៀវដែលមានរបួស ឬ មានជំងឺស្នប់កុំចាប់ឬកាន់វាឲ្យសោះ ប៉ុន្តែត្រូវទូរស័ព្ទហៅសេវាសង្គ្រោះសត្វព្រៃក្នុងតំបន់របស់អ្នក។

ព័ត៌មានបន្ថែម - ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ (Public Health) នៅក្នុងរដ្ឋ NSW



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au