

ການຕິດເຊື້ອວີ້ ແລະ Lyssavirus ຈາກເຈ້ຍ Rabies and Bat Lyssavirus Infection

Lyssavirus ແມ່ນຫຍັງ?

Lyssaviruses ແມ່ນເຊື້ອໄວຣັສກຸ່ມນຶ່ງຊຶ່ງຮວມມີເຊື້ອວີ້ແລະ lyssavirus ຈາກເຈ້ຍ. ໂຮກວີ້ແມ່ນການຕິດເຊື້ອໃນກຸ່ມຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ກັດແລະຄູດ. ໃນຂນະທີ່ໂຮກນີ້ມີຢູ່ຕາມຫຼາຍໆພາກສ່ວນຂອງໂລກ, ແຕ່ໂຮກນີ້ບໍ່ມີຢູ່ໃນອອສເຕຣເລັຍ. ການຕິດເຊື້ອວີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ສັດເຈັບແລະຕາຍໄດ້, ແລະສ່ວນຫຼາຍເມື່ອຄົນຕິດເຊື້ອນີ້ ກໍຕາຍເຊັ່ນກັນ.

Lyssaviruses ຈາກເຈ້ຍແມ່ນເຊື້ອໄວຣັສຊື່ນຶ່ງຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັນ, ແຕ່ວ່າແຕກຕ່າງກັນກັບເຊື້ອວີ້. ໃນອອສເຕຣເລັຍ ເຊື້ອໄວຣັສນີ້ຈະມີຢູ່ໃນໂຕຂອງເຈ້ຍ. ນ້ອຍນັກນ້ອຍໜ້າທີ່ມັນຈະຕິດຄົນ. ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ ມີລາຍງານແຕ່ພຽງສອງກໍຣະນີຂອງຄົນຕິດເຊື້ອ lyssavirus ຈາກເຈ້ຍໃນອອສເຕຣເລັຍ, ແລະທັງສອງກໍຣະນີແມ່ນເກີດຂຶ້ນທີ່ Queensland ໃນກາງປີ 1990. ທັງສອງຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເສັຍຊີວິດ.

ອາການມີຫຍັງແດ່?

ເປັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ໂຮກວີ້ແລະ lyssavirus ຈາກເຈ້ຍ ມີອາການຄ້າຍຄຽງກັນ. ອາການດັ່ງກ່າວຮວມມີເຊັ່ນ ເຈັບຫົວ, ຄີງຮ້ອນ, ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ, ປະສາດຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ຮິເວນຖືກກັດຫຼືຄູດມີການປ່ຽນແປງ, ກະວິນກະວາຍ, ລັງກຽດອາກາດສົດແລະນ້ຳ, ອ່ອນເພັຍ, ເພີ້ຄຸ້ມຄັງ, ຊັກ, ແລະໝົດສະຕິ. ສ່ວນຫຼາຍຈະເສັຍຊີວິດຫຼາຍມື້ຕໍ່ມາຫຼັງຈາກອາການເລີ່ມອອກ.

ໂຮກນີ້ແຜ່ຜາຍຢ່າງໃດ?

ທັງໂຮກວີ້ແລະ lyssavirus ຈາກເຈ້ຍແຜ່ຜາຍຈາກສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ຕິດເຊື້ອ ໄປຫາຄົນຫຼືສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມຕົວອື່ນໆ ໂດຍຜ່ານຮອຍກັດແລະຄູດ. ການກັດແລະຄູດ ສາມາດສິດເຊື້ອໄວຣັສ - ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນນ້ຳລາຍສັດ - ເຂົ້າໄປສູ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນທີ່ຖືກກັດ.

ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ຖືເຊື້ອໂຮກວີ້ໃນໂຕມີ: ເຈ້ຍ, ໝາ, ແມວ, ຮັກກູນ, ສະກັງ, ລີງ, ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມຊື່ນອື່ນໆທີ່ສາມາດກັດແລະຄູດໄດ້. ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມຢູ່ໃນອອສເຕຣເລັຍບໍ່ຖືເຊື້ອນີ້ຢູ່ໃນໂຕ. ໃນອອສເຕຣເລັຍ, ມີແຕ່ເຈ້ຍເທົ່ານັ້ນ - ທັງສອງຊື່ນຄືຊື່ນໂຕໃຫຍ່ flying foxes (ຫຼື fruit bats) ແລະຊື່ນໂຕນ້ອຍກວ່າ insectivorous (ຫຼື micro) bats - ທີ່ພົບວ່າຖືເຊື້ອ bat lyssavirus.

ແມ່ນໃຜແດ່ມີເປີເຊັນສ່ຽງສູງ?

ສຳລັບໂຮກວໍ, ຄົນຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ໄກ້ຊິດກັບສັດປ່າທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ກັດແລະຄູດໄດ້ - ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ລ້ຽງຢູ່ຕາມບ້ານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນວໍ - ຄົນເຫຼົ່ານີ້ມີເປີເຊັນສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອສູງຂຶ້ນ. ຄົນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ຕ່າງປະເທດຫຼາຍຄົນໄດ້ຕິດເຊື້ອພຍາດວໍນີ້, ແລະຄົນອອສເຕຣລຽນບາງຄົນທີ່ເດີນທາງຫຼືໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດກໍໄດ້ຕິດເຊື້ອພຍາດນີ້ເຊັ່ນກັນ.

ເຂດປອດໂຮກວໍ ໃນປີ 2000 ມີ ປະເທດອອສເຕຣເລັຍ, ນິວຊີແລນ, ນິວກີເນັຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ຮາວາຍ, ໄຕ໌ຫວັນ, ໂອຊີອານີ, ບາງພາກສ່ວນຂອງຢູໂຣບ, ບາງພາກສ່ວນຂອງແວສອິນດີຍ໌, ແລະເກາະຕ່າງໆໃນເຂດມະຫາສມຸດແອັດແລນຕິກ.

ຢູ່ໃນອອສເຕຣເລັຍ, ຜູ້ທີ່ຈັບຕ້ອງເຈ້ຍແມ່ນມີເປີເຊັນສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ bat lyssavirus.

ຈະກວດຫາເຊື້ອໄດ້ຢ່າງໃດແລະຈະປິ່ນປົວວິທີໃດ?

ການກວດຫາເຊື້ອນັ້ນຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ, ແລະການຍັ້ງຢືນຕ້ອງໄດ້ກວດຫາເຊື້ອຢູ່ຫ້ອງທົດລອງເພື່ອຫາເຊື້ອໄວຣັສຢູ່ຜິວໜັງ, ໃນເລືອດ, ໄຂສັນຫຼັງ, ແລະ ເຍື່ອເສັ້ນປະສາດ ຫຼື ເນື້ອເຍື່ອບ່ອນອື່ນໆ. ເມື່ອພຍາດເລີ້ມເປັນແລ້ວ ບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້.

ຈະປ້ອງກັນໄດ້ຢ່າງໃດ?

ນອກເສັຍຈາກວ່າເປັນວຽກການຂອງທ່ານ, ແລະທ່ານໄດ້ຮັບການຝຶກຝົນມາແລະໃຊ້ເຄື່ອງມືປ້ອງກັນອັນເໝາະສົມ, ຢ່າພຍາຍາມຈັບບາຍສັດປ່າທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ. ເຊື້ອໂຮກ Bat lyssavirus ແລະພຍາດວໍນີ້ເປັນພຽງເຊື້ອພຍາດສອງຊະນິດໃນຫຼາຍໆຊະນິດຊຶ່ງສັດສາມາດຖ່າຍທອດເຖິງຄົນໄດ້.

ການລ້າງແຜທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນສັດ, ແລະລ້າງດ້ວຍນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອເຊັ່ນ povidone-iodine ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄດ້.

ຢາປ້ອງກັນໂຮກວໍສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄດ້ທັງພຍາດວໍ ແລະ bat lyssavirus. ຄົນທີ່ຈັບບາຍສັດ ຫຼື ໄດ້ຕ້ອງຂູນເຈ້ຍຢູ່ໃນອອສເຕຣເລັຍ - ຕົວຢ່າງ ຄົນດູແລເຈ້ຍ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ດູແລຊີວິດສັດປ່າ ແລະສັດວະແພດ; ຫຼືຄົນທີ່ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດທີ່ມີແຜນວ່າຈະໄດ້ຈັບບາຍສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ສາມາດກັດແລະຄູດ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກສັກຢາກັນພຍາດ - ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຄວນໄປຮັບການສັກຢາກັນໂຮກ ຈາກໝໍໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນເມື່ອສັກຢານີ້.


ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ສັກຢາກັນມາກ່ອນໜ້ານີ້, ການສັກຢາກັນວໍຫຼັງຈາກຖືກສັດກັດແລ້ວ, ຮວມທັງ ສັກຢາຊະນິດນຶ່ງອີກຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ rabies immunoglobulin ກໍຍັງຈະສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄດ້ຖ້າຫາກວ່າສັກທັນ ຫຼັງຈາກຖືກກັດຫຼືຄູດ.

- ຖ້າທ່ານຖືກເຈ້ຍກັດຫຼືຄູ່ຢູ່ໃນອອສເຕຣເລັຍ, ຫຼືຖືກກັດຈາກສັດປ່າທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ (ຫຼືສັດທຸກໆຢ່າງທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນ) ທີ່ຕ່າງປະເທດ:
- ໃຫ້ລ້າງແຜດ້ວຍສະບູແລະນ້ຳທັນທີທັນໃດ
- ໃຫ້ເຊັດດ້ວຍນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ
- ໃຫ້ໄປຫາໝໍເພື່ອໃຫ້ເພິ່ນດູແລບາດແຜໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ແລະໃຫ້ເພິ່ນລົງຄວາມເຫັນວ່າທ່ານອາດຈະສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອຫຼືບໍ່.

ຖ້າທ່ານສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ, ທ່ານກໍຕ້ອງໄດ້ໄປສັກຢາຊຸດກັນພຍາດວັດແລະຢາ rabies immunoglobulin. ໃນຮັດ NSW, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນໂຣກຫຼັງຖືກກັດ ໄດ້ພຣິຈາກທ່ານໝໍໂດຍຜ່ານຜແນກອະນາມັຍສາທາຣະນະ.

ຫຼັງຈາກຖືກກັດຫຼືຄູ່ຈາກສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ມີເຊື້ອ ທ່ານຍັງຕ້ອງໄດ້ສັກຢາກັນໂຣກຕື່ມອີກ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານໄດ້ສັກມາກ່ອນແລ້ວກໍຕາມ. ຢ່າງໃດກໍດີ, ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງສັກເພີ່ມເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າທ່ານເຫັນເຈ້ຍບາດເຈັບຫຼືມີອາການຫງ່ວມເຫງົາ, ຢ່າພຍາຍາມໄປຈັບຕ້ອງໂດຍຕົວທ່ານເອງ, ແຕ່ໃຫ້ເອິ້ນໜ່ວຍກູ້ພັຍຊີວິດສັດປ່າໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ.

ຮາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ - ຜແນກສາທາຣະນະສຸກແຫ່ງຮັດ NSW



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au