

## ໂຮກໄຂ້ ຮອສຣີເວີ (Ross River) Ross River Fever

### ເຊື້ອໄວຣັສ ຮອສຣີເວີແມ່ນຫຍັງ?

- ເຊື້ອໄວຣັສ ຮອສຣີເວີ ແມ່ນພຍາດຊນິດນຶ່ງຊຶ່ງແພ່ໄປຫາຄົນ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດ ຊົນນະບົດ, ບາງເທື່ອກໍມີອາການຄ້າຍໄຂ້ຫວັດແລະເຈັບຕາມ.
- ເຊື້ອໄວຣັສ ຮອສຣີເວີ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຖິງຕາຍ.

### ເຊື້ອໄວຣັສ ຮອສຣີເວີແຜ່ຜ່າຍໄດ້ຢ່າງໃດ?

- ເຊື້ອໄວຣັສຊນິດນີ້ແຜ່ຜ່າຍໂດຍຜ່ານຍູງໂຕແມ່ບາງແນວ.
- ຍູງໂຕແມ່ຈະດູດກິນເລືອດສັດແລະຄົນ. ຖ້າມັນດູດກິນເລືອດສັດທີ່ຕິດເຊື້ອຢູ່ແລ້ວ, ຍູງໂຕນັ້ນກໍອາດຕິດເຊື້ອໄປນຳ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຊື້ອໄວຣັສກໍຈະຂຍາຍຕົວຂຶ້ນພາຍໃນຕົວ ຍູງແລະແພ່ເຊື້ອໄປຫາສັດໂຕຕໍ່ໄປຫຼືຄົນຕໍ່ໄປທີ່ມັນດູດເລືອດ.
- ການແພ່ເຊື້ອມັກຈະເກີດຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງຍາມຮ້ອນແລະຍາມຣະດູໃບໄມ້ປົ່ງ.
- ເຊື້ອໄວຣັສນີ້ຈະບໍ່ແພ່ໂດຍຕົງຈາກຄົນນຶ່ງໄປຫາອີກຄົນນຶ່ງ.

### ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ຮອສຣີເວີ ຈະມີອາການຢ່າງໃດແດ່?

- ມີຫຼາຍໆຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອນີ້ແລ້ວແຕ່ບໍ່ມີອາການຫຍັງເລີຍ.
- ບາງຄົນຈະມີອາການຄ້າຍໄຂ້ຫວັດ ຊຶ່ງຮວມອາການຕ່າງໆເຊັ່ນ ຖີ່ຄົງໄຂ້, ໜາວສັ່ນ, ເຈັບຫົວແລະ ເຈັບຕາມກ້າມເນື້ອແລະຕາມຂໍ້.
- ຂໍ້ບາງແຫ່ງກໍຈະໃຄ່, ແລະອາດສັງເກດເຫັນໄດ້ຊັດວ່າມີອາການແຂງຕາມຂໍ້ໃນຍາມເຊົ້າ.
- ບາງເທື່ອກໍອາດເກີດເປັນຕຸ່ມຜິ່ນແດງຕາມຮ່າງກາຍ, ແຂນຫຼືຂາ. ຕຸ່ມນີ້ຕາມປົກກະຕິຈະຫາຍໄປຫຼັງຈາກເຈັດຫາສິບວັນ.
- ໃນລະຫວ່າງທີ່ເປັນພຍາດຢູ່ນັ້ນ ບາງຄັ້ງ ອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໂດຍທົ່ວໆໄປ, ພ້ອມທັງ ຮູ້ສຶກເມື່ອຍຫຼືອ່ອນເພັຍ. ອາການເຫຼົ່ານີ້ອາດເຮັດໃຫ້ມີຜົນສະທ້ອນ ຕໍ່ ປະສິດທິພາບ ໃນການເຮັດວຽກ.

### ດົນປານໃດຈຶ່ງອອກອາການຫຼັງຈາກຖືກຍູງທີ່ມີເຊື້ອກັດ?

- ຕາມປົກກະຕິຈະອອກອາການໃນລະຫວ່າງເຈັດຫາເກົ້າວັນຫຼັງຈາກຖືກກັດຈາກຍູງທີ່ມີເຊື້ອ

ຊ່ວງລະຍະເວລາດັ່ງກ່າວອາດປ່ຽນແປງແຕ່ໂດຍທົ່ວໆແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງຫ້າຫາ 21 ມື້.

### ຈະເປັນພຍາດນີ້ດົນປານໃດ?

- ມີຫຼາຍຄົນຈະເຊົາຫາຍຂາດຫຼັງພາຍໃນສອງສາມອາທິດ. ຄົນອື່ນໆອາດມີອາການຢູ່ເກີນສາມເດືອນ, ແລະມີກໍລະນີນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຄົນເປັນພຍາດນີ້ຈະມີອາການຢູ່ເກີນກວ່ານຶ່ງປີ.
- ອາການຕ່າງໆອາດຈະເຊົາໄປແລະເກີດຂຶ້ນໃໝ່ອີກໃນຊ່ວງລະຍະເວລາດັ່ງກ່າວ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ອາການຈະເປັນຄ່ອຍລົງໃນແຕ່ລະເທື່ອທີ່ອາການນັ້ນກັບຄືນມາ.
- ຄົນທີ່ເປັນພຍາດນີ້ສາມາດເຊົາຫາຍຂາດໄດ້.

### ການປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອໄວຣັສຣອສຣີເວີມີແບບໃດແດ່?


- ບໍ່ມີການປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອໄວຣັສຣອສຣີເວີແບບໃດແບບນຶ່ງສະເພາະ.
- ທ່ານໝໍຂອງທ່ານຈະສາມາດແນະນຳໃຫ້ທ່ານກິນຢາ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍຜ່ອນເບົາອາການບໍ່ສະບາຍ ໃນຕົວໄດ້.
- ການພັກຜ່ອນໃຫ້ເຕັມປຽມ, ພ້ອມທັງອອກແຮງກາຍປານກາງ ແລະ ກິນອາຫານໃຫ້ຖືກຫຼັກ ອະນາມັຍ, ອາດຊ່ວຍໃຫ້ເຊົາຈາກພຍາດໄດ້.

### ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ຢ່າງໃດວ່າຂ້ອຍຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ຣອສຣີເວີ ແລ້ວ?

- ຖ້າທ່ານມີອາການ, ໃຫ້ໄປຫາທ່ານໝໍ, ເພິ່ນສາມາດສັ່ງໃຫ້ກວດເລືອດເພື່ອກວດເບິ່ງອາການຕິດເຊື້ອຣອສຣີເວີ.

### ຈະປ້ອງກັນພຍາດຣອສຣີເວີໄດ້ຫຼືບໍ່?

- ປ້ອງກັນໄດ້! ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນຈາກການຖືກຢູງກັດ, ໂດຍສະເພາະໃນລະຫວ່າງ ຣະດູຮ້ອນ ແລະຣະດູ ໃບໄມ້ຫຼິ້ນ ຊຶ່ງເປັນຍາມທີ່ການແພ່ເຊື້ອເກີດຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ.
- ຢູງຊນິດຕ່າງໆກັນຈະກັດເວລາຕ່າງກັນ. ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນຈາກການຢູ່ຂ້າງນອກໃນເວລາຄ້ອຍບ່າຍແລະຍາມເລີ້ມຄ່ຳ. ຢູງສ່ວນຫຼາຍຈະອອກຫາກິນລະຫວ່າງນຶ່ງຫາສາມຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກດິນແລະອີກເທື່ອນຶ່ງໃນລະຫວ່າງເຊົ້າໆ ຕອນຕາເວັນຂຶ້ນ.
- ເມື່ອຍາມຢູ່ທາງນອກ ໃຫ້ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງຫຼີມໆ ມີສີແຈ້ງ ແລະ ໃຫ້ປົກແຂນແລະຂາໄວ້, ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຢາທາໄລ່ແມງໄມ້ຊຶ່ງມີສ່ວນປະກອບຂອງ ສານເຄມີ diethyl toluamide (DEET).
- ໃຫ້ຕິດຕັ້ງຕານ່າງໃສ່ປ່ອງຢ້ຽມ, ປະຕູ ແລະ ປ່ອງໄຟ ທຸກໆບ່ອນ ແລະ ໃຫ້ຕານ່າງຢູ່ໃນສະພາບດີສເມີ.
- ໃຫ້ສິດຢາຂ້າແມງໄມ້ໃສ່ຫ້ອງນອນເຄິ່ງຊົ່ວໂມງກ່ອນເຂົ້ານອນ. ໃຫ້ໃຊ້ຢານັ້ນ ຕາມຄຳແນະນຳທີ່ຂຽນໄວ້.



**1300 066 055**

**[www.health.nsw.gov.au](http://www.health.nsw.gov.au)**