

ورقة معلومات عن الأمراض المعدية

الزحار العصوي مرض بكتيري ينجم عن العدوى ببكتيريا الشيغלה. وهو يسبب الإسهال وينتشر بسهولة بين الناس. والنظافة الشخصية الجيدة هي السبيل الرئيسي لتجنبه.

الزحار العصوي (داء الشيغلات)

ما هو الزحار العصوي؟

الزحار العصوي مرض إسهالي ينجم عن العدوى ببكتيريا الشيغلة.

ما هي الأعراض؟

عادة ما ينتج عن الإصابة بالشيغلة الإسهال والحمى والغثيان والقيء وتقلصات المعدة. وكثيراً ما يظهر في البراز دم أو مخاط. تبدأ الأعراض بعد يوم واحد إلى 7 أيام (عادة من يوم إلى ثلاثة) بعد التعرض. وعادة ما تستمر 4 إلى 7 أيام ولكنها أحياناً ما تدوم أكثر من ذلك.

كيف ينتقل المرض؟

ينتقل الزحار العصوي من شخص لآخر بالاتصال البرازي-الفموي، عن طريق الاتصال المباشر أو غير المباشر بالماء البرازي. وهذا يحدث عادة إن لم يتم غسل اليدين جيداً، وخاصة بعد قضاء الحاجة أو تغيير الحفاضات، و كنتيجة للاتصال الجنسي. وقد تنتج كذلك العدوى بالشيغلة عن طريق أكل طعام ملوث ببكتيريا. ويمكن للذباب كذلك حمل الشيغلة وتلوث الطعام.

يمكن أن تتوارد الشيغلة في براز شخص لبضعة أسابيع دون أن تظهر عليه أعراض، وأن ينقل رغم هذا العدوى الآخرين.

كيف يتم منع المرض؟

لتتجنب الزحار العصوي:

- اغسل الخضروات والفاكهة التي تؤكل نيئة جيداً
- اغسل يديك جيداً بالماء والصابون لمدة 10 ثوان على الأقل
 - بعد قضاء الحاجة
 - بعد تغيير الحفاضات
 - بعد أي تعرض للماء البرازي
 - قبل التعامل مع الأطعمة أو الاعتناء بالآخرين.

يجب أن يتتجنب المصابون بالزحار العصوي العمل ويجب ألا يعودوا أطعمة أو يعتنوا بأخرين أثناء مرضهم. ويجب ألا يذهب الأطفال المرضى إلى مراكز رعاية الأطفال وأن يبقوا في المنزل لمدة 24 ساعة من توقف الإسهال، وخاصة من يستعمل منهم الحفاضات. ويجب أن يتتجنب الأطفال والكبار السباحة حتى يتوقف الإسهال.

يجب ألا يعود العاملون في مجال الأطعمة أو كمقدمي رعاية للأطفال أو للكبار السن إلى مهامهم لمدة 48 ساعة من توقف الإسهال. للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بوحدة الصحة العامة المحلية أو مركز صحة المجتمع أو الطبيب.

من العرضة للخطر؟

يمكن أن يصيب الزحار العصوي أي شخص؛ إلا أن الأطفال وذوي الأجهزة المناعية الضعيفة وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

كيف يتم تشخيص المرض؟

يتطلب تشخيص الزحار العصوي تحديد وجود بكتيريا *الشigellosis* في عينة براز. قد يأمر طبيبك بإجراء هذا الاختبار إن كانت لديك الأعراض.

كيف يتم علاج المرض؟


عادة ما يتعافى المصابون بعدوی بسيطة دون علاج. ومن المهم شرب قدر زائد من السوائل لتجنب الجفاف. الأطفال الصغار (وبخاصة الرضع) عرضة للجفاف بسبب الإسهال، ويجب أن يتلمس الوالدان العناية الطبية.

يمكن أن يتم استخدام المضادات الحيوية لعلاج الحالات الحادة من العدوی *الشigellosis*، إلا أن بعض سلالات *الشigellosis* قد أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية.

ما هو رد فعل الصحة العامة؟

على المختبرات إبلاغ وحدة الصحة العامة المحلية حالات *الشigellosis*. وحيث يتم تحديد وجود مجموعة مصابة يجري موفظو وحدة الصحة العامة مقابلات مع المصابين ومقدمي الرعاية لهم ويحاولون تحديد مصدر العدوی المشترك والسيطرة عليه.

معلومات إضافية – وحدات الصحة العامة في نيو ساوث ويلز



1300 066 055

www.health.nsw.gov.au