


Sydney Sexual Health Centre



คลินิกสุขภาพทางเพศชนิดนี้ให้บริการฟรีและเก็บเป็นความลับ บริการที่ครบวงจรของเราช่วยท่านให้มีสุขภาพทางเพศที่ดี บริการต่าง ๆ ได้แก่ ตรวจสุขภาพทางเพศทั่วไป ฉีดวัคซีน รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งเชื้อเอชไอวีและเชื้อตับอักเสบบี คุณดูแลสุขภาพทางเพศของหญิงและชาย ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ให้คำปรึกษาแนะนำรายบุคคลและคู่ครอง และบริการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ฉีดยา ท่านสามารถเลือกที่จะรับบริการจากแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่แนะนำที่เป็นหญิงหรือชายก็ได้ บุคลากรของเราเคารพชีวิตส่วนตัวและความชอบทางเพศของท่าน

NO MEDICARE CARD REQUIRED

Opening hours

Monday, Tuesday, Thursday - 9:30am to 6pm

Friday - 1.30pm to 6pm

Web Address:

<http://www.sshc.org.au/>

Telephone Number: 02 93827440

Sexual Health Info line: 1800 451624

NSW/ACT Sexual Health Services

Free & confidential sexual health care

Albury	Ph: (02) 6058 1840
Armidale	Ph: (02) 6776 4738
Bourke	Ph: (02) 6872 2145
Broken Hill	Ph: (08) 8080 1556
Canberra	Ph: (02) 6244 2184
Coffs Harbour	Ph: (02) 6656 7865
Dareton	Ph: (03) 5021 7200
Dubbo	Ph: (02) 6885 1700
Forster	Ph: (02) 6555 6822
Gosford	Ph: (02) 4320 2114
Goulburn	Ph: (02) 4827 3913
Griffith	Ph: (02) 6966 9900
Katoomba	Ph: (02) 4784 6560
Kings Cross	Ph: (02) 9360 2766
Kogarah	Ph: (02) 9350 2742
Lightning Ridge	Ph: (02) 6829 1022
Lismore	Ph: (02) 6620 2980
Liverpool	Ph: (02) 9827 8022
Manly	Ph: (02) 9977 3288
Marrickville	Ph: (02) 9560 3057
Mt Druitt	Ph: (02) 9881 1733
Newcastle	Ph: (02) 4923 6909
Nowra	Ph: (02) 4423 9353
Orange	Ph: (02) 6392 8600
Parramatta	Ph: (02) 9843 3124
Penrith	Ph: (02) 4734 2507
Port Kembla	Ph: (02) 4276 2399
Queanbeyan	Ph: (02) 6298 9233
Richmond	Ph: (02) 4578 1622
St Leonards	Ph: (02) 9926 7414
Sydney City	Ph: (02) 9382 7440
Tamworth	Ph: (02) 6766 3095
Taree	Ph: (02) 6592 9421
Wagga Wagga	Ph: (02) 6938 6492

want to know
more about
ต้องการทราบ
เกี่ยวกับ

Thai
[SSH-7440]

**โรคหนองใน
GONORRHOEA**

SYDNEY
SEXUAL
HEALTH
CENTRE
SSHHC

โรคหนองในคืออะไร

What is gonorrhoea?

โรคหนองในเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่อวัยวะเพศ ทวารหนัก และลำคอ

โรคนี้ติดต่อได้อย่างไร?

How does someone catch this infection?

โรคหนองในติดต่อโดยการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทางทวารหนัก หรือทางปากกับผู้ที่ป่วยโรค โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย

รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคหนองใน

How do I know if I have gonorrhoea?

ในผู้ชายที่มีการติดเชื้อทางท่อปัสสาวะ อาการจะเกิดขึ้นประมาณ 2-10 วันหลังจากได้รับเชื้อมา บางครั้งอาจเป็นเดือน ๆ กว่าจะปรากฏอาการ ผู้ชายอาจมีหนองจากท่อปัสสาวะ มีอาการแสบหรือปวดเวลาถ่ายปัสสาวะ หากติดเชื้อที่ปาก มดลูก ทวารหนัก หรือลำคออาจจะไม่มีอาการ อย่างไรก็ตามในผู้หญิงที่มีตกขาวหรือสิ่งผิดปกติทางช่องคลอด/ทวารหนัก หรือปวดอุ้งเชิงกราน อาจมีสาเหตุมาจากโรคหนองใน

จะตรวจหาโรคหนองในได้อย่างไร?

How do you test for Gonorrhoea?

ตรวจหาโรคหนองในได้ด้วยการป้ายเชื้อจากท่อปัสสาวะ ปากมดลูก ทวารหนัก หรือลำคอ หรือโดยการตรวจปัสสาวะ

รักษาได้อย่างไร

What is the treatment ?

รักษาได้ง่ายโดยใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม

คู่นอนต้องได้รับการรักษาด้วยหรือไม่?

Do sexual partners need treatment?

หากมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทางทวารหนัก หรือทางปากโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยจะเสี่ยงต่อโรคสูง เพื่อเป็นการป้องกันโรคแทรกซ้อนรุนแรงจากการติดเชื้อหนองใน คู่นอนทุกคนควรมารับการตรวจและรักษา*ไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่และไม่ว่าผลการตรวจสอบจะเป็นอย่างไร* ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ (ทางปาก ทวารหนัก และช่องคลอด) กับคู่นอนที่อาจติดเชื้อ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการรักษา เพราะท่านอาจติดเชื้อหนองในกลับมาอีกได้

เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกสุขภาพทางเพศสามารถช่วยท่านแจ้งคู่นอนของท่านให้มารับการตรวจและรักษาโดยไม่บ่งบอกถึงตัวตน

เชื้อตัวนี้จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอะไรได้บ้าง?

What are the complications of this infection?

ในผู้หญิงที่มีเชื้อหนองในหากไม่ได้รับการรักษา อาจทำให้เกิดโรคอุ้งเชิงกรานอักเสบ หมายถึงอวัยวะสืบพันธุ์ในอุ้งเชิงกรานอักเสบ โรคอุ้งเชิงกรานอักเสบอาจเป็นสาเหตุให้ท้องนอกมดลูกเป็นหมัน (เนื่องจากท่อรังไข่เสียหายจากการเป็นแผล) หรือปวดอุ้งเชิงกรานเรื้อรังได้ ในท่านองเดียวกันผู้ชายอาจมีการอักเสบของระบบสืบพันธุ์ส่วนบนถ้าได้รับการรักษาไม่เพียงพอ ซึ่งอาจทำให้มีอาการปวดลูกอัณฑะได้

มีอะไรที่ควรทราบเกี่ยวกับโรคหนองในอีก What else do you need to know about Gonorrhoea?

- ควรมารับการตรวจอีกครั้ง 7 วัน หลังจากรับประทานยาครบแล้ว
- หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ (ไม่ว่าจะเป็นทางช่องคลอด ทางปาก หรือทางทวารหนัก) จนกว่าจะได้รับผลการตรวจว่าหายขาด เพราะท่านอาจจะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นหรืออาจติดเชื้อซ้ำอีกได้
- หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ได้ในระยะนี้ ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง (รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ทางปากด้วย)