


悉尼性保健中心



悉尼性保健中心提供免费, 保密和全面性的服务, 以便帮助你掌管你的性方面的健康. 本服务帮助你维持性方面的健康的方法是提供性感染的检验, 疫苗接种和处理, 包括人体免疫力缺乏病毒 (简称 HIV), 乙型肝炎 (HEPATITIS B), 女士和男士性健康方面的医疗服务, 教育, 给予个别人士和夫妻的辅导, 及注射和针筒的交换. 本服务让你选择见男或女的医生, 护士和辅导员, 他们都会尊重你的生活方式和性行为.

无需出示医疗卡

Opening hours

Monday - Friday 9am - 5pm

Web Address:

<http://www.sshc.org.au/>

Telephone Number: 02 93827440

Sexual Health Info line: 1800 451624

新南威尔州性保健

免费和保密的性保健方面的医疗服务

Albury	Ph: (02) 6058 1840
Armidale	Ph: (02) 6776 4738
Bourke	Ph: (02) 6872 2145
Broken Hill	Ph: (08) 8080 1556
Canberra	Ph: (02) 6244 2184
Coffs Harbour	Ph: (02) 6656 7865
Dareton	Ph: (03) 5021 7200
Dubbo	Ph: (02) 6885 1700
Forster	Ph: (02) 6555 6822
Gosford	Ph: (02) 4320 2114
Goulburn	Ph: (02) 4827 3913
Griffith	Ph: (02) 6966 9900
Katoomba	Ph: (02) 4784 6560
Kings Cross	Ph: (02) 9360 2766
Kogarah	Ph: (02) 9350 2742
Lightning Ridge	Ph: (02) 6829 1022
Lismore	Ph: (02) 6620 2980
Liverpool	Ph: (02) 9827 8022
Manly	Ph: (02) 9977 3288
Marrickville	Ph: (02) 9560 3057
Mt Druitt	Ph: (02) 9881 1733
Newcastle	Ph: (02) 4923 6909
Nowra	Ph: (02) 4423 9353
Orange	Ph: (02) 6392 8600
Parramatta	Ph: (02) 9843 3124
Penrith	Ph: (02) 4734 2507
Port Kembla	Ph: (02) 4276 2399
Queanbeyan	Ph: (02) 6298 9233
Richmond	Ph: (02) 4578 1622
St Leonards	Ph: (02) 9926 7414
Sydney City	Ph: (02) 9382 7440
Tamworth	Ph: (02) 6766 3095
Taree	Ph: (02) 6592 9421
Wagga Wagga	Ph: (02) 6938 6492



非淋菌性尿道炎

NGU

SYDNEY
SSHCC
SEXUAL
HEALTH
CENTRE

什么是非淋菌性尿道炎?

非淋菌性尿道炎(NGU)亦称为非特异性尿道炎(NSU),是男性最常见的性传染病之一.它可由一系列不同的病菌引起.其中包括衣原体.非淋菌性尿道炎若不因衣原体所致,便可能由于正常阴道或咽喉部的微生物引起.

人如何受到感染?

大多数情况下,非淋菌性尿道炎是由于不带避孕套与患有感染的人进行阴道,肛门或口腔性交而受到感染的.

如何知道患有非淋菌性尿道炎?

男性可能会出现尿道分泌物,排尿时疼痛或尿道内刺激.这些症状在早晨可能会更明显一些.通常症状在受感染后一周内出现.一些男性根本没有症状.

如何检测非淋菌性尿道炎?

去看医生或就诊性健康门诊.注意看医生或护士前一小时,不要排尿,他们会用拭子从尿道采集样品并/或进行尿试验.

有无治疗方法?

大多数情况下,非淋菌性尿道炎经过一疗程抗生素治疗即可痊愈(特别是由衣原体所引起的).少数情况下,一些男性可能需要进行第二个疗程的治疗.

性伴侣需要治疗吗?

如果性伴侣在过去数月内曾与患非淋菌性尿道炎的人进行阴道,肛门或口腔性交而没有使用避孕套的话,那他们则存在被感染的危险.这意味着无论有无症状或检验结果如何,他们应接受治疗.

非淋菌性尿道炎有哪些并发症?

如果女性衣原体不治疗或不得到充分治疗,可导致盆腔炎(PID).这是指盆腔里的生殖器官受到感染时.盆腔炎可能会导致异位妊娠(妊娠发生在输卵管而不是子宫),不育(当输卵管因瘢痕组织而受损)或慢性盆腔痛.

同样,未经彻底治疗,男性可能会发展为副睾炎.

若衣原体检测结果是阴性的,这是否意味着没患有非淋菌性尿道炎?

不是.非淋菌性尿道炎可能由别的病菌所引起.检测结果只是医生或护士在诊断疾病时考虑的一个因素.

非淋菌性尿道炎在服用抗生素后是否会复发?


非淋菌性尿道炎偶尔会复发或持续.治疗后,一些男性可能会持续有尿道不适的症状,这不需要再用抗生素也会最终解决.如果症状严重或存在再次感染的可能,则需要进一步的治疗.

对接受非淋菌性尿道炎治疗的人有哪些忠告?

完成整个疗程抗生素的治疗是十分重要的--症状可能会在几天内消失,但是病菌可能并未完全被根除.

无论你接受单次剂量抗生素的治疗或是一个疗程抗生素的治疗,至少 7 天你不应有性接触,因为感染仍会被传播.如果这段时间内不能避免性接触,那你必须使用避孕套.

如何正确使用避孕套?



- 选择一个适合你的品牌的避孕套.
- 不要用牙咬开包装.不要用指甲撕破避孕套.
- 查看使用日期.



- 挤压住避孕套的末端并套在勃起的阴茎上.
- 如果没有进行过包皮切割手术,在戴避孕套之前拉开包皮.
- 将避孕套完全戴到阴茎的根部.



- 经常使用水性润滑剂.
- 不要使用按摩油或凡士林.
- 在性交过程中,经常检查避孕套是否保持在原位.



- 性交结束后,在阴茎仍勃起的情况下取下避孕套.
- 紧握避孕套的根部以避免精液流出.
- 一个避孕套只能使用一次.