


시드니 성건강 센터



시드니 성건강 센터는 비공개적이고 무료이며 여러분의 성건강 관리에 도움이 되는 포괄적 서비스를 제공합니다. 본 서비스는 검사, 예방접종, HIV 와 B 형 간염을 비롯한 성병 관리, 남녀 성건강 관리, 교육, 개인 및 커플 상담, 주사기 및 주사바늘 교환 등을 통해 여러분의 성건강에 도움을 드립니다. 본 서비스는 여러분의 라이프스타일과 성적 특질을 존중하는 남녀 의사/간호사/카운셀러로 구성되어 있습니다.

메디케어 카드가 필요없음

Opening hours

Monday - Friday 9am - 5pm

Web Address:

<http://www.sshc.org.au/>

Telephone Number: 02 93827440

Sexual Health Info line: 1800 451624

NSW 성건강 서비스

무료 & 비공개 성건강 관리

Albury	Ph: (02) 6058 1840
Armidale	Ph: (02) 6776 4738
Bourke	Ph: (02) 6872 2145
Broken Hill	Ph: (08) 8080 1556
Canberra	Ph: (02) 6244 2184
Coffs Harbour	Ph: (02) 6656 7865
Dareton	Ph: (03) 5021 7200
Dubbo	Ph: (02) 6885 1700
Forster	Ph: (02) 6555 6822
Gosford	Ph: (02) 4320 2114
Goulburn	Ph: (02) 4827 3913
Griffith	Ph: (02) 6966 9900
Katoomba	Ph: (02) 4784 6560
Kings Cross	Ph: (02) 9360 2766
Kogarah	Ph: (02) 9350 2742
Lightning Ridge	Ph: (02) 6829 1022
Lismore	Ph: (02) 6620 2980
Liverpool	Ph: (02) 9827 8022
Manly	Ph: (02) 9977 3288
Marrickville	Ph: (02) 9560 3057
Mt Druitt	Ph: (02) 9881 1733
Newcastle	Ph: (02) 4923 6909
Nowra	Ph: (02) 4423 9353
Orange	Ph: (02) 6392 8600
Parramatta	Ph: (02) 9843 3124
Penrith	Ph: (02) 4734 2507
Port Kembla	Ph: (02) 4276 2399
Queanbeyan	Ph: (02) 6298 9233
Richmond	Ph: (02) 4578 1622
St Leonards	Ph: (02) 9926 7414
Sydney City	Ph: (02) 9382 7440
Tamworth	Ph: (02) 6766 3095
Taree	Ph: (02) 6592 9421
Wagga Wagga	Ph: (02) 6938 6492

want to know
more about

Korean
[SSH-7455]

비임균성 요도염

NGU



SSHCC SYDNEY
SEXUAL
HEALTH
CENTRE

NGU 란 무엇인가?

비특이성 요도염(NSU)으로 불리기도 하는 NGU(비임균성 요도염)는 남성에게 가장 많이 전염되는 성병 중에 하나입니다. NGU 는 클라미디아라는 세균을 비롯하여 여러 가지 다양한 세균에 기인하는 병입니다. 클라미디아에 기인하지 않는 NGU 는 질 또는 인후에 흔히 존재하는 미생물에 기인하기도 합니다.

전염 경로는 어떻게 되나?

NGU 는 대부분의 경우 감염된 사람과 콘돔을 사용하지 않고 질섹스, 항문섹스, 또는 오럴섹스를 함으로써 전염됩니다.

NGU 의 증상은 어떻게 나타나나?

증상으로는 음경으로부터의 분비물, 소변 시의 통증, 음경 내부의 염증 등이 있습니다. 이 증상들은 아침에 더 심하게 느껴지기도 합니다. 감염후 증상이 나타날 때까지는 1-5 주가 걸리기도 합니다. 그리고 증상이 전혀 안 나타나는 경우도 있습니다.

NGU 의 검사 방법은?

가정의에게 가든가 아니면 성건강 클리닉으로 가십시오. 의사/간호사에게 진찰받기 1 시간 전부터는 소변을 보지 않도록 하는 것이 중요합니다. 검사 방법으로는 요도 면봉검사 그리고/또는 소변검사를 하게 될 것입니다.

치료 방법은 있는가?

NGU 는 대부분의 경우 한 코스의 항생제 치료로 완치될 수 있습니다 (특히 클라미디아균에 기인한 경우). 그리고 항생제 치료를 한 코스 더 받아야 하는

NGU 의 합병증에는 어떤 것들이 있나?

여성의 경우 클라미디아를 적절히 치료하지 않으면 골반내 염증성 질환(PID)으로 진전될 가능성이 있습니다. 이것은 골반 내에 있는 생식 기관에 염증이 생기는 경우입니다. PID 는 자궁의 임신(수정난이 자궁에서 발달하지 않고 나팔관에서 발달함), 불임증 (나팔관이 반흔조직에 의해 손상되는 경우), 또는 만성 골반통을 일으킬 수 있습니다.

마찬가지로, 남성의 경우에도 클라미디아를 적절하게 치료하지 않으면 고환에 염증이 생길 수 있습니다.

클라미디아 검사 결과가 음성으로 나오면 NGU 에 감염되지 않았다는 뜻인가?

그렇지 않습니다. NGU 는 다른 세균에 의해서도 생길 수 있습니다. 검사 결과는 의사/간호사가 진단을 내리기 위해 고려하는 요인들 중 하나에 불과합니다.

항생제 치료를 받은 후에도 NGU 가 재발할 수 있나?

NGU 는 종종 재발하거나 증상이 오래 지속될 수 있습니다. 치료 후 계속해서 음경에 가벼운 통증이 느껴지는 경우도 있는데, 그런 경우에는 항생제 치료를 더 받지 않아도 저절로 낫게 됩니다. 증상이 심하거나 재감염의 가능성이 있을 경우에는 추가 치료를 받는 것이 적절합니다 (섹스 파트너들도 포함하여).

NGU 치료를 받는 사람이 주의해야 할 사항은?

한 코스의 항생제를 처방 받은 경우, 그 코스를 다

콘돔을 바르게 사용하는 방법



Open Carefully...

편안하게 맞는 브랜드를 선택합니다.
포장을 뜯을 때 치아를 사용하지 않도록 합니다.
콘돔을 손톱으로 찢는 일이 없도록 주의합니다.
“사용 유효” 날짜를 확인합니다.



Squeeze the tip.

콘돔의 끝부분을 잡고 누른 후 발기된 음경 위에 펼칩니다.
포경수술을 하지 않은 경우에는 포피를 뒤로 잡아당기고 펼칩니다.
콘돔을 음경의 밑부분까지 완전히 펼칩니다.



Unroll it fully.

반드시 수성 윤활제를 사용합니다.
기름이나 바셀린을 사용하면 안됩니다.



Hold base... withdraw erect.

섹스 도중 콘돔이 빠지지 않았는지 확인합니다.
끝난 후에는 음경이 여전히 발기된 상태에서 뺍니다.
뺄 때는 콘돔이 같이 나오도록 내용물이 흘러나오지 않도록 콘돔의 밑부분을 잡고 뺍니다.
콘돔은 일회용입니다.