


悉尼性保健中心



悉尼性保健中心提供免费，保密和全面性的服务，以便帮助你掌管你的性方面的健康。本服务帮助你维持性方面的健康的方法是提供性感染的检验，疫苗接种和处理，包括人体免疫力缺乏病毒（简称 HIV），乙型肝炎（HEPATITIS B），女士和男士性健康方面的医疗服务，教育，给予个别人士和夫妻的辅导，及注射和针筒的交换。本服务让你选择见男或女的医生，护士和辅导员，他们都会尊重你的生活方式和性行为。

无需出示医疗卡

Opening hours

Monday - Friday 9am - 5pm

Web Address:

<http://www.sshc.org.au/>

Telephone Number: 02 93827440

Sexual Health Info line: 1800 451624

新南威尔士州性保健

免费和保密的性健康方面的医疗服务

Albury	Ph: (02) 6058 1840
Armidale	Ph: (02) 6776 4738
Bourke	Ph: (02) 6872 2145
Broken Hill	Ph: (08) 8080 1556
Canberra	Ph: (02) 6244 2184
Coffs Harbour	Ph: (02) 6656 7865
Dareton	Ph: (03) 5021 7200
Dubbo	Ph: (02) 6885 1700
Forster	Ph: (02) 6555 6822
Gosford	Ph: (02) 4320 2114
Goulburn	Ph: (02) 4827 3913
Griffith	Ph: (02) 6966 9900
Katoomba	Ph: (02) 4784 6560
Kings Cross	Ph: (02) 9360 2766
Kogarah	Ph: (02) 9350 2742
Lightning Ridge	Ph: (02) 6829 1022
Lismore	Ph: (02) 6620 2980
Liverpool	Ph: (02) 9827 8022
Manly	Ph: (02) 9977 3288
Marrickville	Ph: (02) 9560 3057
Mt Druitt	Ph: (02) 9881 1733
Newcastle	Ph: (02) 4923 6909
Nowra	Ph: (02) 4423 9353
Orange	Ph: (02) 6392 8600
Parramatta	Ph: (02) 9843 3124
Penrith	Ph: (02) 4734 2507
Port Kembla	Ph: (02) 4276 2399
Queanbeyan	Ph: (02) 6298 9233
Richmond	Ph: (02) 4578 1622
St Leonards	Ph: (02) 9926 7414
Sydney City	Ph: (02) 9382 7440
Tamworth	Ph: (02) 6766 3095
Taree	Ph: (02) 6592 9421
Wagga Wagga	Ph: (02) 6938 6492

want to know more about

Chinese [SSH-7460]

盆腔炎

PELVIC INFLAMMATORY DISEASE

SYDNEY SEXUAL HEALTH CENTRE

什么是 PID?

PID 是盆腔炎 (pelvic Inflammatory Disease)的简称,是指女性的子宫,输卵管及/或卵巢的感染。

PID 是怎样导致的?

在三十岁以下的女性中,PID 往往是由衣原体(Chlamydia)所导致的.衣原体是一种性病感染,先从子宫颈开始,并且可能蔓延到子宫和盆腔内的各器官.也可能会有其它的细菌,包括淋病和正常的阴道细菌.女性若感染过一次衣原体,将来患上 PID 的可能性就会较高。

在接受流产或其它手术程序后,女性偶尔也会患上 PID。

有什么症状?

PID 可以导致下腹部和骨盆疼痛,发烧,疲倦和从阴道排出的异常分泌物.其它的症状可能包括在性交时感到疼痛,性交后或在经期和经期之间出现异常的出血。

很多患上 PID 的女性都只有轻微的症状,这可能会持续很多周或很多个月,并且患者自己往往没有察觉到。

怎样知道你是否患上了 PID?

没有单一的诊断 PID 的检验.如果某女性

有任何上述的症状,医生应该为她检查,并且为她进行衣原体和其它感染的检验及做阴道的检查,以便诊断她盆腔内的各器官有没有触痛。

即使还未得到拭子化验的结果,医生往往会根据检查的结果而建议病人接受 PID 的治疗。

有没有任何治疗的方法?

治疗 PID 的方法是同时服用至少两种不同的抗生素起码 14 天。

PID 有什么并发症?

女性一旦患过一次 PID,她宫外孕(在输卵管内成孕,而不是在子宫内成孕),不育(由于输卵管上出现疤痕),或长期骨盆疼痛的可能性会比一般人为高。

以后再次患 PID,出现这些问题的可能性就会成倍增加,因此,必须确保一旦被感染,该人就应获得适当的治疗,预防骨盆器官受到进一步的感染。

怎样预防 PID?

可以用下列的方法预防 PID:

- 与所有新的性伙伴性交时,使用避孕套;
- 如果她最近更换了性伴侣,应去看医生,接受衣原体的检验;
- 如果骨盆出现任何异常的疼痛,或阴道溢液或出血,就要马上看医生;并且

- 确保各性伴侣都得到正确的诊断,以免再被传染。

患者的所有性伴侣都需要接受治疗吗?

患者的所有性伴侣都应该接受检验和接受衣原体(和任何其它被怀疑可能染上的病)的治疗,因为他们有高度的可能性已被传染并且传染给别人。

你还需要知道什么东西?

- 应该完成整个抗生素的疗程.即使症状改善了,在未完成整个疗程之前,可能还未完全把感染根除。
- 在接受治疗的至少 10 至 14 天内,尤其是在性伴侣接受治疗的一个星期内,应该避免性交,以免再被传染。
- 应该遵从医生的指示定期复诊.这是为了检查该感染是否正在好转,各伴侣是否已接受治疗,并且检查有没有新的问题出现。

注意:某些抗生素可能会使口服避孕药不能发挥作用.在服用抗生素期间,服用避孕药的女性如果不能避免性交,就应该使用避孕套,并且在服用完抗生素后的七天之内,服用激素避孕药并且在性交时使用避孕套。