


시드니 성건강 센터



시드니 성건강 센터는 비공개적이고 무료이며 여러분의 성건강 관리에 도움이 되는 포괄적 서비스를 제공합니다. 본 서비스는 예비검사, 예방접종, HIV 와 B 형 간염을 비롯한 성병 관리, 남녀 성건강 관리, 교육, 개인 및 커플 상담, 주사기 및 주사바늘 교환 등을 통해 여러분의 성건강에 도움을 드립니다. 본 서비스는 여러분의 라이프스타일과 성적 특질을 존중하는 남녀 의사/간호사/카운셀러로 구성되어 있습니다.

메디케어 카드가 필요없음

Opening hours

Mon-Fri 9am-5pm
Sat 9am-12pm

Web Address:

<http://www.sshc.org.au/>

Telephone Number: 02 93827440

Sexual Health Info line: 1800 451624

무료 & 비공개 성건강 관리

Albury	Ph: (02) 6058 1840
Armidale	Ph: (02) 6776 4738
Bourke	Ph: (02) 6872 2145
Broken Hill	Ph: (08) 8080 1556
Canberra	Ph: (02) 6244 2184
Coffs Harbour	Ph: (02) 6656 7865
Dareton	Ph: (03) 5021 7200
Dubbo	Ph: (02) 6885 1700
Forster	Ph: (02) 6555 6822
Gosford	Ph: (02) 4320 2114
Goulburn	Ph: (02) 4827 3913
Griffith	Ph: (02) 6966 9900
Katoomba	Ph: (02) 4784 6560
Kings Cross	Ph: (02) 9360 2766
Kogarah	Ph: (02) 9350 2742
Lightning Ridge	Ph: (02) 6829 1022
Lismore	Ph: (02) 6620 2980
Liverpool	Ph: (02) 9827 8022
Manly	Ph: (02) 9977 3288
Marrickville	Ph: (02) 9560 3057
Mt Druitt	Ph: (02) 9881 1733
Newcastle	Ph: (02) 4923 6909
Nowra	Ph: (02) 4423 9353
Orange	Ph: (02) 6392 8600
Parramatta	Ph: (02) 9843 3124
Penrith	Ph: (02) 4734 2507
Port Kembla	Ph: (02) 4276 2399
Queanbeyan	Ph: (02) 6298 9233
Richmond	Ph: (02) 4578 1622
St Leonards	Ph: (02) 9926 7414
Sydney City	Ph: (02) 9382 7440
Tamworth	Ph: (02) 6766 3095
Taree	Ph: (02) 6592 9421
Wagga Wagga	Ph: (02) 6938 6492

want to know more about

골반내 염증성 질환

PELVIC INFLAMMATORY DISEASE

SYDNEY SEXUAL HEALTH CENTRE

PID란 무엇인가?

PID는 골반내 염증성 질환 (Pelvic Inflammatory Disease) 의 약자로 여성의 자궁, 나팔관, 난소 등의 감염증입니다.

PID의 원인은 무엇인가?

PID는, 30세 미만의 여성의 경우, 자궁경부에서 시작하여 자궁과 그 주변의 골반 기관으로 퍼질 수 있는 성병인 클라미디아에 기인하는 경우가 많습니다. 그리고 임질균과 정상질균을 비롯한 기타 세균들도 원인이 될 수 있습니다. 클라미디아에 한번 감염되면 나중에 PID가 생길 가능성이 높아집니다. 그리고 임신 중절이나 기타 수술 후에 PID가 생기는 경우도 가끔 있습니다.

PID의 증상은?

PID의 증상에는 하복부 및 골반의 통증, 발열, 피로감, 비정상적 질분비물 등이 있습니다. 그리고 성교시의 통증이나 성교후 또는 월경시기가 아닌 때의 비정상적 출혈도 증상으로 나타날 수 있습니다. PID가 있는 여성들 중에는 증상이 지극히 가벼워서 수 주 내지 수 개월간 느끼지 못하고 지나치는 경우가 많습니다.

PID의 검사 방법은?

의원이나 성건강 진료소로 가십시오. PID를 진단하는 검사는 따로 없습니다. 위에서 언급한 증상이 있을 경우에는 의사가 진찰을 한 후 클라미디아와 기타 감염증의

검사를 할 것입니다. 그리고 질을 통하여 골반 기관의 통증이 있는지 촉진할 것입니다. 검사 결과가 나오기 전이라도, 의사가 진찰한 결과를 근거로 하여 PID 치료를 권하는 경우도 많습니다.

치료 방법이 있는가?

PID는 2가지 이상의 항생제를 사용하여 14일 이상 치료합니다.

파트너도 치료를 받아야 하나?

지난 6개월 동안 콘돔을 사용하지 않은 질 섹스를 한 섹스파트너는 클로미디아 (그리고 그외의 감염증)검사를 받고 증상이나 검사결과 여부에 관계없이 치료를 받도록 알려주어야 합니다.

PID의 합병증에는 어떤 것들이 있나?

PID가 한 번 발병하면 자궁외임신(수정란이 자궁 내에 착상하지 않고 나팔관 내에 착상하는 경우), 불임증(나팔관의 반흔조직에 기인하여), 또는 만성 골반통이 생길 가능성이 평균보다 두 배로 높아집니다. PID가 재발하면 합병증이 생길 가능성이 또 다시 두 배 높아지므로 처음 발병했을 때 적절한 치료를 받아서 재발을 예방하도록 하는 것이 중요합니다.

PID를 예방할 수 있는 방법은?

PID를 예방할 수 있는 방법

- 새로운 섹스파트너와는 항상 콘돔을 사용한다.
- 섹스파트너가 최근에 바뀐 경우 의사에게 클라미디아 검사를 받는다.

- 비정상적인 골반통, 질분비물, 하혈이 있을 경우 즉시 의사에게 진찰을 받는다.
- 재감염을 예방하기 위해 섹스파트너도 철저히 검진을 받도록 한다.

그 외에 또 알아두어야 할 사항은?

- PID를 치료받을 시에는 항생제를 끝까지 복용해야 합니다. 증상이 나아져도 항생제를 끝까지 복용하기 전에는 감염증이 남아있을 수 있습니다.
- 여성의 경우 재감염을 예방하기 위해 항생제를 복용하기 시작한 날로부터 최소한 14일 동안, 그리고 특히 섹스파트너가 치료를 받은 후 1주일 동안, 성교를 삼가야 합니다.
- 치료 후에는 반드시 의사에게 추후 검진을 받도록 해야 합니다. 그 이유는 감염증이 나아지고 있는지, 파트너가 치료를 받았는지, 그리고 새로운 질환이 발병하지 않았는지 점검하기 위해서입니다.

주의: 항생제 중에는 피임약의 효과를 중지시키는 것들도 있습니다. 피임약을 복용하고 있는 여성은 섹스를 삼가지 못할 경우 항생제를 복용하는 기간 동안과 치료가 끝난 후 피임약을 다시 복용하기 시작해서 7일이 지날 때까지 콘돔을 사용해야 합니다.