

## Le test tuberculinique intradermique Tuberculin Skin Test

### Qu'est ce que la tuberculose ?

- La tuberculose (TB) est une maladie résultant d'une infection par la bactérie *Mycobacterium tuberculosis*. La tuberculose peut atteindre les poumons ainsi que toute autre partie du corps et rendre gravement malade.

### Qu'est ce que le test tuberculinique intradermique ?

- On utilise le test tuberculinique intradermique (IDR ou intradermoréaction, appelé aussi test de Mantoux), pour déterminer si vous avez été infecté par la tuberculose.
- Une petite injection est pratiquée juste sous la peau, en général sur l'avant-bras gauche. Entre 48 et 72 heures plus tard, on examine le site pour toute réaction (induration) ayant pu se former.
- Une induration peut se former si vous avez été infecté par la tuberculose ou avez été vacciné par le BCG. Si une induration se forme, elle finira par disparaître.
- Un petit pourcentage de sujets fera une réaction intradermique positive, mais **la majorité des personnes infectées par la tuberculose ne développe pas la maladie.**

### Avant de faire le test à la tuberculine :

Il est important de faire savoir à l'infirmier/infirmière :

- Si vous souffrez de tout type de cancer, y compris lymphome et maladie de Hodgkin
- Si vous prenez des médicaments qui peuvent affecter votre système immunitaire, par exemple corticostéroïdes (prednisone), ciclosporine ou drogues de chimiothérapie (pour traiter le cancer)
- Si vous avez récemment (dans le mois passé) souffert d'une infection telle que grippe, rougeole ou coqueluche
- Si vous avez été vacciné (dans le mois passé) contre les oreillons, la rougeole, la rubéole ou la varicelle
- Si vous êtes infecté par le VIH/SIDA
- Ces facteurs peuvent affecter l'interprétation et l'administration du test à la tuberculine.

### Soins d'hygiène du site de l'injection

- Ne grattez pas le site
- Ne recouvrez pas le site avec un pansement, une crème ou pommade
- Si des cloques apparaissent, ne les percez pas.
- Vous pouvez continuer à mener normalement toutes vos activités, y compris travailler, faire du sport et vous doucher.

### Que se passe-t-il après le test?

- Après le test tuberculinique intradermique, vous **devez retourner à l'hôpital dans les 48 – 72 heures** afin que la réaction au test puisse être examinée et le résultat enregistré.
- Il est possible que certains sujets qui ont un résultat négatif doivent refaire le test une seconde fois.

### Pourquoi faut-il refaire le test intradermique à la tuberculine ?

- Le premier test peut être négatif parce que la réaction à la tuberculine peut décroître ou disparaître au fil du temps.
- Le deuxième test (test en deux étapes) a pour but de stimuler le système immunitaire afin de provoquer une réaction qui a pu décroître.
- Comme il est possible d'obtenir de fausses réactions positives et de fausses réactions négatives, il peut parfois être difficile de décider du suivi et du traitement. Le test en 2 étapes peut aider à clarifier la marche à suivre.

**Si, en sortant d'ici, vous avez des inquiétudes concernant le test  
veuillez appeler le service de pneumologie.**

## Services de pneumologie de NSW

### Services métropolitains : Metropolitan Clinics:

### Téléphone Telephone No.

Central Sydney	Canterbury Hospital	9787 0162
	Concord Hospital	9767 5675
	Royal Prince Alfred Hospital	9515 8846
Northern Sydney	Hornsby Hospital	9477 9317
	Manly Hospital	9976 9542
	Royal North Shore Hospital	9926 7905
South Eastern Sydney	Prince of Wales Hospital	9382 4636
	St George Hospital	9350 2503
	St Vincent's Hospital	8382 3876
	Sydney Hospital	9382 7535
South Western Sydney	Liverpool Hospital	9829 4888
Wentworth	Nepean Hospital	4734 2536
Western Sydney	Parramatta Health Services	9843 3110

### Services ruraux : Rural Clinics:

Central Coast	Gosford Hospital	4320 3388
Far West	Broken Hill Hospital	(08) 8080 1317
Greater Murray	Wagga Wagga Centre of Public Health	6933 9125
	Griffith Community Health Centre	6966 9900
Hunter	John Hunter Hospital	4921 3372
Illawarra	Wollongong Hospital	4253 4138
Macquarie	Dubbo Centre of Population Health	6841 2345
Mid Western	Orange Base Hospital	6393 3480
Mid North Coast	Coffs Harbour Health Campus	6656 7855
	Port Macquarie Health Centre	6588 2755
	Taree Health Centre	6592 9625
New England	Tamworth Base Hospital	6768 3392
Northern Rivers	Lismore Base Hospital	6620 2280
Southern	Bega Community Health Centre	6492 9620
	Cooma Community Health Centre	6455 3201
	Goulburn Community Health Centre	4827 3913
	Narooma Community Health Centre	4476 2344
	Queanbeyan Community Health Centre	6298 9233
	Young Mercy Care Centre	6382 1111

### NSW Department of Health:

73 Miller Street  
North Sydney NSW 2059

Tél (02) 9391 9000  
Fax (02) 9391 9101  
TTY (02) 9391 9900

NSW Health website: [www.health.nsw.gov.au](http://www.health.nsw.gov.au)